



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



FROM THE LIBRARY OF
Professor Karl Heinrich Rau
OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY
Mr. Philo Parsons


OF DETROIT


1871

AF

20

.B7







BIBLIOTHEQUE

BRITANNIQUE



AGRICULTURE
ANGLAISE.

TOME SECOND.

21



A G E N E V E ,

De l'Imprim. de la BIBLIOTH. BRITANNIQUE.

1 7 9 7.

111

AGRICULTURE.

DE LA VIE AGRICOLE.

" Happy the man whose wish and care
A few paternal acres bound,
Content to breathe his native air
In his own ground. „

Page.

LE séjour des champs attire les hommes par un effet naturel de leurs passions , de leurs penchans & de leurs goûts. L'ambition déçue , les habitudes studieuses , le sentiment vif des beautés de la Nature , les projets de fortune renversés ou satisfaits , nous poussent ou nous ramènent à habiter la campagne ; l'homme blasé en espère une existence ; l'indolent y cherche le repos , le misanthrope la solitude ; elle intéresse l'esprit observateur par des merveilles toujours renaissantes ; elle nourrit l'exaltation par des tableaux sublimes ; & les doux prestiges d'une vie d'innocence , au milieu des scènes champêtres , flattent la mélancolie des âmes tendres.

Cependant , ainsi que sur tous les autres objets de nos vœux , il est rare que la réalité réponde ici aux promesses de l'imagination. L'un porte dans la retraite les passions qui ont agité

sa vie, & il s'étonne de ne point trouver le calme qu'il espéroit ; un autre a laissé des souvenirs, a rompu des relations qui le rappellent ; un troisième se sent reporté vers les affaires par cette même inquiétude vague qui lui faisoit désirer le repos ; celui-ci a une activité qui manque d'aliment & le dévore ; celui-là a le sentiment de son talent, & se reproche de s'être condamné à une existence obscure ; & trop souvent l'objet même des espérances devient l'occasion des regrets.

C'est que dans toutes les situations de la vie humaine, les circonstances n'influent sur le bonheur que dans leurs rapports avec les dispositions intérieures. Que font en effet les douceurs du repos à celui qui a besoin d'agir ? De quel prix est le loisir à qui ne réfléchit que pour s'inquiéter ? Et qu'importe le spectacle de la Nature à celui qui ne jete sur ces scènes magnifiques que des regards distraits ?

Mais de tous les motifs secrets de mécontentement qui accompagnent l'indolence dans la retraite, aucun peut-être n'agit avec plus de force que la conscience de l'inutilité : car la Nature nous a tous également destinés au travail ; & un sentiment d'inquiétude, mêlée de honte, poursuit l'homme oisif, comme pour venger la Société négligée.

Nul n'appréciera donc les plaisirs de la vie champêtre s'il ne s'est mis en paix avec lui-même

DE LA VIE AGRICOLE. (5)

en se donnant une occupation utile ; & ici se présentent les soins agricoles , dont la ressource est applicable à toutes les capacités , à tous les esprits , à tous les caractères , avec des avantages qu'on ne sauroit trop exalter.

Mieux peut-être qu'aucun des autres objets de poursuites qui remplissent la vie , l'agriculture s'adapte , dans son étude & sa pratique , à la somme quelconque de facultés qu'y apporte celui qui s'y livre. Chacun se plaît dans cette carrière dès les premiers pas qu'il y fait. Les jouissances n'y sont point exclusivement le partage , ni de la richesse qui commande les bras , ni du génie qui fait les découvertes. Chacun dans sa sphère s'applaudit de ses combinaisons , jouit du fruit de ses travaux , & la culture d'un arpent de terre , plus sûrement encore que de vastes exploitations , donne des plaisirs qui ne sont point achetés à un trop haut prix. — Quel est donc ce charme particulier attaché par la suprême sagesse à cet art si simple comme occupation , si compliqué comme science ? à cet art que les plus grands hommes (1) & les plus grandes Nations ont honoré comme le plus

(1) Rappelons l'hommage que lui rend le plus éloquent des Romains. *« Omnium autem rerum ex quibus aliquid acquiritur , nihil est agriculturâ melius , nihil uberius , nihil dulcius , nihil homine , nihil libero dignius. »*

CIC. de off. L. I. §. 42.

(6) AGRICULTURE.

utile, & auquel tout nous ramène comme au plus doux à pratiquer ?

Observons d'abord que la santé, le premier bien de l'existence, celui sans lequel tous les objets prennent une sombre couleur, s'entretient & se fortifie dans l'exercice de l'agriculture. Cet état de bien-être qu'on éprouve & ne définit point, cette disposition qui dépend de l'équilibre parfait des humeurs & du jeu facile des forces vitales, change les moindres actes en plaisir, & nous dispose à trouver des jouissances dans chaque occasion d'employer nos facultés.

Le théâtre des occupations agricoles leur donne encore un mérite qui leur est propre. Quel art que celui qui s'exerce au milieu des plus belles scènes de la création, & sous l'influence immédiate des phénomènes célestes ! L'agriculteur est en rapport avec tous les agens de la Nature. Les douces rosées, les pluies nourricières, les vents, les neiges, les frimats, tout concourt aux résultats qui l'occupent : quand le Soleil brille c'est pour mûrir ses récoltes, quand les nuages se rassemblent c'est pour les arroser ; & si de loin en loin les météores destructeurs viennent réveiller ses craintes ou lui rappeler sa dépendance du Ciel, ils le garantissent du moins de la stupeur de l'indifférence, ils donnent un prix nouveau à ce qu'ils ont épargné.

DE LA VIE AGRICOLE. (7)

Toutes les occupations, tous les travaux de l'agriculteur tendent au bien de la Société, & il ne sauroit l'oublier, car ce qu'il voit le lui retrace à toute heure : les bras qu'il fait agir, les indigens qu'il sauve de l'oïveté, les productions que ses soins multiplient, sont autant de bienfaits envers l'espèce humaine & envers son pays. Il devient meilleur dans une vocation qui se compose d'actes utiles ; & quel plus sûr garant du bonheur que la pratique journalière du bien !

Les passions haineuses, qui par l'accumulation des individus désœuvrés fermentent au sein des villes, s'adoucissent chez des citoyens éparés & occupés. Les dissentimens sont plus rares parmi ceux qui raisonnent peu & agissent sans cesse. Au milieu des travaux rustiques les germes de la jalousie périclent, ou se développent en émulation ; & l'homme des champs exempt du tourment de haïr, trouve dans la disposition habituelle à la bienveillance une douceur, qui pour n'être point analysée n'en est pas moins réelle, & qui manque toujours à l'envieux, au sein même des succès.

La vie laborieuse & simple du cultivateur s'allie à tous les devoirs domestiques, dont l'accomplissement, s'il est facile, prête à notre existence son charme le plus précieux. C'est au village que nous trouvons ces mœurs patriarcales dont notre corruption nous a tant éloignés.

C'est sous les abris champêtres qu'on peut chercher encore les époux heureux , & les familles unies.

Enfin , un attrait puissant conduit les hommes à cette vocation ou les y retient , c'est l'attrait inséparable d'une vie exempte de tant de gênes sociales inutiles ! d'une vie dans laquelle on jouit de toute l'indépendance que la nature des choses permet sans rétrograder vers l'état sauvage. Sous le tyran même , le cultivateur se sent plus libre que l'habitant des villes ; & s'il n'échappe pas toujours aux vexations du despote , l'intérêt même de celui-ci lui défend de l'écraser. Il se console , il se distrait par le travail. Il se soumet à un fléau politique comme à un orage ; & la foudre qui tombe sur les palais des grands , respecte son humble demeure.

Gardons-nous cependant de l'illusion que de séduisants tableaux pourroient faire naître , si l'expérience ne nous ser voit de correctif & de guide. La condition humaine , qui n'admet point de félicité sans mélange , défend à l'agriculteur d'espérer des succès sans inquiétudes , ou des jouissances sans regrets ; & souvent , pour avoir trop compté sur les avantages de cette vocation , sans en calculer les peines & en pratiquer les devoirs , on y débute par des chagrins que quelques connoissances préliminaires eussent épargnés. Indiquons en peu de mots les fautes communes , & instruisons les

jeunes agriculteurs à s'en préserver. Si nous réussissons à leur faire trouver l'intérêt dans la tranquillité, & le calme dans une vie occupée, nous aurons atteint notre but.

Heureux qui habite un pays où la paix regne, où les propriétés sont sacrées ! partout ailleurs on possède & ne jouit point ; on cultive avec crainte, on recueille avec inquiétude, on travaille sans projet. Ce n'est point alors l'art de l'agriculture qu'on exerce : car dans cet art le sacrifice du présent à l'avenir est souvent nécessaire, & c'est-là un calcul que n'admet point l'incertitude sur les propriétés. Supposons donc, ce que dans bien des lieux on est réduit à désirer encore : c'est une base sans laquelle on ne sauroit construire (1).

L'acquéreur d'un domaine est appelé d'abord à opter sur le mode d'exploitation, entre trois méthodes dont chacune a ses avantages. Il peut mettre à ferme, cultiver à moitié fruits, ou par des domestiques. Le premier parti assimile la possession à un placement d'argent (2) ; & quant aux soins du fermier, ils se trouvent

(1) Inventeurs des droits de l'homme, assurez au laboureur le droit de recueillir où il a semé, & de transmettre à ses enfans sa terre améliorée.

(2) Quant au profit de la terre dans la pratique à ferme, le lecteur peut consulter ce que nous avons dit dans la conclusion de l'agriculture de Norfolk, tom. I. pag. 285.

(10) AGRICULTURE.

compris dans ceux du propriétaire tels que nous allons les indiquer. — En louant sa terre à moitié fruits , le propriétaire se condamne à l'inaction , & il adopte une méthode en général mal calculée pour l'amélioration de son domaine (1) ; mais s'il est absolument sans expérience , ce parti est ordinairement le plus sage dans un début : il donne le temps de s'instruire.

C'est une erreur trop commune chez les nouveaux possesseurs que de faire abstraction des difficultés morales qui les attendent , & de se croire placés pour reformer avant d'avoir été en position d'apprendre. La connoissance des hommes sert à tout ; & celui qui néglige de faire la part aux passions & aux préjugés , est souvent puni de son inconfidération par des dégoûts amers. L'agriculteur est dans une dépendance inévitable de la volonté d'autrui pour l'exécution de ses idées ; & on diroit cependant , à voir la confiance avec laquelle certains débutans froissent les amour-propres ,

(1) Les métayers , qui louent à moitié-fruits , sont ordinairement des gens peu aisés , qui ne peuvent faire aucune avance , qui ne prennent point à long bail , & qui , par conséquent , ne peuvent entreprendre aucune des véritables améliorations des domaines. Il est aisé de sentir , que ceux qui ont les moyens & la volonté d'opérer en grand des réparations utiles , veulent en retirer le profit ; & prennent une ferme à long bail.

DE LA VIE AGRICOLE. (II)

& heurtent les préjugés de ceux qu'il employent qu'il n'appartient pas aux classes subalternes de la société de partager les défauts & les torts qu'ils ont eux-mêmes. Delà l'opposition secrète, le travail lent, l'exécution défectueuse, & tous les mécomptes qui sont de véritables chagrins lorsqu'on a trop espéré. (1)

Ceux qui ont observé les paysans, & qui ont long-temps employé les ouvriers de campagne, savent qu'ils appliquent & craignent le ridicule, dans les objets qui sont de leur

(1) Quel dommage qu'on ne puisse pas dissiper à son gré les préjugés, faire taire l'amour-propre & l'intérêt, plier les volontés à sa guise, trouver des aides tels qu'on les imagine, parer à tous les accidens ; & applanir les difficultés qui naissent toujours en foule lorsqu'on veut appliquer une théorie ! Que l'art seroit alors facile à pratiquer ! — Quand on entend raisonner un agriculteur de cabinet sur les systèmes des Tull, des Duhamel, des Dechateauvieux ; sur la grande & la petite culture, sur les instrumens qui abrègent le travail ; puis calculer les produits nets sur lesquels il compte lorsqu'il exploitera lui-même, on se rappelle les tacticiens des cafés qui font mouvoir les armées & gagnent des batailles sur du papier blanc ; ou les politiques des clubs qui veulent conduire les hommes & diriger toutes les passions avec des formules. Nous avons eu occasion de le dire ; l'homme inconsideré ou mal-adroit qui veut répandre des pratiques nouvelles, fait retrograder la science, en décréditant ce qui seroit bon en d'autres mains & en d'autres circonstances.

ressort, tout comme nous le faisons nous-mêmes à d'autres égards. Or rien n'est plus ridicule aux yeux d'un paysan qu'un Monsieur qui, un livre à la main, prétend l'instruire de ce que lui-même a pratiqué d'enfance. Fut-il convaincu par le réformateur, il n'oseroit l'avouer à ses camarades de peur d'être ridicule à son tour. S'il est franc, il montre sa répugnance à suivre ce qu'il croit un caprice; s'il est rusé, il se tait, & ne fait précisément que ce qui est nécessaire pour n'être pas pris en faute. Il s'établit bientôt une ligue sourde contre celui qui paye & croit commander; & chacun résiste jusqu'au point où son intérêt pécuniaire le permet. Si le maître est foible, il se lasse, & il abandonne son plan en admirant la fatalité qui l'a contrarié, tandis que ses domestiques le croient guéri d'une espèce de maladie qui a fait son cours. Si le propriétaire est un homme ardent, emporté, opiniâtre, il se tourmente à gronder à toute heure, sa maison est un théâtre de querelles, il congédie ses gens, il change d'ouvriers tous les jours, & les mêmes fautes reproduisent sans-cesse les mêmes difficultés. Si le nouveau possesseur a du caractère & de la sagesse, l'expérience l'instruit & ne le rebute point; il sent qu'il s'y est mal pris, & l'apprentissage qu'il a fait le dirige pour l'avenir: mieux eut valu encore profiter de celui des autres.

L'expérience ne se supplée point dans un art qui consiste en faits, & où l'exécution est un véritable métier.

Après l'étude des livres il y a mille détails qu'on croit connoître, & sur lesquels on se trouve ignorant lors de l'épreuve. Il y a mille choses qu'on voit faire tous les jours, & qu'on croit faciles jusqu'au moment où on les essaye. Il faut savoir mettre la main à l'œuvre pour se rendre capable de diriger le travail : car rien ne donne plus de crédibilité que le talent de faire soi-même, comme rien n'apprête tant à rire à qui reçoit des ordres que les bévues de qui les donne. Le nouvel agriculteur débutera donc avec défiance, pour avoir moins à décomp-ter. Il observera avec attention ; il consultera autour de lui ; il écoutera avec déférence. Il cheminera non point avec timidité, mais avec mesure ; il saura se servir des instrumens qu'il a à sa portée ; il ménagera les préjugés ; il flattera le courant jusqu'à-ce qu'il se sente assez fort pour le maîtriser. (1)

(1) Le pere de l'agriculture française nous a laissé de bonnes instructions sur ces objets. « Pour un préalable donques, nostre Pere de famille sera averti de s'estudier à se rendre digne de sa charge ; afin que sçachant bien commander ceux qu'il a sous soi, en puisse tirer l'obéissance nécessaire, (ce qui est l'abrégé du menage) taschant pour en venir là, de changer, ou du moins d'adoucir les humeurs qu'il pourroit avoir

(14) AGRICULTURE.

Cet apprentissage lui fera plutôt amusant que pénible, & chacun s'empêchera de le lui abrégier : car, par une foiblesse remarquable chez les gens de la campagne, on y fait gré à celui qui n'est pas né payfan de vouloir bien descendre à travailler la terre de ses mains. En conversant avec ceux dont il partage la peine, il aura beaucoup à apprendre, s'il fait donner aux informations leur valeur, distinguer les faits dans la foule des assertions hasardées, & découvrir les points lumineux de la vérité au travers du nuage de préjugés qui les obscurcit. S'il a le bonheur d'être secondé par un agent probe, intelligent, actif, il réussira à le faire concourir à ses vues, en lui accordant de la confiance, & en lui laissant toujours le mérite d'inventer ce qu'il en désire. Enfin, lorsque le temps, les connoissances exactes, l'ac-

contraires à tant louable exercice, par n'y estre né. » (Théâtre d'Agriculture, pag. 25, édit. de 1600.)

« Orné que soit le pere de famille de telles qualités, & rendu sçavant en tous les termes du ménage, commandera hardiment ses gens, lesquels lui obéiront d'autant plus volontiers, que par expérience cognoistront ses ordonnances estre & raisonnables & profitables : & pour la bonne opinion qu'ils auront conceuë de sa suffisance, travailleront de bon cœur & sans murmure, ce qui communément n'avient quand les mercenaires sont sous la charge d'un qui n'entend ce qu'il veut faire. . . . » (pag. 28.)

accomplissement de ses devoirs de maître, auront donné de la consistance à ses idées auprès de ceux qu'il emploie, il pourra changer à son gré sa culture, introduire des méthodes utiles, donner des exemples qui seront suivis.

Cet accomplissement des devoirs de maître, indispensable pour obtenir la réussite, l'est encore pour consolider l'ouvrage. En vain le propriétaire auroit donné à son édifice un fondement solide, s'il n'en soignoit la construction, & n'en surveilloit l'entretien. Or ici la justice exacte, les attentions paternelles ne suffisent point, il faut de l'adresse. La vigilance du maître embrasse tout; mais s'il est sage il fait souvent ne point voir : car en voulant tout exiger on compromet ce qu'on peut obtenir. Il n'oublie jamais qu'il faut plus de vertu pour remplir les obligations d'une vie active, lorsqu'on n'est point soutenu par l'esprit de propriété; & il ne néglige pas de joindre au mobile de l'intérêt le sentiment de l'honneur, ce véhicule magique qui donne un prix à l'approbation du maître, & allège toujours la peine, même alors qu'il l'accroît. On a dit quelquefois que s'il importe à la paix que les domestiques ne soient pas divisés, il importe à la sûreté qu'ils ne soient pas trop unis. Le maître bienveillant & habile ne craint point ces ligues dont s'effrayent ceux qui isolent leurs intérêts de ceux de leurs gens. Il apprécie la moralité

de chacun des siens ; il les veut honnêtes pour n'avoir pas à s'en défier, mais il s'en défie assez pour ne les tenter jamais. Enfin il ne les commande point trop , afin d'en être toujours obéi , & met dans ses manieres avec chacun d'eux ces justes nuances qui tendent à obtenir le plus , avec le moins d'efforts.

L'ordre le plus strict regne dans sa maison , pour ôter à ceux qu'il occupe jusqu'à la possibilité des gains illicites. L'économie sage , cette branche essentielle de l'ordre , qui ressemble aussi peu à l'avarice , que la profusion à la générosité , fait une des bases de son régime intérieur. Dans une bonne administration rien ne se perd ; & le cultivateur doit imiter la Nature qui opere toujours aux moindres frais , & qui employe à reproduire tout ce que la consommation n'absorbe pas.

Est-ce donc là , va-t-on s'écrier peut-être , est-ce donc là une vie de liberté , d'aïse & de calme , où l'on est astreint à tant d'observances de détail , & où l'on achete d'un dévouement pénible & continu une réussite que mille accidens peuvent contrarier ? — A quoi bon cet échaffaudage de précautions & de soins lorsqu'on peut jouir de la vie agricole à la maniere des bonnes gens qui n'ont jamais réfléchi sur les prétendus devoirs du cultivateur ; qui suivent le sentier battu , font comme ils ont vu faire , & n'en font que plus heureux ?

Convenons

DE LA VIE AGRICOLE. (17)

Convenons , avec ceux qui objectent ainsi , que l'humble laboureur , cultivant le champ de ses peres , n'a nul besoin de nos instructions : que le propriétaire , ou le fermier intelligent , accoutumé d'enfance au train rustique , exécute ce que nous venons de prescrire ; mais c'est sans s'en douter , peut-être , c'est avec une aisance si naturelle qu'elle dérobe l'art à l'observateur. Convenons encore que l'homme paresseux , apathique , qui va chercher aux champs le plaisir *del dolce far niente* , ne sauroit s'accommoder de nos recommandations : mais , aussi , qu'il se garde de se mêler d'agriculture ! l'exploitation d'un domaine ne seroit pour lui qu'une source de chagrins ou une occasion de ruine ; peut-être l'un & l'autre (1).

Pourquoi ces idées de gêne , d'ordre strict ? dira-t-on , encore , pourquoi ce mot sévère de devoir , lorsqu'on traite d'une occupation qui doit n'être qu'un délassement , qu'un plaisir ? — Ce seroit avoir une bien fausse idée des choses que d'espérer s'affranchir de la loi générale qui fait acheter les jouissances par le travail ; & c'est encore une erreur commune que d'asso-

(1) « Ne se mesle donques du menage celui qui ne se résoudra à ce point , que de conduire lui mesme ses domestiques & manœuvres , comme le Capitaine ses soldats ; de peur que cuidant espargner sa peine , il ne tombe en honteuse confusion. » (Théâtre d'Agriculture , pag. 29.) —

oier une idée triste à celle du devoir. Les notions exagérées de liberté , sans soustraire l'individu , mieux que les peuples , à la dépendance des choses , le mènent aussi à l'esclavage des passions. L'homme trop libre devient inquiet ; le temps lui pèse ; l'ennui le gagne ; le désœuvrement le conduit au vice ; & les maux communs à tous lui paroissent plus douloureux. Mais celui qui se voue aux occupations réglées de la vie agricole , qui se commande la peine , qui s'impose des soins , trouve des intervalles pour le plaisir. Le repos lui est doux ; la méditation le charme ; il jouit en souvenir comme en projet. Les chagrins factices lui sont étrangers ; les maux réels ne l'accablent point : car le travail distrait plus puissamment encore que la philosophie ne console. L'habitude de certains devoirs le dispose à remplir tous les autres : car les obligations morales se prêtent dans leur exercice un mutuel secours , & sont unies par une chaîne qu'on ne sauroit rompre. Enfin l'agriculteur suit la destination primitive des humains ; il se sent dans les voies de la Nature , il y marche avec délice & confiance ; & si le Ciel l'a favorisé dans les relations les plus chères au cœur de l'homme de bien , il ne peut manquer à sa félicité que d'en connoître tout le prix.

“Ease and alternate labour, useful life,

Progressive virtue, and approving HEAVEN,”

THOMSON,

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (19)

SOME NOTES CONCERNING LUCERN. Quelques observations sur la Luzerne. (Tirés des Annales D'ARTHUR YOUNG, XXV^e. vol.)

APRÈS les volumes qu'on a imprimés sur la culture de cette plante, (1) les bonnes gens imaginent que toutes les circonstances qui y ont rapport doivent être connues de manière à ne laisser aucun doute à celui qui veut l'étudier. Les opinions sont, au contraire, si divisées sur les faits, que ceux ci ont presque tous été contredits. — Ce n'est pas mon affaire

(1) Les étrangers nous complimentent beaucoup sur notre agriculture ; mais quand ils entrent dans quelques détails, ils prouvent leur extrême ignorance sur cet objet. On a cité la luzerne comme une des bases de la culture anglaise. (*Les intérêts de la France mal entendus*, vol. I. pag. 144—149.) Un autre lui associe les lupins & cedrangola. (*Zanoni dell' agricoltura*, tom. I. p. 118.) Il est en quelque sorte excusable, puisqu'un homme du pays a fait la même faute. (*Parullo. Essai sur l'amélioration des terres.*) Un autre parle de l'amélioration de nos races de brebis par l'usage du sain-foin ; autant auroit valu dire, par l'usage des champignons. (*Avantages & défavantages de la France & de la Grande-Bretagne*, 1754. p. 112.) (A)

(20) AGRICULTURE.

que d'examiner les assertions contradictoires. Je veux simplement donner des directions sur la manière de cultiver la luzerne (1), par lesquelles on ne puisse que réussir, si on les suit exactement (2).

SECTION I.

Du sol propre.

Il est plus aisé de dire quelles sont les terres

(1) Pour les procédés généraux, voyez (*Bier's exp. in ag. rep. to Dub. Soc. pour 1766. p. 43.*) (A)

(2) Il paroît par les anciens auteurs de *Re Rustica*, que la luzerne étoit un objet important dans l'agriculture des Romains; mais cette culture déclina avec l'Empire. On voit, par un passage de *Mathioli*, qu'elle étoit peu connue en Italie de son temps: "*Verum etsi hæc quondam in universa Italia sereretur ad pecorum pabulum et omnibus fere cognosceretur; nunc tamen pauci sane reperiuntur qui medicam viderint, ne dum serant, quanquam non defunt qui eam se consecutos existiment. Sed cum ab amicis hoc anno semen accepissem, illudque magna cum diligentia terræ mandassem, accidit, solo forsitan repugnante, ut nulla exorta sit planta.*" (Comment. in *Dioscoridis*, cap. cxli p. 305.)

— *Crescenzio*, dont le livre fut publié à Florence en 1478, n'en parle point; & *Tull*, qui voyagea en Italie en 1711, observe qu'il ne vit pas de luzerne au-delà des Alpes. Nous la devons peut-être à *Child*, qui avoit examiné cette culture en France. Il dit expressément qu'on n'en connoissoit pas même le nom en Angleterre jusqu'au moment où il en parla à *Hartlib* dans ses lettres. [*Hartlib's Legacy*, 1650, p. 157. *Tull's horshoeing husb.*; folio p. 92.] (A)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (21)

qui ne conviennent pas à la luzerne, que d'indiquer celles qui y sont propres. Il ne faut la hasarder dans aucune terre qui retienne l'eau, car la plante meurt, ou souffre beaucoup dès qu'elle atteint une couche qui est saturée d'eau. Les graviers humides; les glaïses qui abondent en fources; les sols tourbeux qui ne sont pas desséchés à une grande profondeur, les luts de peu d'épaisseur qui recouvrent le roc, (1) & enfin les sables arides, ne conviennent nullement à cette plante. — Les terres où elle réussit le mieux sont les terres végétales profondes, riches, & friables, soit sablonneuses, soit graveleuses. En un mot tous les sols riches & secs, (2) n'importe que le climat soit froid (3).

(1) Sir Digby Legard a trouvé qu'elle réussissoit mal dans les bois défrichés. (*Six Months tour*, vol. II. p. 29.) (A)

(2) *Te quoque Medica putres accipiunt sulci.* (Virg.) Voyez aussi Varro *De Re Rustica*, lib. I. c. 41. — La description de De Serres est exacte: « choisira quelque endroit de sa meilleure terre, plus sablonneuse qu'argilleuse, plus légère que pesante, plus plate que pendante; toutes fois vidant les eaux à ce qu'elles n'y croupissent. » Théâtre d'Agriculture, p. 239. — Un autre auteur Français a raison de dire: « elle languit dans les terres fortes & dans les terres légères. » *Prairies artificielles*, 3^{me} édit. p. 139. — Rocque étoit tout-à-fait dans l'erreur, lorsqu'il parloit des terres fortes & de la glaïse comme convenables à la luzerne.

SECTION II.

De la préparation.

Comme le grand art de la culture de la luzerne consiste à maintenir les plantes exemptes de mauvaises herbes, surtout dans le commencement, il importe de préparer le sol de manière à empêcher la végétation de toutes les plantes nuisibles. Il en coûte beaucoup moins pour empêcher les mauvaises herbes de naître, que pour les détruire. Chaque shelling employé à nettoyer la terre en commençant, en épargnera cinq qu'il faudroit ensuite appliquer aux sarclages. Je recommanderois donc, par cette raison, deux récoltes successives de turneps ou de carottes comme la meilleure préparation possible; mais comme le chariage des turneps, pour peu que le sol soit humide, nuit à cette friabilité qui est convenable pour la luzerne, il faut faire manger sur place les turneps en automne, & labourer ensuite immédiatement.

(*Practical Treatise on Lucern.* 1795. pages 17-21.)

— Cependant il n'y a point de règle sans exceptions, car nous avons un rapport authentique qui certifie que la luzerne avoit réussi dans une terre forte & argilleuse. (*Practical Observations Com. to Dr. Templeman*, 1766, 8°. p. 3.) (A)

(3) *Miller's Gard. Dict. art. medica.* 1

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (23)

Les carottes ne sont pas sujettes à cette objection, parce qu'elles doivent être arrachées avant l'hiver, & que les sarclages continuels qu'elles exigent nettoient admirablement la terre. Si le cultivateur préfère de préparer sa terre par une jachère, il faut qu'il ait soin de faire suivre la charrue ou la herse à chaque façon, d'un homme muni d'une fourche de fer à quatre pointes & d'un panier, pour ôter ou arracher toutes les racines ou mauvaises herbes, qui restent sur le terrain, ou que la charrue n'ôte pas, faute d'aller assez profond. La dépense de ce procédé est peu de chose, & l'effet en est très-considérable, surtout quand la terre est humide. On peut employer également les carottes, les turneps, où les choux, comme récoltes préparatoires; mais je pense qu'il en faut deux de suite, si ce n'est de la même plante, du moins deux récoltes sarclées.

Au printemps, avant que de semer, il faut labourer trois fois, & herse suffisamment pour bien pulvériser la terre.

Si l'on fume, ce qui n'est pas absolument nécessaire, ce doit être avec la première des deux récoltes sarclées. (1)

(1) Ces dispositions pour purger & ameublir la terre sont admirablement calculées pour les grandes exploitations; & pour les pays où la méthode des sarclages est généralement connue & pratiquée. Mais ailleurs,

(24) : AGRICULTURE.

SECTION III.

De la maniere de semer.

Le champ une fois préparé, le fermier doit choisir la maniere dont il veut cultiver sa lu-

on se trouveroit mieux peut-être d'aller au même but par le labour à la bêche, ou même par le minage, dont les frais, quoique considérables, sont bientôt amplement payés par le produit d'une luzerniere bien établie. Il y a dans ces deux méthodes, & sur-tout dans la dernière, un avantage qui manque nécessairement à la préparation par les labours ordinaires, quelque multipliés qu'ils soient : c'est que le pivot de la racine gagnant dès la première année toute la profondeur de la terre remuée, la plante se trouve en état de résister à la sécheresse du mois d'août de cette première année, si l'on a miné, ou seulement labouré à la bêche ; au lieu que si la terre n'a été remuée qu'à quatre ou cinq pouces par la charrue, la racine perçant lentement & difficilement le sol inférieur, la luzerne reste exposée aux sécheresses des deux premières années, qui lui font souvent un tort irréparable, parce que tandis qu'elle languit, les gramens prennent le dessus. Il faut observer que l'Angleterre étant moins sujette aux sécheresses que les pays pour lesquels nous écrivons, la méthode préparatoire, recommandée par l'auteur, peut bien être généralement préférable pour son pays. Mais nous n'hésitons pas à croire, d'après des expériences & des observations répétées, que lorsqu'il s'agit d'établir une luzerniere, à portée de la maison & en terre convenable, il y a

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (25)

terne. Il y a trois méthodes. 1°. A la volée, 2°. au semoir ; 3°. la transplantation (1). Ces trois méthodes ont réussi à différentes personnes si bien , qu'il ne nous est pas permis d'en condamner aucune comme peu profitable. C'est aux circonstances à décider du choix. Si le fermier doute de pouvoir donner des soins très-suivis à ses sarclages , ou aux travaux de la houë à cheval , il doit préférer de semer à la volée ; ainsi que dans le cas où il se contenteroit d'une durée de dix ou douze ans pour sa luzernière.

beaucoup à gagner à faire d'abord tous les sacrifices nécessaires , parce que les produits d'une luzernière bien établie & qu'on fait manger en vert , sont énormes. (R)

(1) Un cultivateur pratique est tenté de rire lorsqu'il entend parler , pour la première fois , de transplanter la luzerne. Cependant , après avoir lu les ouvrages de Duhamel , de Châteaueux , & sur-tout du Chanoine Harte , (*Essays on Husbandry*) on est disposé à croire que cette méthode peut être profitable ; & de nombreux essais l'ont prouvé en Angleterre. Le Rédacteur de l'article de l'agriculture dans ce Journal , ayant consulté A. Young sur cette méthode , en reçut pour réponse : "*It is a pretty thing for a man who has one acre of land ; a folly at large.*" "C'est une jolie culture pour celui qui n'a qu'un acre de terrain , mais en grand c'est une folie." — Cela peut servir à diriger ceux qui , après la lecture des ouvrages cités , prendroient envie d'essayer la transplantation. (R)

(26) AGRICULTURE.

Mais lorsqu'on a la volonté & les moyens de maintenir la récolte parfaitement nette de mauvaises herbes , & qu'on veut établir la luzernière pour un grand nombre d'années , il faut préférer le semoir. (1)

La méthode de la transplantation inventée par Mr. de Châteaueux , & traitée d'une manière utile , & très-savante , par feu Mr. Harte , est particulièrement applicable dans deux circonstances : 1°. lorsque le sol est sec à la profondeur de trois pieds , & ensuite très-humide. Dans un tel sol , la luzerne qui pivote librement , ne tarde pas à périr (2). 2°. Lorsque la terre est d'une très-grande fertilité. Dans une telle terre , il faut que les plantes foyent plus rares ; & aucune méthode ne permet de les espacer aussi également que la transplantation.

(1) Voyez *Mill's Practical Treatise of Husbandry* , pag. 350.

(2) Pour entendre ceci , il faut savoir que la théorie de la transplantation est fondée sur ce que les racines latérales augmentent en nombre , en force & en étendue , lorsque le pivot est coupé , comme on le fait en transplantant ; & qu'alors la plante tire sa substance des couches supérieures de la terre , dont la fertilité est entretenue par des travaux constants à la houë : au lieu que la luzerne , abandonnée à elle-même , pénètre dans la terre , jusqu'à douze ou quinze pieds , & n'est gueres arrêtée que par l'eau , la glaise pure , ou le roc. Feu Mr. Ch. Bonnet nous a dit en avoir vu sur les bords de l'Arve qui avoient jusqu'à 66 pieds de longueur. (R)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (27)

J'ai vu à Henley, sur la Tamise, des plantes d'une luzernière transplantée, dont la couronne avoit de douze à seize pouces en quarré; dimensions presque incroyables. (1)

SECTION IV.

Du temps où il faut semer.

Soit qu'on sème à la volée, ou au semoir, c'est depuis la fin de mars, & par tout avril qu'on doit semer. On peut également semer dans tout le mois de mai (2); cependant on court plus de chances, non-seulement à cause des

(1) Mr. Bowden en a observé de dix-huit pouces en quarré. (*Farmer's Director*, p. 76.) (A)

(2) L'auteur omet ici une circonstance très-importante pour les pays où les gelées blanches du printemps sont à craindre, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Aucune plante, dans les premiers temps de la levée, ne craint plus les gelées blanches que la luzerne. Dans tous les cantons où l'on est sujet aux retours de froid dans le mois d'avril, on ne doit donc semer que du dix au quinze mai. La terre étant plus chaude à cette époque, la levée & l'accroissement de la plante sont plus rapides, & on regagne bientôt le temps perdu. Il est vrai qu'on court le risque des pucerons qui quelquefois dévorent la levée dans trois ou quatre jours; mais cela est beaucoup plus rare dans le mois de mai que dans le mois d'août ou de septembre, temps où l'on sème aussi quelquefois la luzerne. (R)

(28) A G R I C U L T U R E .

séchereffes, mais à cause des pucerons qui attaquent la jeune plante dès qu'elle sort de terre. Lorsqu'on projette de transplanter, il faut également semer de bonne heure, afin d'avoir au mois d'août des plantes suffisamment fortes.

S E C T I O N V .

De la quantité de semence.

Lorsque l'on sème à la volée, la quantité la plus convenable est de 20 livres par acre (1) — Le procédé suivi pour nettoyer la luzerne est très-sévère; ainsi une luzernière, semée déjà trop clair, pourroit en être trop éclaircie.

Au semoir, on emploie 6 liv. par acre, en laissant les lignes à deux pieds; ainsi l'on peut compter 8 liv. pour 18 pouces de distance, 12 liv. pour un pied, & 18 liv. pour 9 pouces.

(1) En France on sème la luzerne plus épais; on met vingt livres par arpent de cent perches, ce qui fait à-peu-près trente livres par acre anglais. (*Prairies artificielles*, p. 146.) (A) — Lorsqu'on n'est pas en position de donner tous les soins nécessaires, en sarclages, herfages, &c. à la luzerne dans les premières années, il convient particulièrement de semer épais, parce qu'elle étouffe plus sûrement les mauvaises plantes, dont, au contraire, elle est bientôt étouffée si elle est négligée après avoir été semée clair. (R)

SECTION VI.

Faut-il semer avec du grain ou sans mélange ?

Après une longue expérience , & un grand nombre d'essais , je recommande de semer avec du grain.

L'avoine doit être préférée à l'orge , je pense , parce qu'elle est moins sujette à ne donner que du grain retraits lorsqu'elle est semée clair. (1)

(1) Cette raison de préférence peut être très-bonne lorsqu'on a suivi toutes les précautions préparatoires indiquées par l'auteur , parce qu'alors il ne leve de mauvaises plantes que celles dont les graines déposées depuis long-temps dans la terre , ont été fortuitement ramenées près de la surface par le dernier labour ; mais lorsque toutes les précautions indiquées pour nettoyer la terre à l'avance n'ont pas été suivies , il y a une beaucoup meilleure raison de préférer l'avoine , pourvu qu'on ne la laisse pas mûrir : c'est qu'en la coupant en vert , on empêche que les mauvaises plantes n'aient le temps de porter leur graine & de la répandre , ce qui arrive toujours lorsqu'on sème de l'orge avec la luzerne , & qu'on laisse mûrir la première. En général , on doit regarder la réussite parfaite d'une luzernière comme d'une importance si grande , comparativement à une récolte d'orge , qu'on ne doit pas hésiter à sacrifier celle-ci , qui jamais , au reste , ne peut être qu'une demi-récolte , parce qu'il faut la semer extrêmement clair , si l'on ne veut pas étouffer la luzerne. (R)

Si la terre est très-fertile, six pecks par acre, très-bien semés, peuvent suffire ; mais si le sol n'est pas riche deux bushels, & s'il est pauvre trois bushels, ne feront pas trop. Après que l'avoine est semée & hersée, on sème la luzerne qu'on enterre avec une herse légère. Je recommande la même méthode lorsqu'on se sert du semoir : c'est-à-dire de ne faire passer le semoir qu'après avoir semé l'avoine & hersé.

Lorsque l'on sème en pépinière pour avoir des plantes de luzerne à transplanter, ce doit être sans mélange de grain, parce que l'espace est petit, & qu'on peut aider à la croissance des jeunes plantes avec une petite houë comme celle que les jardiniers employent pour les oignons.

S E C T I O N VII.

Distance entre les lignes.

Lorsqu'on cultive la luzerne au semoir, on doit proportionner la distance des lignes à la nature du terrain (1). Sur un sol riche un pied, sur une terre moins bonne neuf pouces de distance entre les lignes peuvent convenir. Cette direction ainsi posée d'une manière générale doit suffire, sans chercher à assigner les distances avec plus de précision. Mais si l'on en

(1) *Baker's Experiment. in Agr. rep. to Dub. soc. fr 1765, p. 20. (A)*

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (31)

vouloit d'avantage , je dirois un pied de distance pour les terrains dont la rente est de 30 shellings l'acre, & 9 pouces pour ceux de 20 shellings. Je ne crois pas devoir recommander beaucoup cette culture dans les terres d'une valeur moindre ; mais il peut y avoir des exceptions. — Il y a une raison pour préférer la distance de neuf pouces, c'est qu'on se rapproche ainsi de la méthode de semer à la volée, méthode soutenue par un grand nombre de cultivateurs expérimentés (1) & qu'en même temps cependant, au lieu de herfer au hasard, on peut donner la culture à la houe à cheval avec un soc étroit.

S E C T I O N V I I I .

Soins de la luzerne semée à la volée , pendant sa végétation.

Après la moisson du grain, il faut avoir soin de ne pas laisser entrer le bétail dans le champ.

(1) Plusieurs des partisans du semoir y reviennent eux-mêmes. Ainsi Mr. Baldwin, qui préféroit beaucoup le semoir pendant plusieurs années, & qui avoit inventé, pour nettoyer les luzernières, ces instrumens dont il est tant question dans l'ouvrage *De Re Rustica*, a abandonné enfin tous ses instrumens, & est revenu à préférer la méthode plus simple de semer à la volée, ainsi qu'il l'avoue à Mr. Peters. (*Winter Riches*, p. 170.) (A)

En temps très-sec on peut le laisser pâturer aux jeunes bêtes. L'année suivante, après la seconde coupe il faut herfer la luzerne à la manière de Mr. Rocque ; (1) mais non pas d'une manière si rude qu'on pourra le hasarder ensuite. (2)

à

(1) C'est une méthode usitée parmi nos bons cultivateurs, & dont l'auteur ne parle point ici, que de recouvrir la luzernière, dans l'arrière-automne de la première année, avec du *compost*, ou terreau préparé en tas à portée du champ une année à l'avance, puis de herfer au printemps avant la pousse, pour faire pénétrer l'engrais. Cette opération à laquelle on croyoit, en quelque sorte, le succès de la luzernière attaché, & qu'on répétoit, au moins tous les deux ans, ne paroît plus nécessaire depuis que nous avons l'usage du gypse, qui fait sur la luzerne, à moindres frais, un effet encore plus marqué. Cette pratique, peu connue jusqu'ici en Angleterre, commence à l'être, du moins pour les trèfles, à l'égard desquels son utilité est encore plus étendue, parce que la culture en est plus commune. Nous ferons connoître incessamment des expériences très-concluantes sur la valeur de cet engrais salin. (R)

(2) Pline recommande même de labourer la luzerne, ce qu'en effet on peut très-bien hasarder avec un soc arrondi. Il dit : « Si les mauvaises plantes prennent le dessus, la seule ressource c'est de labourer le terrain pour les faire toutes périr. » Hist. Nat. liv. 18. cap. 16. — *Tull* cite l'exemple d'une plante tourmentée par la charrue pendant vingt-deux ans, & qui étoit encore vigoureuse. (*Horse hoeing-husbandry*, p. 96.) Le labour & le herbage de Rocque sont donc d'anciennes pratiques.

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (33)

A la troisieme année, & à chacune des années suivantes, il faut herfer deux fois : la premiere en mai ou juin, la seconde en août ou septembre. Cette opération doit être faite avec une herse si pesante que quatre chevaux puissent à peine la traîner ; & cette herse ne doit pas prendre plus de quatre ou cinq pieds de largeur. Les mauvaises herbes, arrachées par cette opération, doivent être rassemblées & emmenées, puis le rouleau usité pour l'orge doit être passé pour unir le terrain, & le préparer à la faux. Lorsqu'en automne il reste sur pied une récolte qui ne peut parvenir qu'à moitié hauteur, il ne vaut pas la peine de la faucher, on la fait pâturer par des bêtes à cornes.

S'il y a des places claires, on répand deux livres par acre de graine dans les endroits qui en ont besoin, avant que de passer la herse.

SECTION IX.

Soins pendant la végétation de la luzerne semée au semoir ou transplantée.

Dans l'automne qui suit la récolte du grain, si l'on voit bien nettement les lignes de la luzerne, il faut passer la houe-à-cheval entre les lignes pour arracher les mauvaises herbes, &

(*Practical Treat. on Lucern*, p. 28-31.) D'autres ont vérifié les mêmes faits. (*Mill's new & compleat system of practic. husb.*, p. 279.) (A)

Agriculture, Vol. 2. N°. 1. Janvier 1797. C

ameublir le sol; puis il faut repasser avec la houe à bras pour achever de nettoyer les lignes. L'année suivante, le fermier doit être extrêmement occupé de ses cultures à la houe. Dès que la terre est assez sèche au printemps pour y entrer, il faut le faire, & continuer tout l'été en faisant succéder le *cultivateur* (1) & la houe aussi souvent qu'il reparoit la moindre mauvaise herbe. Il faut que la terre soit rigoureusement nette (2). Mais c'est surtout d'abord après avoir fauché que les mauvaises herbes paroissent le mieux & que l'opération de la houe est le plus utile.—Quand à la luzerne transplantée, elle demande une culture ou deux dans l'automne qui suit la moisson; mais dans l'année suivante il lui faut les mêmes soins qu'à celle qui est semée au semoir.

Tant que la luzerne est en plein rapport, on doit avoir pour règle de houer toutes les fois que les mauvaises herbes se montrent, & immédiatement après la coupe. Si les lignes sont bien droites, (& elles doivent l'être) le *cultivateur* fera d'un très-grand usage, parce

(1) La houe à cheval. (R)

(2) Même sous le Soleil brûlant d'Italie, Plin disoit: « Si le sol où la *Medica* croît est humide, & sujet à l'herbe, cette plante est bientôt étouffée, & alors il se forme un pré. *Histotre Naturelle*, lib. 18. cap. 16. (A)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (35)

qu'on peut le faire passer si près des lignes qu'il ne restera presque rien à faire à la main ; si ce n'est pour les mauvaises herbes qui croissent entre les plantes de la luzerne , ouvrage auquel une houe fourchue est particulièrement propre.

On ne doit jamais laisser les mauvaises herbes prendre possession de la terre , en retardant la culture pour ne pas salir la récolte ; car si celle-ci est aussi abondante qu'elle doit l'être , & si les lignes sont rapprochées en proportion de la richesse du sol , cette difficulté ne sera jamais réelle. Cela n'arrive que lorsque la distance d'une ligne à l'autre est plus grande que la fertilité du sol ne le permet.

SECTION X.

De la végétation hative de la luzerne.

On peut compter sur cette plante , au printemps , avant aucune autre (1) , pour la nourriture des brebis & des agneaux ; car dans les pays chauds elle donne dès le 20 mars une quantité notable de fourrage , & continue à en fournir abondamment tout le mois d'avril qui est la saison de l'année où le propriétaire de troupeaux est le plus embarrassé à les nourrir. Comme chacun calcule d'ordinaire sa provision de fourrage pour aller jusqu'au milieu ou à la

(1) *Harte's Essays on husb.* Ess. II. p. 138. *Baker's exp. in ag. rep.* Dub. Soc. for , 1766. p. 61. (A)

(36) AGRICULTURE.

fin de mai, on ne trouvera pas de perte à abandonner une coupe qu'on fait pâturer aux brebis. — Il faut prendre garde, cependant, de ne pas tenir le troupeau dans la luzernière assez long-temps, ou en nombre assez considérable pour faire manger la plante jusqu'à la couronne, ce qui nuirait à la luzerne ; mais cela n'arrive pas, aussi long-temps que les moutons trouvent à brouter des rejettons un peu élevés.

SECTION XI.

Des coupes de la luzerne.

Le meilleur moment pour couper les prés naturels ou artificiels est celui de la pleine fleur ; mais cette règle ne peut s'appliquer qu'aux coupes de foin. La luzerne doit se manger uniquement en vert, & en conséquence, il faut en couper tous les jours une portion telle que les coupes ne foyent jamais arrêtées. Les luzernières semées à la volée ne croissent pas si promptement que celles qui sont établies par les deux autres méthodes. Les premières ne donnent gueres que trois coupes pleines dans les six mois d'été ; il faut donc les diviser en soixante portions, & en couper une tous les jours. Les luzernières transplantées, ou au semoir, peuvent se diviser en quarante portions ; & celles qui sont en terre extrêmement fertile peuvent même se couper tous les trente jours.

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (37)

De cette manière, qui doit être calculée sur la rapidité de la croissance, le propriétaire aura toujours de la luzerne prête à faucher. — Cette plante croît avec une extrême promptitude dans un bon terrain; elle fait un jet de dix-huit pouces dans trente ou quarante jours, & donne cinq bonnes coupes entre avril & septembre.

On a recommandé la faucille pour couper la luzerne transplantée; & lorsque les lignes sont à trois pieds de distance, cet instrument est nécessaire. Mais je ne conseille nullement une distance si considérable, & la faux fait le même effet, avec une dépense qui est au-dessous du quart des frais de la faucille. Il faut charger la luzerne sur une charrette à un cheval, & la conduire promptement à l'étable.

SECTION XII.

De l'engrais pour la luzerne.

Toutes les fois que le sol n'est pas d'une fertilité extrême il faut fumer la luzerne. Le fumier pourri est l'engrais qui lui convient le mieux. Vingt tonnes par acre, une fois sur cinq ou six ans, est une quantité très-suffisante. Si l'on manque de fumier, les cendres ou la fuye peuvent le remplacer; mais comme ces engrais favorisent la végétation des trefles naturels, on a ensuite de la peine à considérer ces plan-

tes, d'ailleurs excellentes, comme de mauvaises herbes, & à les traiter comme telles.

SECTION XIII.

Produit.

Le produit d'une coupe de luzerne, comme de toute autre plante, doit nécessairement dépendre de la nature du sol & des soins; mais si un acre de luzerne, quelque soit le mode de culture qu'on ait choisi, ne nourrit pas trois chevaux, depuis la première coupe jusqu'à la fin de septembre, le sol est mauvais, où la conduite de la luzernière est défectueuse : c'est le moindre produit qu'on doive attendre; & il s'élève quelquefois assez pour nourrir six chevaux pendant le même espace de temps, lorsque le sol est très-riche, & les soins très-bien entendus. Si l'on n'y met pas les moutons au mois d'avril, la première coupe se fait dans la première semaine de mai; par conséquent le produit dure vingt semaines : & si l'on compte la nourriture d'un cheval à 2 shel. 6 den. par semaine, le produit d'un acre seroit de 15 L. sterl. — Mais cela est rare, & il faut compter, pour la moyenne du produit de ce fourrage, que quatre chevaux peuvent être bien nourris par un acre, ce qui revient à 10 L. sterl. & prouve que cette production est extrêmement profitable.

Il est, je crois, plus avantageux de faucher

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (39)

Souvent que de laisser mûrir la luzerne assez pour faire du foin : mais si les circonstances indiquent cet emploi, il est aussi très-avantageux ; car dans trois coupes, un acre bien entretenu donne quatre tonnes de foin sec, & même cinq ; or, quoique cela n'excede gueres deux coupes de trefle, comme cette dernière plante ne dure qu'un an, & que l'on fait durer la luzerne tant qu'on veut, celle-ci a une très-grande supériorité.

Dans quelques parties de la France on compte qu'un acre de luzerne rend plus que six acres de bonnes prairies (1), dans d'autres parties autant que trois acres de pré (2), & si l'on réduit ce fourrage en foin, on compte qu'il en rend annuellement 7500 liv. par arpent (3) :

(1) *Duhamel Elem. d'Agriculture.* (A)

(2) Corps d'observations de la Société d'Agriculture de Bretagne pour 1759 & 1760, p. 36. (A)

(3) *Prairies artificielles*, p. 127. 500 bottes à 15 s. la botte ; mais il dit que le trefle, appelé en Normandie *tremène*, dans le pays du grand Caux, près du Havre Montevillers & Fescamps, produit 800 bottes de 15 sols l'acre ; *Ibid*, p. 193. Mais cet acre est plus grand que l'arpent : il est de 160 perches de 22 pieds, p. 196. Il parle encore ailleurs d'un trefle qui donne jusqu'à 1000 bottes par arpent, ce qui feroit plus de huit tonnes par acre anglais. Nous n'avons point de pareilles récoltes en Angleterre, & je ne crois pas non plus qu'il y en ait de pareilles en France. p. 128. (A)

(40) AGRICULTURE.

comme l'arpent est à-peu-près les trois quarts de l'acre anglais, c'est plus de quatre tonnes par acre. Mais ils ont eu des récoltes qui ont monté à 20,000 livres pesant de foin par arpent : c'est-à-dire neuf tonnes par acre anglais (1).

En Italie on coupe la luzerne tous les mois, & elle nourrit trois chevaux par acre (2).

Rocque a recueilli à *Walham-Green* huit charretées par acre en cinq coupes d'un fourrage excellent (3); & en faisant manger la luzerne en vert il en a tiré jusqu'à 35 L. sterl. par acre de produit (4).

Mr. Harte en a tiré 5 L. sterl. par acre de profit net (5); & Mr. Baker a fait huit tonnes de foin par acre d'Irlande; ce qui fait cinq tonnes par acre anglais (6).

SECTION XIV.

De l'usage de la récolte.

Le premier usage de la luzerne est de nourrir les chevaux au vert à l'écurie (7). L'avant-

(1) Corps d'observations de la Société de Bretagne, 1757, 1758, p. 76. (A)

(2) *Clemente dell' Agricoltura* p. 24-25. (A)

(3) *Rocques Practical Treatise, on lucern.* p. 30-52. (A)

(4) *Museum rusticum*, vol. I. p. 368. (A)

(5) *Essays on Husbandry*, Ess. II, p. 118. (A)

(6) *Exper. in Agr. rep. to Dub. soc.* for 1767, p. 57. (A)

(7) *Practical observations, com. to Doct. Templeman* 1766. p. 4. — *Douglas Mém. of Agr.* vol. I. p. 368. (A)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (41)

tage de cet emploi est très-grand ; & je ne connois aucune nourriture qui leur convienne mieux. — Ce fourrage vert est excellent pour nourrir les vaches & les jeunes bêtes dans les cours des fermes , pour les bœufs qui travaillent , & pour les cochons qu'on élève dans les enclos.

Mr. Baldwin (1) a très-bien réussi à engraisser des beliers gallois avec la luzerne. Enfin on l'a essayée à tout (2) hormis à l'engrais des bœufs , & je ne doute pas qu'elle n'y convint , mais je ne l'ai pas éprouvé (3).

Les cochons ne broutant pas si raz que les moutons , pourroient paître la luzerne sans inconvénient , & une petite luzernière située près de la maison , & destinée à cet usage , seroit d'un grand profit.

La luzerne fait un foin excellent (4). Il ne

(1) *De Re Rustica* , 8°. 1769 , vol. I. p. 43. Doffie *Mém. of Agr.* vol. I. p. 9. (A)

(2) Du Hamel *Elém. d'Agricult.* vol. II, p. 133. Rocque , *Pract. Treatise on Lucern.* p. 52. (A)

(3) Ceci est écrit depuis quelques années.

(4) Rocques , *Practical Treatise on lucern.* , p. 26. J'ai ouï blâmer cet auteur pour avoir fait beaucoup d'argent en vendant ses graines à un prix très-haut. Il avoit très-fort raison de soigner ses intérêts , mais il a contribué à répandre la culture des plantes utiles , en quelque sorte dans la proportion du prix qu'il mettoit à ses graines. Les hommes sont si fous qu'ils n'estiment que ce qui est cher. Les écrits de Mr. Reynolds,

faut pas le remuer beaucoup, afin de conserver la feuille. J'ai déjà indiqué la grande valeur de la première pousse pour les brebis & les agneaux.

On n'a publié aucune expérience en grand sur l'usage de cette plante à l'engrais du gros bétail ; mais d'après quelques données éparées, il paroît qu'elle y feroit très-utile. (1)

Mr. Herbert, de Mucruif en Irlande, a fait cependant plusieurs expériences sur cet article. Il a trouvé que la luzerne engraissoit admirablement le bétail, & il considère cet emploi comme le plus avantageux qu'on en puisse faire. (2) Un

qui étoit un fermier-pratique, ainsi que tous les efforts de la Société des arts, n'auroient peut-être point suffi à introduire la culture de l'excellente plante nommée *turnep rooted-cabbage*, (chou-rave ou chou-navet) mais un marchand de graines de Londres, en l'appelant *chou de Laponie* & en vendant la graine douze shellings la livre, réussit bientôt à en répandre l'usage dans tout le Royaume. S'il en eût fixé le prix à un shelling, personne n'en auroit voulu. En général l'autorité de Rocque est très-bonne. Je l'ai rarement cité sans avoir vu la pratique de ce qu'il recommande, sur sa ferme à Walham Green. (A)

(1) *Practical observ. com. to Doct. Templeman* p. 25. Un autre dit, que pour engraisser les bestiaux, aucun fourrage n'a un effet plus prompt & ne fait de meilleure viande. *Wimpey's rural improvement*, 8°, 1775, pag. 140. (A)

(2) *Tour in Ireland*, vol. I. p. 362. (A)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (43)

auteur Français dit expressément que la luzerne engraisse promptement le bétail. (1)

Une vache de grandeur moyenne mange de 90 à 110 liv. de luzerne en vert dans 24 heures (2). Ce fourrage demande les mêmes précautions que le trèfle pour prévenir l'enflure (3).

Mr. Baker a éprouvé qu'un acre Irlandois en luzerne suffit à six vaches pendant 145 jours (4) : ce qui revient à un acre Anglais pour quatre vaches, à-peu-près. Le Dr. Tauner a entretenu 14 vaches ou chevaux avec quatre acres de luzerne semée à la volée ; il payoit 8 liv. sterl. l'acre. Ses chevaux étoient gras sans manger ni foin ni avoine. Au bout de sept ans la luzernière étoit dans le meilleur état. (5)

Mr. Baldwin a prouvé qu'un acre nourrit cinq chevaux pendant vingt-un jours à 90 liv. par jour chaque cheval (6). Sir Charles Turner a entretenu quatre vaches sur un acre au fennoir (7). Mr. Hall lui a payé pendant sept ans liv. sterl. 11. 6 par acre, en nourrissant ses chevaux à 2 shel. 6 d. par semaine, sur une

(1) Bomare, Dict. d'Hist. Nat. tom. III, p. 430. (A)

(2) Baker's Experiment. in Agr. rep. to Dub. Soc. for 1767, p. 48. (A)

(3) Baker's Experiments for 1767, p. 50. (A)

(4) Ibid, p. 55. (A)

(5) Six weeks tour, p. 66. (A)

(6) Ibid, 221. (A)

(7) Six month's tour, vol. II, p. 134, (A)

44) AGRICULTURE.

luzerniere semée à la volée (1). — Une luzerne, semée de même à la volée, a entretenu cinq chevaux pendant 26 semaines chez Sir John Turner : ce qui à 2 shel. fait 13 liv. sterl. par acre (2). Mr. Arbuthnot, qui a cultivé la luzerne de la même manière, en a tiré quatre tonnes de foin sec par acre sur onze acres (3). Mr. Butcher, de Chalk dans le comté de Kent, a nourri six chevaux depuis le 1^{er}. mai au 10 octobre sur une luzerne de sept ans semée à la volée (4). Mr. Bannister, dans le même endroit, en a eu qui a duré seize ans. Mr. Reynolds a nourri quatre chevaux par acre, sur une luzerniere semée à la volée, depuis la mi-mai à la mi-octobre : ce qui à 2 shel. 6 d. fait liv. 11. 10 shel. par acre (5).

M. Vernon, en Suffex, sur une luzerne au semoir à deux pieds de distance, a nourri cinq chevaux par acre depuis le 1^{er}. mai à la mi-octobre, ce qui à 2 shel. 6 d. fait 14 liv. sterl. 7 shel. 6 d. (6). Le Dr. Lloid, de Puddletown, a nourri quatre chevaux par acre, pendant 18 semaines, sur une luzerne au semoir, les lignes à 18 pouces, ce qui à 2 shel. 6 d. fait 9 liv.

(1) *Eastern tour*, vol. I. p. 379. (A)

(2) *Eastern Tour*, vol. II. p. 50. (A)

(3) *Ibid*, p. 257. (A)

(4) *Ibid*, vol. III, p. 20. (A)

(5) *Ibid*, p. 72. (A)

(6) *Ibid*, vol. III, p. 156. (A)

OBSERVATIONS SUR LA LUZERNE. (45)

sterl. (1). Mr. Anderfon, au femoir, a trouvé dans la quatrième année, un produit de 9 liv. sterl. soit 5 liv. 9 shel. de profit par acre; & dans la cinquième année un profit de 6 liv. 15 shel. (2).

Le même cultivateur a comparé les produits de la luzerne avec ceux de la pimprenelle & du fainfoin de la manière suivante :

La luzerne produisit dans quatre coupes,	
en vert	159 liv.
La pimprenelle	84
Le fainfoin	112

Une coupe de chaque plante réduite en foin produit,

La luzerne en vert	57 $\frac{1}{2}$	en foin	22
La pimprenelle . .	25 $\frac{1}{2}$		7
Le fainfoin . . .	29 $\frac{1}{2}$		9 (3)

Mr. Clayton sur une luzerne à la volée, a nourri cinq chevaux par acre, valeur 9 liv. sterl. & sur une luzerne au femoir, quatre chevaux, valeur 7 liv. 4 shel.

Mr. Prat, de Poorfleet en Essex, a eu la médaille de la société pour quatre acres au femoir, à deux pieds de distance, qui avoient nourri : (4)

(1) *Ibid*, p. 431. (A)

(2) Communiqué par lettres. A

(3) Un ouvrage récent dit que cinq livres en pleine fève, ou quatre livres en pleine fleur, font une livre de foin. (*Improved culture of the principal grasses*) 8°. 1775. p. 15. (A)

(4) *Society's Transf.* vol. I. p. 164—170. (A)

(46) AGRICULTURE.

Dix chevaux , vingt-deux semaines ,	L.	sh.	
qui , à 2 sh. 6 d. , font . . .	27.	10.	—
Deux dits , vingt semaines . . .	5.	—	—
Vingt-un dits , une semaine . . .	2.	10.	6
Quinze bêtes à cornes à l'engrais , huit jours , à 2 sh.	1.	15.	—
Quatre acres L. st.	36.	15.	6
ou par acre . . .	9.	4.	

J'ai supposé ces prix pour trouver la valeur de la luzerne.

SECTION XV.

Des dépenses de la culture.

La luzerne étant une culture chere il faut faire connoître au jeune cultivateur le détail des frais de culture , afin que s'ils dépassent ce qu'il peut y consacrer , ou ce dont il est sûr de pouvoir disposer au moment nécessaire , il n'entreprenne pas de cultiver cette plante. Voici les frais du semoir :

	L.	sh.	d.
Deux labours de printemps d'extra. —	18	—	—
Herfages	2	6	
Huit livres de graine	8	—	
Semaille	2	6	
Houage au cultivateur en automne —	2	6	
Sarclage à la houe	5	—	
Première année , par acre L. st.	1	18	6

DE LA VIE AGRICOLE. (47)

Annuellement :	L. sh. d.
Rente, dîme, impositions . . .	1 10 —
Quatre houages au cultivateur . . —	10 2
Trois sarclages à la main . . . —	12 —
Cinq coupes, frais de fauchage . . —	12 6
Ratelage —	5 —
Charriage jusqu'à l'étable . . . —	7 10
Engrais annuel, valeur —	12 —
Frais annuels par acre L. st.	4 9 —

Les frais du fauchage, du ratelage, & de charriage, ne sont pas faciles à calculer, à moins que l'étendue ne soit assez considérable pour employer un homme, un petit garçon & un cheval. Je les ai taxé haut; mais peut-être pas encore assez, parce que dans les travaux coupés il y a toujours beaucoup de temps perdu. Je suis disposé par cette raison, & par d'autres encore, à estimer à 5 liv. sterl. la totalité des frais. Si les soins sont suffisans, je ne crois pas qu'on puisse cultiver à plus bas prix. Mais quelque dispendieuse que puisse paroître cette culture on y trouvera bien son compte; & les récoltes ne rendront gueres moins de cent pour cent, si l'on estime la valeur du fourrage à raison du nombre de bêtes qu'il nourrit chaque semaine.

SECTION XVI.

De l'usage de la terre lorsqu'on rompt la luzerne.

J'ai vu un labour complet (c'est-à-dire tel que la force des racines pouvoit le permettre) donné pour détruire une luzerniere, la renouveler suffisamment pour engager le propriétaire à la laisser subsister. Les récoltes de grain qui succèdent sont considérables. L'auteur François Deferres donne un excellent conseil pour convertir une luzerniere en pré au moyen de l'arrosement (1).

(1) Théâtre d'Agricult. p. 242. Les meilleurs auteurs Français n'ont pas plus d'idée des bons assolemens que les plus ignorans d'entre nos fermiers: un des plus distingués dit, qu'après avoir rompu une luzerniere, il faut semer du blé deux ans, puis de l'avoine, puis encore du blé. — *Prairies artificielles*, 3^{me} édit. pag. 186. (A)

Observatoire de Paris.

eau	Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.				OBSERVATIONS Diverses.
	C. du S.	L. du S.	2 h.	C. du S.	
	i. Dou.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	
o. o	+	3. 0	+	3. 5	Les blés continuent à se maintenir passablement verts, quoique dans certains cantons l'on se plaigne que les alternatives de chaud & de froid, de sécheresse & d'humidité, ont soulevé les terres. — L'on a profité des beaux jours, pour tailler les vignes & les hautins. Les sources sont toujours basses. — L'on commence à voir des boutons à fruit en assez grande quantité.
o. 2		3. 5		4. 0	
o. 2		2. 7		3. 3	
o. 3		2. 5		2. 5	
o. 3		1. 7		2. 3	
o. 3		1. 0		1. 0	
o. 2		o. 5		o. 5	
o. 3		o. 3		o. 3	
o. o		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 5	
		o. 5		o. 3	
		o. o	+	o. 5	
		1. 5		2. 5	
o. 2		1. 3		1. 5	
o. o		o. 3		o. 5	
		o. 3		o. o	
		o. 3		o. o	
		o. 3		o. o	
		o. 5		o. 3	
		o. 3		o. o	
		o. 3		o. o	
		o. 3		o. o	
		o. o	+	o. 3	
	+	o. 3		o. 5	
		o. 5		1. 3	
		1. 0		1. 0	
		o. 5		1. 0	
		o. o		o. 5	
		o. o		o. 3	
Moy.		+ 0,29		+ 0,76	+ 0,77

ATMOSPHERIQUES.

Hygromètre. à cheveu.			Elec- tromè- tre.	Pluie ou neige en 24 heu.	Gelée blanche ou Rosée.	Vents.		
du S.	2 h.	C. du S				L. S.	2 h.	C. du S
Deg.	Deg.	Deg.	2 h.	Li. Dou.				
99	98	98	—	2. 7	—	S	S	E
95	93	95	—	—	—	SE	SE	SE
98	89	94	—	—	R.	NE	NE	NE
92	84	86	—	—	R.	NE	NE	NE
94	84	86	—	—	R.	NE	NE	NE
94	90	92	—	—	R.	NE	NE	NE
88	83	85	—	—	—	O	O	O
84	83	85	—	—	—	S	S	S
80	79	79	—	—	—	NE	NE	NE
82	80	84	—	—	—	NE	NE	NE
89	86	89	—	—	—	NE	NE	NE
98	86	97	—	n. 1. $\frac{1}{2}$	—	NE	NE	NE
96	78	78	—	—	—	NE	NE	NE
99	99	99	—	6. 3	—	SO	SO	SO
98	87	87	—	1. 3	—	SO	SO	SO
94	90	93	—	2. 3	—	SO	SO	SO
82	77	78	—	0. 10	—	SO	SO	SO
79	67	73	—	—	—	NE	NE	NE
86	71	74	—	—	G.B	NE	NE	NE
81	71	75	$\frac{1}{2}$	—	G.B	NE	NE	NE
96	66	74	—	—	G.B	O	O	O
91	65	70	$\frac{3}{4}$	—	G.B	calme	id.	id.
95	60	79	I	—	G.B	calme	id.	id.
96	75	84	I	—	G.B	calme	id.	id.
97	74	89	$\frac{1}{2}$	—	—	calme	id.	id.
97	88	97	—	0. 8	G.B	calme	id.	id.
98	83	92	—	—	—	calme	id.	id.
99	96	99	—	—	R.	SO	SO	SO
98	62	70	—	0. 11	—	SO	SO	SO
94	72	75	—	—	G.B	calme	id.	id.
93	76	78	$\frac{1}{4}$	—	G.B	SO	SO	SO
2,32	80,39	84,96		Total n. 1 p. $\frac{1}{2}$ pl. 12,2				

oire de Genève, le 1^{er}. 19°. 48'. le 15^e. 19°. 45'.

ents.

h. C. du S.

E
SE
NE
NE
NE
NE
O
S
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
O
id.
id.
id.
id.
id.
SO
SO
id.
SO

45.

OBSERV.

BAROMÈTRE.

Jours du Mois.		Phases de la Lune.		BAROMÈTRE.												T. à div.	
				Lev. du Sol.		2 heures		Cou. du Sol.		L. du							
				Pou. Li. Seiz.		Pou. Li. Seiz.		Pou. Li. Seiz.		D. dix							
1		26.11.	4	26.11.	6	26.11.	10	+	3.								
2		27. 0.	3	27. 0.	2	27. 0.	2		3.								
3		— 1.	0	— 1.	3	— 1.	3		2.								
4		— 2.	5	— 2.	4	— 2.	4		1.								
5		— 2.	6	— 2.	4	— 2.	0		0.								
6	☾	— 1.	11	— 1.	10	— 1.	10		0.								
7		— 1.	12	— 1.	12	— 1.	12	-	1.								
8		— 2.	0	— 2.	0	— 2.	0		1.								
9		— 1.	10	— 1.	1	— 1.	1		2.								
10		— 0.	2	26.11.	1	26.11.	1		3.								
11		26.11.	1	— 10.	4	— 10.	0		2.								
12		— 10.	1	— 10.	3	— 10.	11		2.								
13	☺	27. 0.	4	27. 0.	10	27. 1.	3		1.								
14		— 0.	8	— 0.	6	— 0.	6		0.								
15		— 0.	1	26.11.	7	26.11.	7	+	2.								
16		26.10.	7	— 9.	13	— 9.	14		5.								
17		27. 1.	2	27. 1.	10	27. 2.	2		0.								
18		— 3.	9	— 2.	15	— 2.	15	-	2.								
19	☾	— 3.	14	— 3.	12	— 3.	12		2.								
20		— 4.	13	— 4.	12	— 4.	12		2.								
21		— 4.	15	— 4.	0	— 3.	12		4.								
22		— 3.	7	— 2.	11	— 2.	11		3.								
23		— 2.	15	— 2.	3	— 2.	3		4.								
24		— 2.	3	— 1.	11	— 1.	11		4.								
25		— 1.	12	— 1.	13	— 1.	13		1.								
26		— 1.	0	— 0.	10	— 0.	10		0.								
27		— 1.	2	— 1.	1	— 1.	1	+	0.								
28	●	— 1.	7	26.11.	15	26.11.	15	-	1.								
29		— 1.	3	27. 1.	13	27. 1.	13		0.								
30		— 3.	5	— 3.	3	— 3.	3	-	3.								
31		— 2.	13	— 1.	11	— 1.	6		2.								
Moyennes		27. 1.	8,9	27. 1.	4,2	27. 1.	4,6	-	0,								

Déclinaison de l'aiguille aim



AGRICULTURE.

AN EXPERIMENT COMPARING, &c.
 Expérience pour comparer quatre races de
 Brebis. Faite par ordre du Duc DE BEDFORD,
 & communiquée par lui. (Annales D'ARTHUR
 YOUNG.)

VINGT-HUIT moutons de quatre différentes
 races, & tous à leur première tonte, furent
 pesés le 30 novembre 1793, & mis dans un
 enclos pour y passer l'hiver. On ne leur donna
 que du foin, & en petite quantité, sur la
 neige. Ils furent parqués constamment.

Les sept moutons de South-Down pesoient
 le 30 novembre :

		livres	onc.
N ^o .	1	111.	4
	2	113.	2
	4 (1)	110.	4
	6	119.	2
	7	110.	12
	8	112.	13
	10	110.	3
Total		797.	8

(1) Nous verrons tout-à-l'heure pourquoi les nom-
 bres ne se suivent pas dans leur ordre naturel.

Agriculture. Vol. 2. N^o. 2. Février 1797. D

(50) AGRICULTURE.

Les sept moutons de NEW-LEICESTER pesoient :

N°.		livres	onc.
1		111.	8
3		122.	8
4		151.	14
6		138.	14
7		121.	1
8		122.	14
10		118.	10
Total		887.	5

Les sept moutons de COTTESWOLD pesoient :

N°.		livres	onc.
1		187.	13
3		196.	8
4		149.	8
6		152.	7
8		147.	4
9		135.	18
10		136.	14
Total		1106.	2

Les sept moutons de WILTSHIRE pesoient :

N°.		livres	onc.
1		162.	5
2		174.	9
3		170.	2
6		163.	12
8		160.	—
9		156.	9
10		164.	8
Total		1151	13

EXP. SUR DIVERSES RACES DE BREBIS. (51)

Le 7 avril les vingt-huit moutons furent repesés. Ceux de SOUTH-DOWN pesoient :

N°.		livres	onc.
1		108.	8
2		110.	4
4		116.	8
6		114.	15
7		98.	2
8		97.	7
10		102.	6

Total 748. 2

Ces sept moutons avoient pesé le 30 novembre 797. 8
Ils pesoient le 7 avril 748. 2

Ils avoient perdu 49. 6

Ceux de LEICESTER pesoient :

N°.		livres	onc.
2		80.	14
3		117.	6
4		140.	9
6		133.	2
7		117.	6
8		116.	6
10		109.	14

Total 815. 9

Ces sept moutons avoient pesé le 30 novembre 887. 5
Ils pesoient le 7 avril 815. 9

Ils avoient perdu 71. 12

(52)

A G R I C U L T U R E .

Ceux de CORRESWOLD pesoient :

N ^o .		livres	onc.
1		176.	5
3		178.	12
4		134.	—
6		139.	11
8		122.	8
9		123.	4
10		133.	6

Total 1007. 14

livres onc.

Ces sept moutons avoient pesé le 30 novemb. 1106. 2

Ils pesoient le 7 avril 1007. 14

Ils avoient perdu 98. 4

Ceux de WILTSHIRE pesoient :

N ^o .		livres	onc.
1		145.	15
2		152.	—
3		138.	2
6		151.	—
9		138.	8
10		146.	2

Total 871. 11

Le N^o. 8 avoit été vendu au Boucher 1 liv. st. 13 sh.

Les six moutons ci-dessus avoient pesé le 30 novembre 991. 13

Ils pesoient le 7 avril 871. 11

Ils avoient perdu 120. 2

EXP. SUR DIVERSES RACES DE BREBIS. (53)

RÉCAPITULATION.

797 de South-Down ont perdu dans quatre	
mois & sept jours	49. 6
887 de Leicester	71. 12
1106 de Cotteswold	98. 4
991 de Wiltshire	120. 2

Les moutons de South-Down, pour perdre dans la proportion de ceux de Leicester auroient diminué de 63 livres, ils n'ont perdu que 49 livres 6 onces.

Les moutons de Cotteswold, pour perdre dans la proportion de ceux de Leicester, auroient diminué de 88 livres, ils ont diminué de 98.

Les moutons de Wiltshire ne valent pas, sous ce rapport, la peine d'être comparés aux autres.

Ceux de South-Down sont les meilleurs; & ceux de Leicester viennent ensuite.

Il est inutile de dire que le but de l'expérience étoit de s'assurer laquelle des races supportoit le mieux le froid & la faim. Mais il y a une circonstance relative aux moutons de Leicester dont il faut tenir compte, sans quoi le résultat pourroit induire en erreur. Après que l'expérience fut commencée, on apprit qu'ils pouvoient être déjà atteints de la pourriture. Il parut en effet des traces de la maladie dans

(54) AGRICULTURE.

le foie de ces animaux lorsqu'on les tua , mais elle avoit été partiellement guérie , ou n'étoit pas au point où les moutons souffrent d'abord lorsqu'on les met aux turneps. Il faut donc mettre hors de rang le lot des moutons de Leicester , parce qu'il reste du doute sur l'état de leur santé.

Les numéros qui manquent dans l'expérience précédente font au nombre de douze , savoir trois moutons dans chaque lot. On mit ces douze moutons aux turneps le 1^{er}. novembre après les avoir pesés ; puis on les a repesés trois fois ensuite. Ils ont aussi mangé du foin en petite quantité.

Les moutons de SOUTH-DOWN ont pesé :

	1 ^{er} . novembre	18 décem.	11 janv.	7 avril	gain
	livres. onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.
N ^o . 3.	118. —	110. 2	113. —	126. 10	8. 10
5.	120. —	120. 2	124. 4	126. 14	16. 14
9.	117. 8	113. 9	116. 11	130. 8	13. —
	<u>355. 8</u>				<u>38. 8</u>

Les moutons de LEICESTER ont pesé :

	1 ^{er} . novembre	18 décem.	11 janv.	7 avril	gain
	livres onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. on.
N ^o . 1.	144. 8	130. 13	134. —	137. —	perte 7. 8
5.	135. —	127. 4	129. 9	128. 12	perte 6. 4
9.	129. —	126. —	129. —	134. 9	gain 5. 9
	<u>408. 8</u>				<u>perte 8. 3</u>

EXP. SUR DIVERSES RACES DE BREBIS. (55)

Les moutons de COTTESWOLD ont pesé :

	1 ^{er} . novembre	18 décem.	11 janv.	7 avril	gain
	livres onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.
N ^o . 2.	186. 8	182. 9	189. —	péri d'accid	
5.	154. 8	142. —	143. 7	154. 8	
7.	154. 8	146. 2	148. 6	165. 12	11. 4
				gain	11. 4

Les moutons de WILTSHIRE ont pesé :

	1 ^{er} . novembre	18 décem.	11 janv.	7 avril	gain
	livres onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.	liv. onc.
N ^o . 4.	167. 8	163. 15	169. 6	187. 2	19. 10
5.	166. 8	161. 1	169. 6	180. —	13. 8
7.	167. —	161. 11	165. 8	171. 8	4. 8
					37. 10

RÉCAPITULATION.

Les moutons de South-Down 355 liv. ont gagné 38 liv.
 Ceux de Leicester . . . 408 — ont perdu 8 —
 Ceux de Cotteswold . . . 309 — ont gagné 11 —
 Ceux de Wiltshire . . . 501 — ont gagné 37 —

Le peu de profit que le lot de Leicester a fait en mangeant des turneps, semble une confirmation du soupçon de pourriture, il faut donc mettre ce lot hors de rang.

Les moutons de South-Down paraissent ici encore très-supérieurs aux deux autres races. En comparant les Cotteswold & les Wiltshire,

(56) AGRICULTURE.

on voit que les si les premiers ont gagné 11; ceux-ci devoient gagner 17; or ils ont gagné 37.

Il faut observer que depuis le 1^{er}. novembre au 18 décembre le temps fut très-humide, & défavorable aux moutons.

Le 8 avril, après avoir fait jeûner convenablement les bêtes à laine qu'on destinoit à l'expérience, on les tua, & leur poids fut comme suit :

Le SOUTH-DOWN, N^o. 5.

	livres	onc
Pesoit en vie	136.	14
La laine	5.	10
Le sang	5.	10
La peau	9.	4
La tête & la fressure . . .	10.	8
Les entrailles	10.	12
La graisse	10.	12
Les quatre quartiers	83.	—

Le rapport de 137 livres pour l'animal en vie, à 83 livres de viande ou os, est celui de 20 à 12.

Le LEICESTER, N^o. 1.

	liv.	onc.
Pesoit en vie	137.	—
La laine	8.	6
Le sang	4.	14
La peau	10.	8
La tête & la fressure . . .	9.	4
Les entrailles	10.	4
La graisse	10.	4
Les quatre quartiers	82.	—

Le rapport de 137 à 82 est de 20 à 12.

EXP. SUR DIVERSES RACES DE BREBIS. (57)

Le COTTESWOLD, N°. 7.

	livres	onc.
Pesoit en vie	165.	12
La laine	9.	—
Le sang	6.	8
La peau	13.	—
La tête & la fressure	12.	—
Les entrailles	14.	6
La graisse	11.	12
Les quatre quartiers	98.	—
Le rapport de 165 à 98 est de 20 à 11. $\frac{2}{7}$		

Le WILTSHIRE, N°. 5.

	livres	onc.
Pesoit en vie	180.	—
La laine	5.	—
Le sang	7.	—
La peau	14.	4
Les entrailles	15.	—
La graisse	16.	—
La tête & la fressure	14.	8
Les quatre quartiers	108.	—
La rapport de 180 à 108 est de 20 à 12.		

O B S E R V A T I O N S.

Le plan & la conduite de cette expérience sont excellens, & donnent l'espérance de découvertes intéressantes si l'on continue à apporter le même jugement & les mêmes soins à d'autres expériences analogues.

Il n'y a rien à désirer dans les détails, si ce n'est sur le point très-embarrassant de la

(58)

AGRICULTURE.

quantité de nourriture consommée par chaque lot de moutons.

L'accident arrivé aux moutons de Leicester est un de ceux auxquels on doit s'attendre dans toutes les expériences qui se font sur des animaux vivans.

Malgré la diminution soutenue par les moutons de Leicester tandis que les autres augmentoient de poids, ils ne sont pas inférieurs quant au poids au dernier moment soit vivans, soit morts; ils ont même autant de suif que les South-downs: mais les Wiltshires sont supérieurs de trois livres, quant au suif.

Tous les moutons mis aux turneps réussirent mal: ils s'en nourrirent plus de vingt semaines. Trois bêtes à laine gagnant 38 livres de poids en vie, ne gagnent que 23 livres de viande qui à 5 pence font 9 shellings 7 pence. Supposons un $\frac{1}{2}$ pence d'augmentation de prix, par livre, sur les 213 livres de poids en novembre (réduites dans le rapport de 20 à 12) pour représenter la différence des prix de la viande dans les deux saisons, c'est 8 shellings 10 pence c'est-à-dire en tout, 18 shellings 5 pence sur les trois bêtes, ou 6 shellings 1 pence $\frac{1}{2}$ par mouton pour vingt semaines. Cela revient à 3 $\frac{1}{2}$ pence par semaine pour le lot des quatre qui a le mieux réussi. Une telle augmentation ne couvre pas la dépense des turneps.

Jusqu'au 1^{er} janvier, presque toutes les bêtes

EXP. SUR DIVERSES RACES DE BREBIS. (59)

en expérience avoient diminué de poids , ce qui est remarquable ; mais j'ai inséré dans cet ouvrage quelques expériences dont il a toujours résulté la même chose , à moins qu'on n'ait donné aux moutons , en même temps que les turneps , du grain ou quelque autre nourriture substantielle. Cette circonstance mérite beaucoup d'attention , car nous manquons encore d'un moyen profitable de remédier à cet inconvénient. Il vaudroit la peine d'essayer jusqu'à quel point l'abri & la chaleur opéreroient , mais alors il faut enlever & charrier les récoltes , ce qui est la plus mauvaise des spéculations. (1)

ARTHUR YOUNG.

(1) Cette dernière phrase semble faite pour ôter l'envie de tenter l'essai indiqué plus haut. Cela demande d'être expliqué à ceux qui n'ont pas assez présents les détails de l'agriculture anglaise. Tout en remarquant qu'il seroit à désirer qu'on trouvât un moyen profitable d'augmenter l'effet des turneps sur les moutons qui les mangent aux champs pendant l'hiver , l'auteur ne perd pas de vue le point , bien autrement important , de l'amélioration qui résulte pour la terre de la consommation sur place. Il rappelle là , en deux mots , qu'en vain on auroit trouvé une manière économique , en apparence , d'augmenter le poids des moutons , s'il falloit , dans cette méthode , sacrifier l'avantage de faire manger les turneps sur le champ même qui les a produits : avantage immense ! puisque

DETAIL OF SEVERAL EXPERIMENTS, &c.
 Détail de diverses Expériences, avec des observations sur les effets du gypse, ou plâtre de Paris, comme engrais, sur le fain foin, les trefles, &c. par Mr. SMITHE de TUNSTALL près de Sittingbourne, en Kent. (Annales d'agriculture, par ARTHUR YOUNG.)

SAINFOIN, produit de l'herbe réduite en foin.

Poids brut par perche.		Poids brut par acre.		Poids, déduit la graine.		Valeur à 1 shel. 6 d. le quintal.		
N ^o .	livres.	quint.	liv.	quint.	liv.	L. st.	sh.	den.
1	23.	32	87.	29	23.	2.	3.	9.
2	37.	52	87.	47	53.	3.	11.	7. ⁵ / ₈
3	31.	44	29.	40	74.	3.	1.	—
4	24. ¹ / ₂	35	—	33	9.	2.	9.	7.
5	18. ¹ / ₂	26	45.	24	8.	1.	16.	—
6	29.	41	45.	38	14.	2.	17.	2.
7	31.	44	29.	42	48.	3.	2.	8.
8	13.	18	58.	17	98.	1.	7.	—
9	27. ¹ / ₂	39	29.	37	50.	2.	16.	3.

la circulation lente & coûteuse de la récolte, des charriages, de l'emmagasinement, de la consommation à l'étable; puis des charriages des fumiers aux champs, est ici réduite à une seule opération, & que la terre profite encore de la sueur & de l'urine. (Voyez le 1^{er}. vol. d'Agriculture, p. 238 & suivantes). — Il n'est pas étonnant qu'un homme fortement pé-

EXPÉR. SUR LES EFFETS DU GYPSE. (61)

SAINFOIN, produit de la graine.

Poids par perche.			Mesure par acre: à 25 livres par bushel.			Valeur à 40 sh. le quarter.				Valeur totale par acre, du foin & de la graine.			
N ^o .	liv.	onc.	quart.	bus.	gal.	L.	st.	sh.	den.	L.	st.	sh.	den.
1.	2.	9.	2.	0.	2. $\frac{1}{2}$	4.	1.	6.		6.	5.	3. $\frac{1}{2}$	
2.	3.	9.	2.	4.	3.	5.	1.	10.		8.	13.	5. $\frac{1}{2}$	
3.	2.	8.	2.	—	—	4.	—	—		7.	1.	—	
4.	1.	5. $\frac{1}{2}$	1.	—	4. $\frac{1}{3}$	2.	2.	9.		4.	12.	4.	
5.	1.	8.	1.	1.	4. $\frac{1}{3}$	2.	7.	9.		4.	3.	9.	
6.	2.	5.	1.	6.	6.	3.	13.	9.		6.	10.	11.	
7.	1.	4. $\frac{1}{3}$	1.	—	1. $\frac{1}{3}$	2.	—	11.		5.	4.	7.	
8.	—	6.	—	2.	4. $\frac{1}{3}$	—	12.	9.		1.	19.	9.	
9.	1.	4.	1.	—	—	2.	—	—		4.	16.	3.	

Je dois dire d'abord, que j'avois fait moi-même avec exactitude la division & la mensuration du terrain; & que les produits après avoir été suffisamment séchés, avoient été séparés avec soin, puis pesés avant que d'être battus; qu'ensuite chaque portion de graine a été renfermée dans un sac avec un numéro correspondant à celui du terrain de l'expérience. — Je dois observer ensuite, que les perches mises

nétre des bons principes, accoutumé à juger en grand les procédés de l'agriculture, & leurs résultats, tienne son lecteur en garde contre des conclusions hasardées, & indique que le moyen, encore à trouver, de hâter l'engrais des moutons, aux turneps pendant l'hiver, ne seroit pas *profitable*, s'il dérangeroit l'admirable économie de la consommation sur place. (R)

en comparaison ont été choisies auprès de la ligne qui les séparoit, afin qu'aucune différence du sol ne pût affecter les produits. Comme le champ avoit plus de 100 rods de longueur, je pris le terrain de mon expérience sur une ligne directe qui en parcouroit toute l'étendue. J'espaçai également les quarrés d'expérience, pour pouvoir comparer entr'eux, les produits naturels, c'est-à-dire les espaces où le gypse ne fût pas employé ; & en même temps je comparois aussi les effets relatifs du gypse sur les différentes qualités de terrain.

Aux N^{os}. 1 & 2, le sol étoit une bonne terre légère de trois pieds d'épaisseur, reposant sur la craye. Celle-ci s'élevoit de plus en plus vers la surface du sol, en se rapprochant de l'extrémité du champ ; & dans les N^{os}. 7, 8, & 9 la terre végétale n'avoit que deux à cinq pouces d'épaisseur, sur la craye. Cela explique très-naturellement la supériorité du produit du N^o. 1 sur le N^o. 8. Cela montre aussi l'effet immédiat, comme l'effet permanent, du gypse sur les N^{os}. 7 & 9. Le premier fumé au gypse le 17 mai 1794, le second l'avoit été en mai 1792.— Mais pour établir la supériorité du gypse sur la fuye, comme engrais, & pour montrer, en même temps, d'une manière breve & distincte l'avantage des parties gypées sur celles qui n'ont reçu aucun engrais, je vais indiquer les produits comparatifs réduits en argent.

EXPÉR. SUR LES EFFETS DU GYPSE. (61)

N°. 2 gypsé à 6 bushels par acre, en L. st. sh. den.
avril 1794. 8. 13. 5. $\frac{1}{2}$

N°. 1 Crû sans engrais 6. 5. 3. $\frac{1}{2}$

Liv. st. 2. 8. 2.

A déduire pour frais de 6 bushel de

gypse à 2 shel. 9 den. — 16. 6.

Profit net par le gypse . . L. st. 1. 11. 8.

N°. 6 gypsé à 6 bushels par acre en avril

1793 L. st. 6. 10. 11.

N°. 5 crû sans engrais 4. 3. 9.

Balance en faveur du N°. gypsé, dans

l'année qui a suivi l'engrais. L. st. 2. 7. 2.

Observons qu'en 1793, l'excédent de récolte avoit balancé les frais du gypse.

N°. 7 gypsé le 17 mai 1794 . . L. st. 5. 4. 7.

A déduire pour frais du gypse . . . — 16. 6.

L. st. 4. 8. 1.

N°. 8 crû sans engrais 1. 19. 9.

Balance en faveur du N°. gypsé. L. st. 2. 8. 4.

N°. 3 gypsé comme ci-dessus. . . L. st. 7. 1. —

A déduire pour frais de gypse. . — 16. 6.

L. st. 6. 4. 6.

N°. 4, 20 bushels de fuie par acre, en

avril 1794. L. st. 4. 12. 4.

A déduire, frais de la fuie — 15. —

L. st. 3. 17. 4.

Le profit du gypse excède celui de la

fuie de 2 L. st. 7 sh. 2 den. par acre.

N°. 9 gypsé en mai 1792. . . L. st. 4. 16. 3.

8 crû sans engrais 1. 19. 9.

Balance en faveur du gypse à la 3^{me} an-

née après qu'il a été répandu. L. st. 2. 16. 6.

(64) AGRICULTURE.

Observons que les frais du gypse avoient
été balancés par l'excédent de
récolte en 1792 :

La totalité du produit des cinq numéros	L. st. sh. den.
gypsés , monte à	L. st. 32. 6. 2. $\frac{1}{2}$

Ce qui fait par acre	L. st. 6. 9. 3.
--------------------------------	-----------------

La totalité du produit des trois numéros
qui n'ont point eu d'engrais, en com-
prenant la suie , monte à

L. st. 17. 1. 1. $\frac{1}{2}$

Ce qui fait par acre	L. st. 4. 5. 3.
--------------------------------	-----------------

J'avois entrepris ces expériences pour mon amusement , & ma satisfaction particulière. J'ai été bien récompensé des soins que j'y ai mis , par des résultats si uniformes , si décisifs , & qui ont beaucoup passé mes espérances.

Dans le cours de ces expériences j'ai remarqué diverses circonstances qui, quoiqu'étrangères à mon principal objet, méritent cependant d'être rapportées. Je vais dire ici ce qui m'a paru le plus frappant, & le plus intéressant.

En comparant la valeur de la graine dans chaque numéro avec la valeur du foin , la différence paroît essentiellement dépendre de la profondeur du sol ; car dans les six premiers numéros (excepté le 4^e. fumé en suie) la valeur de la graine excède la valeur du foin d'une moitié, d'un tiers, ou se trouve du moins un peu supérieure , tandis que dans les numéros 7, 8 & 9 cette valeur de la graine décline relativement à celle du foin , à-peu-près dans la même proportion.

Ainsi

EXPÉR. SUR LES EFFETS DU GYPSE. (65)

		L.	st.	sh.	den.
Ainsi le N°. 1	donne en foin	.	.	.	2. 3. 9.
	en graine	.	.	.	4. 2. 6.
	Total	.	.	.	L. st. 6. 5. 3.
Le N°. 7	donne en foin	,	.	.	L. st. 3. 3. 8.
	en graine	,	.	.	2. — 11.
					L. st. 5. 4. 7.

Cela n'indique-t-il point le défaut de quelque principe fructifiant dans ce sol crayeux, & peu profond, lequel principe le gypse même ne peut pas donner dans la proportion du produit brut qu'il fait sortir de la terre ? Ce résultat semble du moins montrer qu'il n'est pas convenable de destiner un sol de ce genre à produire de la graine de sainfoin ; car je crois que, si ces deux numéros avoient été fauchés en foin, le N°. 7 l'auroit emporté sur le N°. 1 autant que celui-ci l'emporte en graine.

Voici encore un fait intéressant. — J'avois réservé un demi acre de ce terrain maigre & crayeux (le même que le N°. 7) pour voir quel feroit l'effet du gypse en le semant après que la végétation auroit fait quelques progrès. En conséquence j'en fis semer un bushel & demi le 17 mai sur cette partie. Le sainfoin avoit alors six pouces de haut, mais il étoit jaunâtre & languissant, tandis que la plus grande partie du champ qui avoit été gypsée un mois plutôt, étoit d'un vert foncé & paroissoit en

Agriculture. Vol. 2. N°. 2. Février 1797. E

pleine vigueur. J'avoue que j'espérois peu de cette opération tardive, parce que le temps étoit au sec, & que le gypse resta sur les feuilles pendant deux jours. Une petite pluie étant survenue, fit tomber le gypse, & apparemment le mit en travail, car au bout de cinq à six jours je vis le sainfoin changer d'apparence, puis faire ensuite de si rapides progrès qu'au milieu de juin il me parut prêt à dépasser l'autre. Le 10 juillet je fis faucher, parce que la graine de la plus grande partie du champ étoit mûre, mais comme ce demi acre de terrain crayeux me paroissoit aussi mûr, je le fis couper huit jours plus tard. Je trouvai qu'il y avoit dans ce dernier morceau un très-grand nombre de grains légers retraits, & mal mûrs, ce qui sert à expliquer que le N°. 7, reste en-dessous du N°. 1 de plus de la moitié, quant à la graine.

Ce dernier fait donne une preuve décisive de l'action étonnante, & pour ainsi dire instantanée du gypse sur le sainfoin. — La partie basse du même champ étoit en trefle. Il avoit été semé sur le bled en mars 1792. Le sol est une terre légère qui a dix ou douze pieds de fond, & qui est mêlée de cailloux. Cette partie fut gypsée aux mêmes époques indiquées ci-dessus, & les mêmes lignes de divisions, soit pour l'épreuve de la fuye, soit pour les morceaux sans engrais, coupoient également les deux parties. — Le trefle fut fauché en foin le

EXPÉR. SUR LES EFFETS DU GYPSE. (57)

7 juillet. Je mesurai deux perches-quarrées, prises à quelques pieds de distance l'une de l'autre, & lorsque le foin fut parfaitement sec, je pesai le produit de chacune.

Le N°. 1 pefoit quarante-deux livres par perche, ce qui fait par acre 60 quintaux, à 2 shel.	L. st. sh. den.
	6. — —
A déduire pour frais de 6 bushels de gypse, à 2 sh. 9 den.	— 16. 6.
	L. st. 5. 3. 6.

N°. 2 crû fans engrais, quinze livres par perche, ce qui fait par acre 21 quintaux 35 livres, à 2 shel.	2. 2. 10.
/ Profit net par le gypse.	L. st. 3. — 8.

NB. Ce foin s'est trouvé d'une qualité supérieure & vaut maintenant 4 liv. st. 10 sh. la charge.

Ces résultats font si clairs & si bien d'accord, qu'ils n'ont pas besoin de commentaire. J'ajouterai seulement que la partie du champ qui est en sainfoin vaut 6 shel. de rente par acre, & celle qui est en tresse 10 shellings.

Je vais maintenant rendre compte de ma dernière expérience faite sur une piece de tresse blanc (Dutch clover) dont la graine avoit été semée sur le bled, au printemps précédent. Comme je doutois si le gypse opéreroit sur cette plante comme sur celles qui pivotent, je ne gypsai qu'environ un demi acre, en deux morceaux séparés & choisis dans deux terrains très-

différens. Un de ces morceaux étoit une terre végétale, friable, de cinq pouces de fond, sur la craye; l'autre une terre douce & tenace, tres-profonde, & mêlée de quelques cailloux.

La piece de trefle avoit en totalité, environ cinq acres. Dans la partie la plus riche, & qui étoit d'environ trois acres, il y avoit une certaine quantité de bled, qui s'étoit semé d'aventure, & qui promettoit de deux à trois bushels par acre. J'imaginai que ce produit, ajouté à la graine du trefle, vaudroit la peine qu'on laisât mûrir ce bled, & d'autant mieux que l'été étoit fort sec. On verra combien je me trompois, en jetant les yeux sur les produits comparés des perches A & B qui avoient été gypsées de même, & sur lesquelles le trefle avoit également belle apparence; on verra qu'en laissant mûrir le bled sur B j'éprouvai un déficit sur la graine de trefle qui répond à 7 liv. sterl. par acre, (objet bien important si les trois acres de terre riche eussent été gypsés) & que je ne gagnai que deux bushels par acre de bled, c'est-à-dire 15 shellings.

J'indique cette dernière circonstance, non en raison de son rapport avec les effets du gypse, mais pour faire remarquer seulement que, dans le cours des expériences les plus simples, il se présente des routes nouvelles pour l'instruction, & que même les objets accessoires ont quelque-

EXPÉR. SUR LES EFFETS DU GYPSE. (69)

fois autant d'importance que le but principal qu'on se proposoit.

Avant que de détailler l'expérience, il faut dire que le gypse fut semé le 22 mai, à raison de six bushels par acre. Le trèfle blanc, dans ce moment là, surtout dans la partie crayeuse, avoit mauvaise apparence. Au bout de quinze jours la partie gypsée pouvoit se distinguer à une grande distance; & quoiqu'il ne tombât point de pluie le trèfle gypsé forma bientôt une voute impénétrable aux rayons du soleil, tandis que le reste fut en quelque sorte brûlé par la sécheresse : on peut en juger par le contraste des produits indiqués ci-dessous.

Produit en foin du trèfle blanc.

Par perche.	Par acre.		Produit net.		Valeur à 1 sh. 6 den. le quintal.
	liv. onc.	quint.	liv.	quint.	
A gypsé . .	15. 8.	22. . 16.	19. . 39.	1. 9. $\frac{3}{4}$	
a non gypsé	5. 8.	7. . 79.	7. . 30.	— 10. 11.	
B gypsé . .	15. —	21. . 45.	19. . 93.	1. 9. 10.	
b non gypsé	9. —	12. . 87.	12. . 33.	— 18. 6.	

Produit en graine.

Graine par perche.	Graine par acre.		Valeur à 12 d. la livre.			Produit total.	
	liv. onc.	quint.	liv.	sh.	d.	liv.	sh. d.
A gypsé . .	1. 15.	2. . 77.	15. 10. —	16. 19. $\frac{3}{4}$			
a non gypsé —	5. $\frac{1}{2}$	— . 52.	2. 5. 10	2. 16. 9.			
B gypsé . .	1. 1.	1. . 52.	8. 10. —	9. 19. 10.			
b non gypsé —	6.	— . 58.	2. 10. —	3. 8. 6.			

(70) AGRICULTURE.

Ces résultats prouvent que le gypse agit avec autant de force sur cette plante que sur le sainfoin, sous le rapport du produit total. Mais le prix de la graine du trèfle blanc étant beaucoup supérieur à celui de la graine de sainfoin, la valeur en argent du produit A de la graine de trèfle, passe la valeur du produit N°. 1 de la graine de sainfoin, dans le rapport de 3 à 1 ; & si l'on déduit le produit naturel (a) du produit gypsé (A) on verra qu'il y a 14 livres sterl. 2 shellings 3 d. par acre de gain, acheté par 16 shelings 6 den., prix de 6 bushels de gypse.

L'invariabilité des résultats dans les diverses expériences, toutes faites avec fidélité & je crois avec exactitude, prouve incontestablement, je pense, qu'il y a un principe de végétation extrêmement actif dans cette pierre insipide.

Mais comment cette substance agit-elle lorsqu'elle force ainsi l'accroissement des plantes d'une manière si étonnante, & presque instantanée ? C'est-là un mystère qu'il est peut-être réservé à un Young ou à un Kirwan de nous dévoiler. En attendant, j'espère que les cultivateurs pratiques les plus prudents, ne jugeront pas qu'ils courent de trop grands risques en hasardant quelques essais, sur l'autorité de faits pareils que je présente avec toute la vérité & l'exactitude possibles.

THE GREAT ADVANTAGE OF A SUITABLE STOCK OF CATTLE. Le grand avantage d'un choix convenable de bestiaux. (Tiré de l'ouvrage de Mr. N. KENT, intitulé *Hints to gentlemen of landed property*).

APRÈS l'application judicieuse de chaque terrain à la culture qui lui convient le mieux, le bon choix des bestiaux, selon les circonstances locales, est une des parties les plus délicates de l'art du fermier.

Lorsqu'on laisse faire la Nature, elle produit les animaux qui conviennent au sol destiné à les nourrir, depuis les petits moutons des montagnes de Galles jusqu'aux grandes brebis des marais du Lincolnshire, & depuis le petit taureau des montagnes d'Ecosse jusqu'aux bœufs les plus pesans des pâturages de Sommerfet. Mais une bonne agriculture nous apprend à perfectionner la qualité des bestiaux à mesure que nous améliorons le sol ; & la terre nous paye ainsi doublement de nos travaux & de nos soins. Le cultivateur sage conserve toujours une sorte d'équilibre entre l'état de son domaine & celui de ses bestiaux, soit quant au choix, soit quant au nombre. Ces deux choses doivent

marcher de front, & la négligence sur l'un des points entraîne nécessairement du dommage sur l'autre.

Il faut considérer d'abord quelle espèce d'animaux de labour convient le mieux à notre sol; puis quels sont les bestiaux qui consomment nos productions avec le plus d'avantage.

Sur un sol léger, où deux chevaux suffisent à une charrue, il y a toujours du profit à les préférer, parce que dans un tel terrain quatre chevaux font autant d'ouvrage que huit bœufs. Mais dans la glaise, ou, en général, dans toutes les terres fortes & pesantes qui ne permettent qu'un mouvement lent, la proportion du travail sera à-peu-près de douze bœufs pour huit chevaux.

Cette distinction une fois établie, il faut laisser à chaque espèce ses avantages, & c'est au jugement du fermier à les mettre à profit. Le cheval est un serviteur si agréable, si diligent, si courageux, qu'on seroit toujours tenté de l'employer de préférence; mais si l'on consulte l'intérêt l'on se décidera souvent pour le bœuf. Les frais d'entretien, la diminution annuelle de valeur, les nombreuses chances d'accident qui exposent à perdre les chevaux tout-à-coup, sont des considérations importantes. En revanche, le bœuf coûte peu de nourriture & d'attelage, & se vend bien lorsqu'il ne peut plus

AVANT. D'UN CHOIX CONV. DE BESTIAUX. (73)

travailler. Ils sont également utiles dans des sols différens , & il ne faut rejeter absolument ni l'une ni l'autre espece.

Les moutons doivent être regardés ensuite comme les animaux les plus avantageux. Ils le sont sous trois rapports : leur laine , leur multiplication annuelle , & leur fumier. Je pourrois même ajouter que dans les terres légères ils sont presque autant d'effet par leur tré-pignement que par leur engrais.

On s'est souvent fort bien trouvé de tirer ses moutons des cantons les plus stériles. La race s'améliore beaucoup en passant dans des terres plus fertiles ; ainsi que les arbres qu'on transplante réussissent mieux lorsqu'ils ont crû dans des pepinieres en terre maigre. On trouve aussi que dans de telles circonstances les moutons supportent mieux le parc , & ce fait n'est pas douteux.

Il y a un préjugé assez généralement répandu chez les fermiers , c'est qu'il y a des races de moutons qui ne peuvent pas se faire au parc. Je pense , au contraire , que tous les moutons maigres , ou les troupeaux de garde , profitent davantage au parc qu'à l'étable. Ils se portent généralement mieux avec cette méthode , qui leur fait prendre la nourriture à des intervalles très-réglés , & qui empêche qu'ils ne brou-tent à la rosée , chose reconnue préjudiciable

aux moutons (1). — En Dorset-shire & Wilt-shire où l'on entend très-bien les foins des moutons, l'usage du parc est général. On remarque que les troupeaux qui ont été tenus au parc, prennent ensuite la graisse très-promptement ; ainsi que cela arrive aux bœufs qui n'ont fait qu'un travail modéré.

Dans les terrains humides les moutons ne conviennent pas : les laiteries y tournent mieux à compte ; & donnent de l'occupation aux femmes & aux enfans. Il faut alors élever des cochons ; car les pommes de terre & les carottes bouillies dans le lait ou le petit lait font une excellente nourriture pour ces animaux ; & l'on fait quelle quantité de ces racines utiles un acre peut donner, & combien une ventrée de cochons de lait est profitable. Dans les grandes fermes , l'on méprise cet objet comme un accessoire peu important auprès des produits des grains , & l'on regarde les cochons comme des animaux embarrassans ; je pense qu'on a tort , car on en retireroit une grande utilité , & leur fumier est un excellent engrais.

Dans les pâturages vigoureux & succulens les bœufs de grosse race sont préférables ; pour engraisser aux turneps , les bêtes de Galles ou

(1) A moins qu'on ne veuille les engraisser , car rien ne contribue mieux à leur faire prendre promptement la graisse que le pâturage du matin. (R)

CULTURE DU COLZA. (75)

d'Ecosse sont celles qui profitent le plus.

Ainsi les divers sols, & les diverses productions exigent des animaux différens pour leur culture ou leur consommation; & il vaut la peine d'étudier la manière d'appliquer le plus convenablement les uns & les autres.

COLZA, ET COURS DE RÉCOLTES.

Lettre de Mr. GEORGE MAXWELL de Flettonlodge, près de Peterborough en Northamptonshire, à Mr. THOMAS BARNEY, fermier à Beaulieu en Hampshire, sur la culture du colza.

(*Tiré des Annales d'Agriculture*).

« **L**E colza, ou comme on l'appelle en quelques parties du Royaume, la navette, est connu depuis long-temps dans les terrains marécageux pour la nourriture d'hiver des moutons. Il sert ordinairement à engraisser ceux qui ne se sont pas engraisés pendant l'été; souvent aussi on l'emploie pour hiverner les agneaux sevrés, & nourrir les moutons, mais jamais on ne le donne aux brebis pleines ou qui viennent de mettre bas. »

» On en a introduit la culture pour le même

objet dans les terrains pesans que nous nommons élevés, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sujet à être inondés. Nous les trouvons beaucoup plus propres à ces terrains là que ne le sont les turneps; & surtout parce que nous ne sommes pas obligés de faire parquer nos champs par petites portions comme les turneps, qui s'endommagent & se pourrissent dès qu'ils ont senti la dent des moutons. »

» La préparation de la terre est exactement la même que pour les turneps. Il faut les farder à la houe dans les mêmes époques, mais ne pas laisser plus de six pouces d'intervalle entre les plantes. La quantité de semence est d'un demi *peck* par acre. »

» Le temps de la semaille lorsqu'il s'agit d'engraisser des moutons, est le milieu de l'été, ou dix à quinze jours avant ou après, selon l'état de la terre : on leur destine les terres qui sont le mieux préparées comme les plus fortes. Le colza destiné aux agneaux sevrés & au reste du troupeau est semé plus tard, & sur des terres d'une qualité inférieure. La raison de cette distinction est que le colza procurant une nourriture plus succulente qu'aucune autre herbe ou racine, il faut que les bêtes à laine soyent déjà grasses jusqu'à un certain point pour ne pas en souffrir. Si les moutons sont maigres quand le colza est dans sa force, ils s'en gorgent jusqu'à crever, ou bien ils meurent d'une

CULTURE DU COLZA. (77)

maladie qui leur survient lorsqu'ils prennent la graisse trop promptement. — Il y a toujours une sorte de danger de ce genre dans l'usage du colza, & j'ai vu des exemples de pertes considérables éprouvées par la mortalité des troupeaux ; il est vrai qu'elles étoient dues à la négligence , ou à des soins mal-entendus. Il y a bien des années que j'emploie le colza & je n'ai jamais effuyé qu'une seule perte , il y a deux ans , parce qu'en mon absence on s'étoit écarté de la règle que j'ai établie sur cette partie. »

» La portion de terrain que je destine au colza est d'environ trente acres , & j'hiverné de deux à trois cents bêtes à laines. — Le dix août je choisis les bêtes les plus maigres , & je les mets dans le champ de colza , au nombre d'une dizaine seulement. Ils parcourent tout le champ & pâturent à volonté. Quelques jours après j'y mets dix autres bêtes , puis dix autres encore ; & ainsi de dix en dix jusqu'à ce qu'environ la moitié de mon troupeau soit sur le colza , en ayant toujours soin de retenir les bêtes les plus grasses que je laisse à l'herbe jusques vers Noël. A cette époque , les moutons qui étoient d'abord les plus maigres sont parfaitement gras. On ne les sort jamais du champ , on ne les parque point de peur de les échauffer ; mais on sépare les moutons destinés au boucher , & on les laisse parcourir quelques jours le pâturage le plus voisin , pour se vider, »

» Pour montrer la différence que les soins produisent dans les résultats , je vous indiquerai un fait remarquable. — Il y a dans le voisinage de Fletton un grand pâturage commun qui appartient à trente-deux paroisses. Le Seigneur de l'endroit nomme annuellement un Officier qui est chargé de veiller à ce que les fossés & les clôtures soyent bien entretenus. Cette dépense , qui est assez considérable , se paye au moyen d'une portion de quelques acres de terrain qu'on enclôt de cinq en cinq ans , & qu'on loue au plus offrant. C'est ordinairement un particulier qui n'a point d'argent. Le sol est très-riche ; & l'usage constant de celui qui loue c'est d'écobuer & de semer du colza , qui naturellement devient aussi beau que le colza puisse être , & qui se vend à des engraisseurs pour y mettre des moutons. Des exemples répétés de mauvais succès , & de troupeaux dont la moitié avoit péri, empêcherent, il y a six ans , que personne voulut s'en charger ; & comme je m'étois toujours bien trouvé de cette nourriture je hasardai d'en donner trois pence par semaine pour chaque tête de mouton , avec la réserve de les en ôter toutes les fois que je le voudrois. J'y mis trois cents bêtes , avec un gardien qui logeoit tout auprès , & qui avoit pour tâche de se promener tout le jour à l'entour du troupeau pour en écarter les chiens , & tout ce qui pouvoit effrayer les mou-

CULTURE DU COLZA. (79)

tons. Le résultat fut que j'en vendis 299 pour le marché de Smith-field aussi gras qu'il est possible, & que le dernier, qui étoit une vieille brebis, fut vendu à un boucher voisin. »

» J'éprouvai cependant une perte considérable il y a deux ans ; & je ne puis l'expliquer que de la manière que je vous l'ai dit. Ce que j'appelle une perte considérable n'est cependant que 25 moutons sur 700, car depuis quelques années j'ai été dans l'usage d'acheter des champs de colza, & des moutons pour les pâturer. J'ai souvent hiverné des agneaux sevrés & des moutons maigres, & jamais je n'ai éprouvé de mortalité que je puisse attribuer à cette nourriture. »

» Je vais maintenant vous parler de ma méthode de culture qui, j'en suis convaincu, est différente de celle que vous suivez. »

» Vous me trouverez un peu systématique, car je suis persuadé que toutes les terres (ainsi qu'on le fait pour les jardins & les houblonnières) doivent être traitées de même, en ayant soin seulement de varier les grains & les autres productions, de la manière la plus convenable au sol. Les terres arables doivent être divisées en cinq parties, dont deux en grains, mais jamais deux années de suite, une en fèves, pois, ou vesces, une en colza ou turneps, selon la nature du terrain, & la cinquième en trefle, plante qui réussit dans toutes les terres,

& qui, soit qu'on la fauche, soit qu'on la fasse pâturer, est la production la plus améliorante pour le terrain, que je connoisse. Vous observerez que je ne parle que du trefle coupé pour fourrage, & non du trefle qu'on laisse grainer. »

» Mon terrain est pesant, & en culture depuis un grand nombre d'années ; voici la succession de mes récoltes :

» 1. Colza sarclé deux fois, non pour laisser grainer, mais pour le faire pâturer sur place. »

» 2. Orge semé avec 20 livres de trefle par acre. NB. Point de moutons la même année sur le chaume (1). »

» 3.

(1) C'est une attention indispensable que de ne pas mettre les moutons sur le chaume de l'orge ; c'est-à-dire, sur le trefle de l'année, parce qu'ils rongent la plaque jusqu'au collet, & la font périr. En temps sec, & en terre légère, on peut y faire pâturer les chevaux & les bêtes à cornes sans inconvénients. Dans les cas contraires, il vaut mieux faucher la récolte à la fin de septembre, si elle est assez forte pour qu'elle en vaille la peine, mais alors il faut la donner en vert aux bestiaux, parce que dans cette saison là il est difficile qu'elle sèche, & que d'ailleurs dans ce cas le trefle n'étant pas ordinairement en pleine fleur, il se réduiroit beaucoup en séchant. On doit comprendre aussi que pour pouvoir faucher il faut qu'il n'y ait point de pierres, ou que le rouleau les ait enterrées à la semaille de l'orge. Cet effet du rouleau n'est pas sans inconvénients : les pierres ainsi fixées dans la terre ne peuvent plus s'enlever aisément en

CULTURE DU COLZA. (81)

» 3. Trefle fauché deux fois pour réduire en foin , ou pâturé avec les moutons. »

» 4. Feves semées à la volée , & pâturées avec les moutons jusqu'à ce qu'elles soient en fleurs ».

» 5. Blé. »

» J'ai long-temps tâtonné pour trouver la quantité de semence la plus avantageuse à répandre soit pour les grains , soit pour les foin. Ceux-ci ne peuvent gueres se semer trop épais parce qu'il nous faut un fourrage fin. — J'ai toujours trouvé que moins je sème d'orge , & plus j'en recueille. Je ne sème qu'un *bushel* & demi par acre , & je recueille six , sept , & jusqu'à huit *quarters* de graine. Je sème de trois à cinq bushels de feves qui m'ont donné jusqu'à sept *quarters* par acre , mais elles sont plus casuelles qu'aucune autre production. Depuis que je les sème après le trefle , cependant , je n'ai jamais moins recueilli de quatre *quarters* par acre. — Quant au blé j'ai trouvé qu'il étoit sujet à la nielle si l'on semoit trop clair ; je sème à présent deux *bushels* par acre , & je recueille de quatre à six *quarters*. Jamais je n'achete un char d'engrais , & mon terrain se

automne & au printemps comme dans la supposition contraire ; & cependant pour les terres qui ont trop de pierres , l'opération de l'épierrement est un des avantages de la culture du trefle. (R)

Agriculture. Vol. 2. N°. 2. Février 1797. F

(82)

A N N O N C E S.

bonifie d'année en année. Il est vrai que je nourris communément quarante bêtes à cornes avec des gâteaux de colza, ce qui leur donne un fumier très-actif. Mais que direz-vous quand je vous affirmerai que j'ai eu mes plus belles récoltes de grains dans une partie de ma ferme où je n'ai jamais mis de fumier d'aucune espèce, & où je n'ai compté que sur la qualité améliorante du trèfle, des fèves, & du colza, pour balancer la qualité épuisante du blé & de l'orge, &c. »

» P. S. — Je suis dans l'usage de labourer très-profond. »

A N N O N C E S.

C O U R S D' A G R I C U L T U R E.

Extrait d'une lettre d'Edimbourg.

LE Docteur Coventry donne à l'Université d'Edimbourg un cours d'Agriculture : c'est un homme très-savant, & qui a, en particulier, une haute réputation comme agriculteur, soit en théorie, soit en pratique. On peut être étonné qu'un Docteur en médecine soit un bon cultivateur, & que des étudiants en médecine suivent un cours d'agriculture; mais tel est le fait, & il est certainement beau & intéressant de voir toutes les sciences concourir à la perfection d'un art aussi utile, & porté dans ce pays à un point de perfection dont on n'a nulle idée dans le nôtre.

Avantage des turneps, extrait d'une autre lettre.

.... Le climat de l'Ecosse est certainement froid & le sol aussi ingrat que le nôtre (à Genève), cependant cette seule plante, (le turnep) est une source prodigieuse de fertilité ; c'est presque uniquement au moyen des turneps que les Ecoissois se trouvent en état de fournir de bétail une grande partie de l'Angleterre, & en même temps de fumer & de cultiver leurs champs : il est difficile de concevoir à quel point de perfection la science & la pratique de l'agriculture sont portés dans ce pays ci. . . . Une ferme de l'étendue de 200 journaux, & située dans quelque lieu que ce soit de l'Angleterre ou du midi de l'Ecosse, peut valoir de 4 à 600 livres sterl. de rente ; & ce qu'il y a d'inconcevable, c'est que les denrées de première nécessité se vendent plutôt au-dessous qu'au-dessus du prix que nous en payons à Genève.

Machine à battre le blé.

LE Comte d'Exeter est devenu le premier des amateurs dans l'école d'agriculture du Nord de l'Angleterre ; il vient de faire exécuter deux machines à battre le blé, d'une construction nouvelle, dont chacune doit battre 30 quaters (134 quintaux) de blé par jour, à l'aide de deux chevaux ou de deux bœufs. (*Craftsman* 30 janv.)

V A R I É T É S.

LE Dr. Anderson, de Madras, a envoyé dernièrement au Dr. Anderson, ci-devant à Edimbourg, un échantillon de laine, qui, par sa couleur d'or brillante

semble expliquer l'objet de la fameuse expédition des Argonautes. On voit clairement à l'inspection de l'échantillon que cette laine n'a point été teinte, car elle est encore adhérente à une portion de la peau de l'animal qui a sa couleur naturelle. Ses brins ont environ dix pouces de longueur, & son lustre est égal à celui de la plus belle soie. Il n'est pas douteux qu'avant la découverte de la soie, & lorsque l'art de la teinture étoit encore imparfaitement connu, cette laine a dû être regardée comme une matière extrêmement précieuse. On l'a apportée à Madras des contrées intérieures de l'Inde, & on suppose qu'elle a fait partie des dépouilles enlevées à quelques-uns des Princes du pays. L'animal qui la fournit est inconnu dans tous les établissemens Européens en Asie, & on ignore encore le pays qu'il habite. Peut-être vit-il sauvage dans les immenses déserts du Thibet où l'homme n'a point encore pénétré. (*St. James's Chronicle*).

AGRICULTURE.

EXTRAIT de l'ouvrage d'ARTHUR YOUNG ,
intitulé : SIX MONTH'S TOUR (4^e. vol.
XXXII lettre.)

« **A** VANT que je prenne congé des terres arables , permettez-moi de jeter un coup-d'œil général sur la principale opération des travaux de ces terres , savoir , les labours. Nous verrons s'il existe quelque proportion entre la force employée , les frais du labourage , & la quantité d'ouvrage faite. Il peut être utile d'examiner jusqu'à quel point cette partie de l'agriculture est raisonnée , établie sur de justes proportions , & ce qu'on peut objecter à la pratique. Avant de songer aux remèdes , il faut connoître le mal ; & la connoissance des usages bien raisonnés empêche qu'on ne présente les objets sous un jour plus défavorable qu'ils ne le méritent. Ce genre de recherches n'en est peut-être que plus utile pour donner quelquefois des résultats inattendus ; la connoissance exacte des faits ne sauroit être qu'avantageuse quelle que soit l'opinion qu'elle favorise ; car il est également ridicule de s'attacher à combattre des pratiques indifférentes , en les faisant considé-

Agriculture. Vol. 2. N°. 3. Mars 1797.

G

rer comme nuisibles, & de soutenir tout ce qui est utile, uniquement par respect pour la sanction de l'usage. »

» L'auteur donne ici l'énumération de soixante-sept cantons différens, dans lesquels il a successivement noté ses informations sur les cinq objets suivans : »

» 1°. Le nombre d'animaux attelés à une charrue (1). »

» 2°. Sur l'étendue du terrain labouré dans une journée. »

» 3°. Sur la profondeur du labour. »

» 4°. Sur le prix de la journée de charrue. »

» 5°. Sur le rapport du nombre d'animaux de labour avec une étendue de 100 acres. »

» Il rapporte toutes les terres sur lesquelles ont porté ses observations, à trois especes : les terres sablonneuses, les bonnes terres, & les glaises, ou autrement dit, les terres légères, communes, & pesantes. — Ses observations sur les premières sont au nombre de dix-neuf ; sur les secondes au nombre de trente-trois ; & sur les dernières au nombre de quinze. Voici la récapitulation générale de ces tables : »

» Dans les terres sablonneuses on laboure avec trois bêtes ; »

» La journée de travail est d'un acre ; »

(1) Les bœufs ne sont employés que dans huit endroits sur soixante-sept.

SUR LES LABOURS, PAR ARTH. YOUNG. (87)

» La profondeur du labour est de *quatre pouces* ; »

» Le prix de la journée de charrue est *cinq shellings* ; & le nombre des animaux est de *huit*, pour cent acres. »

» Dans les terres ordinaires, une charrue emploie *trois bêtes & demi* (1) ; on laboure *un acre* par jour ; la charrue va à *quatre pouces & trois-quarts* de profondeur ; la journée de labour coûte *cinq shellings* ; & l'on emploie *neuf bêtes* pour cent acres de terres arables. »

» Dans les terres argilleuses ou pesantes, on laboure avec *trois bêtes & demi* ; on remue la terre à *trois pouces & demi* de profondeur ; il en coûte *quatre shellings* pour une journée de charrue ; & l'on tient *onze bêtes* pour cent acres à labourer. »

» La moyenne entre toutes les terres est donc : »

» $3\frac{1}{2}$ Bêtes par charrue. »

» 1 Acre par jour.

» 4 Pouces de profondeur. »

» 4 Shellings & deniers pour prix d'une journée de charrue. »

» $9\frac{1}{2}$ Bêtes pour cent acres. »

L'auteur fait ensuite les réflexions suivantes.

» Ce tableau de l'état du labourage dans

(1) L'auteur a été obligé de supposer des fractions d'animaux.

toutes les parties que j'ai visitées donne une idée fort nette de la chose ; & le résultat est remarquable. »

» Je n'avois jamais imaginé qu'il existât une juste proportion entre la force des attelages & la pesanteur de la terre à labourer ; mais j'avoue que je n'imaginois pas que la pratique fût absurde au point où les faits ci-dessus la démontrent. Cette égalité du nombre d'animaux employés à mouvoir la charrue dans des terres si différentes est fort étrange. La terre glaise n'en emploie pas plus que la terre ordinaire , & le sable presque autant que l'une ou l'autre. Ce fait montre clairement que la routine seule guide les fermiers quant au nombre d'animaux dont ils attellent leurs charrues : procédé absurde ! & qui ne peut qu'affecter d'une manière très-fâcheuse les profits de leur exploitation & la prospérité du Royaume. »

» Si la moyenne du nombre des animaux de trait employés à la charrue n'étoit pas au-dessus de ce qu'elle doit être , le mal ne seroit pas si grand ; mais il n'y a aucune terre dans notre isle qui demande pour son labour la force de trois bêtes & demi , pourvu que les procédés de l'agriculture soient bien entendus. Si les terres étoient rompues au moment où elles doivent l'être , deux chevaux , ou deux bœufs de bonne taille , suffiroient pour les terres les plus pesantes , en exceptant seulement les pentes ; &

SUR LES LABOURS, PAR ARTH. YOUNG. (89)

encore comme elles doivent se labourer en travers, elles n'exigent gueres plus de force que les terrains en plaine. La moyenne du nombre employé est donc presque double de ce qu'elle devrait être. La moyenne des terres argilleuses est la même que la moyenne prise sur le tout; quel n'est donc pas l'excès du nombre d'animaux employés dans les terres sablonneuses ! »

» Personne ne peut alléguer l'expérience en réponse à cette observation. Que peut signifier ici la coutume du canton & la prescription des siècles ? Il est de toute évidence que cette coutume, & cette longue expérience sont les effets du hasard seul, & non de la raison ou de l'examen des convenances. Il n'y a point de vérité mieux démontrée en géométrie que celle-ci, savoir qu'il faut plus de force pour labourer de la terre glaise que pour labourer du sable ; & que cette force peut se résoudre en quantité d'ouvrage fait dans la journée de charrue, tout comme en nombre d'animaux de trait. Tous les fermiers conviendront de cette proposition, mais ils sont bien éloignés d'avoir l'idée du résultat général, ou d'une moyenne prise sur toutes les terres. »

» Le tableau nous montre encore plus d'égalité entre les surfaces du terrain labourées dans un jour, qu'entre les nombres comparatifs des animaux employés dans des terres différentes; il est donc absolument hors de doute que tout

le système du labourage est une affaire de hasard. On ne peut pas réfléchir que des fables sont labourés avec plus d'animaux qu'il n'en faut pour la glaise, & en ne faisant pas plus d'ouvrage que dans celle-ci; on ne peut, dis-je, réfléchir à une telle économie d'agriculture sans indignation. Des milliers de familles éprouvent les atteintes du besoin; des millions de chevaux sont nourris aux dépens d'industriels sujets. C'est là un objet d'une importance infinie : un mal qui sollicite l'attention de ceux qui ont le pouvoir d'y apporter remède. — Le Parlement pourroit s'en mêler, s'il agissoit avec les ménagemens qu'exigent les droits d'une Nation libre. Mais si l'on ne le juge pas praticable, ou si l'on néglige cet objet, comme mille autres d'une égale importance, pour s'occuper. Je recommande fortement à tous les propriétaires de s'attacher de tout leur pouvoir à remédier à un usage aussi pernicieux. On ne fauroit douter qu'ils ne le puissent : tout ce qu'on doit désirer c'est qu'ils le veuillent. Au moment où un homme, qui a de l'argent en poche, prend une ferme résolution, elle est à moitié exécutée. Il faut employer les primes, les encouragemens, les récompenses, non-seulement avec les fermiers, mais avec les laboureurs. Il faut se procurer à tout prix des fermiers & des domestiques auxquels les bonnes pratiques soient familières. Il vaut la peine, assurément, pour

SUR LES LABOURS, PAR ARTH. YOUNG. (91)

les propriétaires de se mettre en mouvement, car ils ne sauroient introduire dans leur canton une méthode économique de culture sans accroître sensiblement le revenu de leurs terres ; & je ne mets point en ligne de compte le sentiment d'avoir rendu à leur pays un service éminent , sentiment qui , je le fais , seroit précieux pour un grand nombre d'entr'eux. »

» C'est encore là un objet bien digne de l'attention de la Société pour l'encouragement des arts , des manufactures & du commerce. Elle pourroit aisément exciter par des prix honorables le zèle des gentilshommes qui réussiroient à introduire dans un canton d'une certaine étendue la culture économique dont il est question. »

» Tout est absurde dans les résultats de la table que j'ai présentée. Sur l'article de la profondeur du labour , le lecteur observera que la charrue pénètre dans les terres ordinaires trois quarts de pouce plus bas que dans le sable ; & qu'il ne s'en faut que d'un demi-pouce que la charrue n'aille aussi bas dans la glaise que dans le sable. Cela démontre évidemment que la coutume prescrit également dans chaque canton la profondeur où l'on doit labourer , & que cette coutume est suivie machinalement sur tous les terrains , quelque différens qu'ils soient les uns des autres. C'est le hasard , & non la raison , qui a produit l'usage. »

» On trouve une nouvelle preuve de cette

vérité en examinant comparativement les prix du labourage. La journée de charrue est d'un shelling moins chère dans les terres argilleuses que dans les autres. »

» Le rapport du nombre d'animaux de trait avec cent acres arables, est un peu plus raisonnable. Il y a une légère différence entre les terres de différente nature, mais elle est évidemment moins considérable qu'elle ne devrait l'être. Ceci prouve encore combien l'agriculture du Royaume a besoin d'une réforme relativement au nombre des chevaux employés. La moyenne est au-dessus de neuf pour cent acres; nombre énorme! & qui répond à la surabondance de force absurdement employée dans les charrues. »

» Les fermiers des parties les plus riches & les mieux cultivées du Comté d'Essex, surtout entre Braintree & Hockerill, auprès de Samford & de Thaxted, n'entretiennent que quatre à cinq chevaux pour cent acres de terres arables, & par conséquent ces chevaux font, en outre, tout l'ouvrage des prés. On compte que pour une ferme de deux cents acres de champs & cent acres de prés, dix chevaux font un nombre très-suffisant. Or il faut remarquer que le sol de ces cantons est une terre argilleuse très-tenace, qui donne de grandes récoltes en fèves, & qu'il y a une bonne partie des champs de ces fer-

SUR LES LABOURS, PAR ARTH. YOUNG. (93)

mes qui sont en pente, en sorte que l'ouvrage de la charrue est pénible : cependant ils labourent toujours avec deux chevaux, & labourent très-bien, quoiqu'ils ne rompent jamais les chaumes du blé qu'après les semailles de l'orge. »

» Il en est de même dans les cantons de Suffolk qui sont le mieux cultivés. Mais, neuf chevaux pour cent acres ! c'est un abus affreux ; & si l'on réfléchit que les sables & les autres terres légères se trouvent comprises dans le tableau, on conviendra que c'est au moins cinq de trop. En sorte que dans toute cette étendue de pays, il y a plus de la moitié des chevaux qu'on nourrit inutilement. Lorsque de nombreux attelages produisent des labours multipliés, & une agriculture excellente, l'objection tombe ; mais nous voyons bien que ce n'est pas ici le cas, puisque les fermiers à terres pesantes ne tiennent pas plus de bêtes de labour que les fermiers à terres légères, & que la profondeur des labours est la même partout. — C'est une triste chose que de penser, que dans une portion si considérable du Royaume, la moitié des chevaux employés est nourrie inutilement. Personne ne prétendra contester que des chevaux inutiles ne soient nuisibles. De quel côté qu'on envisage la chose on ne sauroit en disconvenir. Ces chevaux là n'ont aucun rapport à l'exportation, en supposant que ce commerce fût avantageux : puisque dans ce

cas-ci nous, consommons nous-mêmes ce qui, dans les principes mercantiles, devrait être converti en argent. Ce grand nombre de chevaux empêche la culture d'une très-grande quantité de grains qui s'exporteroient ; ces animaux occupent les pâturages qui engraisseroient des bêtes à cornes, lesquelles fourniroient à notre consommation, & nous permettroient d'exporter plus de blé. Ces chevaux inutiles ne procurent aucune consommation avantageuse, ils ne mettent en mouvement aucune classe utile de manœuvres ; enfin sous quelque rapport que l'on considère la chose, ce nombre de chevaux est pernicieux à l'agriculture, à l'agriculteur, & au public. »

» Dans le choix entre les chevaux & les bœufs, le raisonnement donne, de beaucoup, l'avantage à ceux-ci. Dans les lieux où l'on emploie les uns & les autres, & où l'on a comparé avec soin leur usage, on trouve les bœufs préférables sous tous les rapports, excepté la vitesse ; & encore, sur ce point, leur désavantage se réduit à rien, puisqu'on peut les tenir deux heures de plus à l'ouvrage que les chevaux. Ils font la même quantité de travail, & le font mieux. On convient par-tout qu'ils coûtent moins à entretenir ; & malgré tant d'avantages, on ne les emploie que dans un petit nombre d'endroits ; & il y a des Comtés entiers qui ne possédoient pas un cheval de charrue il y a quel-

SUR LES LABOURS , PAR ARTH. YOUNG. (95)

ques années , & où maintenant on ne voit pas une seule paire de bœufs pour le labourage. Cela paroît fort extraordinaire , & pour bien des gens cela équivaut à la preuve que les chevaux sont préférables. »

» Je crois cependant qu'on peut expliquer ce fait sans cette supposition. J'attribue ce changement au surhaussement du prix des bêtes grasses depuis quelques années. On sait que dans les provinces à bœufs , les fermiers étoient dans l'usage d'avoir trois classes de bestiaux. La première étoit celle des jeunes bœufs qu'on élevait ; la seconde celle des attelages ; & la troisième celle des bœufs à l'engrais , qui avoient travaillé trois ans. Mais lorsque le prix des bêtes à corne augmenta au point que les bêtes maigres se vendoient autant qu'avoient valu auparavant les bœufs gras , les fermiers furent tentés de vendre les jeunes bœufs avant de les travailler ; ou du moins ils les mirent immédiatement à l'engrais pour en toucher plus promptement le prix. La diminution considérable du nombre des bœufs de charrue pendant le temps où le bétail a été si cher , donne lieu de penser que c'est là la cause du fait. Je n'ai pas besoin de dire que cette raison de préférer les chevaux est aussi mauvaise que les autres. L'avarice seule des fermiers leur dicte cette conduite ; non pas pour faire de plus gros profits , mais pour se procurer de l'argent comptant aux dépens de l'avenir. »

Le célèbre Marquis de Mirabeau , MM. Quesnai fils & Le Roi , outre plusieurs autres Français qui ont du mérite , se sont attachés à décrier l'usage des bœufs. Ils divisent l'agriculture de France en deux parties , la grande & la petite culture : c'est-à-dire , celle des chevaux & celle des bœufs. Ils représentent celle-ci comme fort inférieure ; mais leurs argumens contre-disant toutes les idées que nous avons en Angleterre , il faut que les circonstances varient prodigieusement dans les deux Royaumes. Les principales objections de ces écrivains paroissent plutôt porter contre les attelages de bœufs que contre l'usage des bœufs. Il paroît par diverses expressions qu'ils emploient , que les bœufs de charrue , en France , sont petits , maigres , foibles , misérables ; car ils parlent de les faire pâturer dans les communaux : si cela est , il n'est pas étrange que la culture des bœufs ne soit pas profitable (1).

(1) Je n'ai pas l'Encyclopédie sous la main ; mais voici ce que dit Mr. de Mirabeau : « Dans la grande culture un homme seul conduit une charrue tirée par deux chevaux , qui fait autant de travail que trois charrues tirées par des bœufs , & conduites par six hommes. Dans ce dernier cas , fautes d'avances primitives pour l'établissement d'une grande culture , la dépense annuelle est excessive par proportion au produit net , qui est presque nul , & l'on y emploie dix ou douze fois plus de terres. Les propriétaires manquent de fermiers en état de subvenir à la dépense

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (97)

OBSERVATIONS IN A TOUR, &c. Observations
dans une tournée faite en Suffolk & Surry.
Par R. PROCTER ANDERSON. (Tiré des
Mémoires de la Société de Bath.)

JE vous envoie, selon ma promesse, quelques
détails sur ma tournée en Suffolk & Surry. Les
Annales d'Agriculture contiennent beaucoup de

d'une bonne culture ; les avances se font aux dépens
de la terre ; le produit des prés est consommé pendant
l'hiver par les bœufs de labour, & on leur donne une
partie de la terre pour pâturage pendant l'été. Le
produit net de la récolte approche si fort de la non-
valeur que la moindre imposition fait renoncer à ces
restes de la culture : ce qui arrive même en bien des
endroits, tout simplement par la pauvreté des habitants.
Ce détail d'agriculture se trouvera combattu par l'ha-
bitude & par le préjugé local dans bien des lieux. Vous
entendez dire aux Notables, même parmi les Nations
pauvres qui sont réduites à cette petite culture dans
les trois quarts de leur territoire, & où il y a d'ail-
leurs plus d'un tiers de terres cultivables qui sont en
non-valeur : on assure, dis-je, dans ces pays-là, que
la grande culture n'est pas propre à leurs terres ;
qu'elles sont ou trop compactes ou trop légères pour
les chevaux impatiens ; qu'ils nourrissent leurs bœufs
avec presque rien pendant tout l'été ; qu'il ne leur
faut ni avoine, ni orge, ni fers, ni harnois coûteux ;

(98) AGRICULTURE.

choses sur l'excellente culture de ces deux Comtés, ce qui m'empêche de m'étendre autant que je l'aurois fait sans cela.

A la fin de Mars 1788, je fis une visite à Mr. Young, à Bradfield. Je vis, devant sa maison, environ trois acres de choux, très-bien cultivés & très-proprement tenus. Il y avoit dans le même champ des turneps qui en étoient séparés par des claies, & des moutons qui les mangeoient sur place. Deux de ces moutons étoient couverts, pour rendre leur laine plus fine. Dans la partie du champ où les turneps étoient mangés, on labouroit pour semer de l'orge. On devoit faire trois labours, soit

& autres objections qui sont autant d'argumens de la misère raisonnée.» (L'ami des hommes, T. VI. p. 91.)

— Qu'auroit dit Mr. de Mirabeau si je lui avois appris que je me servois en Suffolk d'attelages de deux bœufs par charrue, qui égaloient mes meilleurs chevaux en quantité d'ouvrage fait à la journée; dans le même nombre d'heures, mieux labouré, & à plus bas prix, par acre, l'aide compris. Les bœufs me coûtent 15 liv. sterl. la paire, & l'emportent pour le labourage sur les chevaux qui m'en coûtent trente. (A)

Ce dernier fait est remarquable, mais ne sauroit servir de base à un calcul comparatif des deux méthodes. La vérité, comme il arrive souvent, se trouve ici dans les idées moyennes, & il ne faut exclure du travail de la charrue ni l'une ni l'autre race. (Voyez le vol. I d'Agriculture, p. 306 & suivante.) (R)

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY.

dans la partie où étoient les turneps , soit dans la partie qu'occupaient les choux (1). Ceux-ci avoient été cultivés à la houe-à-cheval , ceux-là avoient été sarclés à la main.

L'affolement de Mr. Young sur les terres sablonneuses ou graveleuses , est le suivant :

1^{re}. année. Choux ou turneps fumés.

2^{me}. — Orge sur trois labours..

3^{me}. — Treffe (2).

4^{me}. — Fèves.

5^{me}. — Blé.

Il met , sur un acre , quarante tombereaux à un cheval , de fumier pour les turneps ou les choux. Il dispose son terrain en sillons étroits. Sur les terres humides & les glaïses de 9 shellings par acre , après avoir fumé légèrement il plante (dibbles) (3) , sur une seule façon , des féverolles noires à neuf pouces de distance en tous sens. Ce plantage lui coûte 3 shellings par bushel : la même année il sème du blé , puis au printemps suivant , du treffe ou quelque autre graine de prés , sur le blé.

(1) Voyez dans le premier vol. d'Agriculture (p. 179. & suivantes) les raisons de ces labours répétés pour préparer la terre à recevoir l'orge. En Norfolk on laboure souvent jusqu'à trois fois dans la même semaine lorsqu'on est pressé par le temps. (R)

(2) Il a été semé avec l'orge l'année précédente. (R)

(3) Voyez l'article du plantage du blé , 1^{er} volume d'Agriculture , p. 49. & suiv. (R)

Mr. Young fait charrier tous ses foin & ses moissons avec des charrettes à un cheval, qu'il trouve plus commodes que les chars ou charriots ordinaires.

Son parc d'hiver, qui contient cent moutons, est garni de chaume de froment, qu'on renouvelle aussi souvent qu'il est nécessaire, & tous les jours lorsqu'il pleut. Une partie du parc est couvert, & les rateliers pour le foin sont dans cette partie. Il ne donne gueres des turneps à ses moutons dans le parc domestique. Lorsqu'il fait sec, on les sort le matin de bonne heure & on les rentre tard. Lorsqu'il pleut on leur donne du foin; lorsqu'il neige & qu'il fait un temps orageux, on leur donne des turneps; mais leur principale nourriture dans le parc domestique c'est le foin.

Tous les fermiers devroient venir à l'école de Mr. Young pour apprendre à faire beaucoup d'engrais, & d'une qualité supérieure. Ses tas de fumier reposent sur le sec; mais ils sont arrosés journellement avec l'urine des bestiaux. Il a disposé des conduits qui débarassent les cours de toute l'eau des toits, sans emporter la graisse des fumiers; & l'urine des bestiaux se réunit dans un réservoir, d'où on la jete sur les tas.

Dans le courant d'avril, lorsque le temps est chaud & orageux, il fait retourner ses fumiers; & pendant que l'on fait cette opération, un
jeune

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (101)

Jeune homme y jete du sel marin par poignées , dans la proportion d'une livre par *yard* cube. Il se sert aussi d'un cuvier monté sur des roues & dans lequel on rassemble tous les déblais de la maison & des cours pour les mettre en tas , ce qui au bout de l'an produit plusieurs charretées de bon fumier.

Dans les environs de *Bury* , il est d'usage , lorsqu'on débarrasse le terrain des turneps pour les semailles du printemps , de couper le pivot des raves , puis de placer celles-ci , auprès les unes des autres , sans intervalles , la feuille en haut , dans un pâturage sec , jusqu'au moment du besoin. — Dans les terres qui conviennent le mieux aux turneps , la feuille n'est pas considérable ; mais dans les terres froides & fortes , qui ne conviennent pas à cette racine , la plante donne en feuilles , & la rave demeure petite.

Je n'oublierai jamais la réception aimable que me fit Mr. Young. Il invita chez lui plusieurs Gentilshommes cultivateurs de son voisinage , & nous rendîmes ensemble une partie de ces visites. — La manière dont ces visites se font est singulièrement agréable , & avantageuse à ceux qui veulent s'instruire. Je voudrois fort que l'usage s'en introduisît dans notre Comté & dans toutes les provinces du Royaume. On se rassemble dans la matinée , assez tôt pour pouvoir parcourir ensemble avant dîner , à che-

val ou à pied , les domaines de chacun des conviés. Dans cette tournée , on se fait réciproquement des observations sur les défauts qui peuvent se présenter dans la méthode de chacun. On ne sauroit imaginer à quel point cette pratique encourage leur émulation ; & la culture de leurs fermes le prouve. C'est un bien pour le public , en même temps qu'un avantage pour les particuliers. Ceux-ci y trouvent plaisir , santé & profit.

On fait que près de Bury l'usage est de labourer avec deux chevaux ou deux bœufs de front , & sans aide. Je rencontrai sur la route le superbe attelage de bœufs de Mr. Hedington , dont on peut voir la description dans les annales , ainsi que de sa culture de turneps , & en général , de son économie rustique qui vaut bien la peine d'être étudiée.

J'ai été extrêmement frappé des choses nouvelles que j'ai observées dans la méthode de Mr. Mure de Great-saxham , avec lequel nous passâmes presque deux jours entiers. Je vais vous en donner quelques détails.

Il engraisse annuellement environ 180 bêtes à cornes. Il en tire une partie d'Ecosse & de Galles. Il les nourrit à l'étable tout l'été en leur faisant manger des fourrages verts , des vesces , &c. Dans l'hiver , il leur donne un peck de fèves fermentées. Il les nourrit encore avec de l'orge fermentée , des patates , des choux ,

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (103)

de la paille hachée , des turneps , de la paille non coupée , de la farine de fèves , & de la farine d'orge.

Il a fait construire un bâtiment ou hangar circulaire , où il y a place pour 46 bêtes , à trois pieds & demi l'une de l'autre. Dans le centre , est le magasin du fourrage. Cela a été fait fort économiquement , avec des sapins abattus pour éclaircir ses plantations. Le hangar est recouvert en chaume ; les rateliers sont en claies ou en osiers. Les piliers auxquels les bestiaux sont attachés , ne dépassent gueres la crèche. Une grande porte donne entrée dans l'intérieur , où il y a place pour un char qui peut faire le tour entre le magasin du fourrage , & les bestiaux. Il fait une quantité de fumier presque incroyable , au moyen de ses bestiaux tenus à l'étable tout l'été , & des chaumes ou pailles qu'il leur fait pourrir en litière. — On rassemble toute l'urine des bestiaux pour en arroser les fumiers , comme chez Mr. Young.

Mr. Mure plante ses choux plutôt qu'on ne le fait d'ordinaire. Il les fait consommer à ses bêtes à l'engrais. Dans la dernière semaine de Mars , pendant que j'étois chez lui , on étoit occupé à planter. Il les fait mettre en lignes assez distantes pour pouvoir passer avec la houe à-cheval , & à vingt pouces l'un de l'autre dans la ligne.

Il a une machine faite exprès pour peser les

gros bestiaux, & qui lui a coûté quinze guinées, outre le couvert qui la met à l'abri. Il a aussi une machine pour piler les pommes de terre. Le travail se fait le plus souvent à bras, mais il peut aussi se faire avec un cheval : c'est une large roue tournante dans une forme en bois, comme une machine à piler les écorces.

Peu de temps avant ma visite à Saxham il s'étoit fait un pari entre MM. Mure & Macro, sur la valeur comparative d'une récolte de turneps sarclés, ou cultivés à la houe-à-cheval. Mr. Mure parioit pour la houe-à-cheval, & Mr. Macro pour le travail à la main (1). Le pari devoit se décider d'après la récolte d'un champ que Mr. Mure faisoit préparer dans ce but. La division étoit faite ; les deux récoltes devoient être placées auprès l'une de l'autre, dans la longueur du champ, & chaque intéressé devoit prendre soin de sa partie comme il l'entendrait.

J'eus le plaisir de voir depuis les deux récoltes sur pied : elles paroissent également belles ; mais j'ai su que les turneps au semoir, & au *cultivateur* avoient rendu 14. $\frac{1}{2}$ tonnes par

(1) La culture des turneps à la houe-à-cheval ou avec le *cultivateur*, suppose toujours que la graine a été semée au semoir, c'est-à-dire, en lignes régulières. Lorsqu'on a semé à la volée, on ne peut que sarcler. (R)

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (105)

acre, tandis que les turneps sarclés n'en avoient rendu que 10. — Mr. Macro convaincu par cette expérience, prit la résolution de ne plus cultiver les turneps autrement qu'avec la houe-à-cheval; mais malheureusement il est mort peu de temps après.

Lorsqu'on fit la comparaison du poids des deux récoltes, on employoit une sorte de paniers longs qu'on nomme *skippers*; & on observa qu'un skipper de turneps houés pesoit beaucoup plus qu'un skipper de turneps sarclés, ce qui montrait que la racine avoit reçu plus de nourriture, & avoit plus de consistance, à volume égal; en sorte qu'à apparence égale dans le champ, la récolte houée a une plus grande valeur que l'autre.

Je passe maintenant au Prince des Fermiers, Mr. DUCKITT d'Esher-place. Je visitai sa ferme au mois d'avril avec MM. Young & Macro; mais n'ayant pas le temps d'y faire toutes les observations que je désirois, j'y revins au mois de juillet suivant.

La ferme de Mr. Duckitt est la plus complète, & la plus proprement tenue que j'aie vue de ma vie. — Il dispose tous ses champs en planches suffisamment larges pour contenir neuf à dix lignes des plantes dont il répand la graine au semoir; & l'intervalle entre ses lignes est ordinairement de neuf pouces. Sa ferme d'Esher contient environ 500 acres, & il y en a 400

de terres arables. Ses terrains sont en général sablonneux avec du gravier dessous. Il a cependant des terres argilleuses, & assez fortes pour les fèves, du moins pour la petite forte ou féverolles.

Il sème sur les planches.

Du blé	}	à neuf pouces d'une ligne à l'autre.
De l'orge		
De l'avoine		
Du seigle		
Et de l'orge mêlée de graine de trefle		
Des vesces	}	à onze pouces.
De l'avoine mêlée de vesces . .		
Du seigle mêlé de vesces . .		
Des pois mêlés de turneps . .		
Et des fèves à dix-huit pouces.		

Lorsque son terrain est bien préparé par la charrue, il fait cinq sillons avec une charrue à semer qui porte le même nombre de focs; alors la machine à semer suit, & la herse termine l'ouvrage.

Lorsque la récolte est assez haute pour la houe, Mr. Duckitt fait passer à la fois deux houes avec un seul cheval. Chaque instrument cultive cinq allées ou intervalles, & a un homme pour le diriger. Une houe travaille à la droite & l'autre à la gauche de la raie qui sépare les planches, tenant ainsi chacun une demi planche en largeur. Le même cheval traîne les deux instrumens réunis par une traverse,

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (107)

& est conduit par un petit garçon. Une allée ou une venue suffit donc à cultiver dix intervalles. Lorsque le terrain est excessivement sec, ou très-humide, on met deux chevaux de file; mais, quoiqu'il en soit, la terre ne souffre jamais du piétinement des chevaux, parce qu'ils marchent toujours dans la raie. Il a des instrumens qui ont six focs, & qui prennent ainsi douze intervalles entre les deux.

Lorsque Mr. Duckitt inventa ses houes-à-cheval, il jugea que l'ouvrage se feroit avec plus d'exactitude si l'homme chargé de la direction de l'instrument se plaçoit entre la machine & le cheval, & cheminoit à reculons. Cette méthode, qu'il pratiqua pendant quelque temps, exposoit le conducteur à des accidens si le cheval avoit des caprices. Le Roi, qui a souvent visité la ferme de Mr. Duckitt, fit cette observation à un des fils du fermier, en voyant travailler les houes; & l'inventeur les a modifiées de manière que le conducteur se place maintenant en arriere de l'instrument, & le dirige en toute sûreté.

Mr. Duckitt me dit qu'il ne fauroit à laquelle des deux houes donner la préférence quant à la perfection de l'ouvrage. Il se sert de toutes deux selon l'occasion, & ne suspend jamais le travail pour employer l'une plutôt que l'autre. Mais lorsqu'il faudra remplacer les instrumens, on préférera sans doute ceux qui

(108) AGRICULTURE.

n'exposent point le conducteur , & on rendra ainsi hommage aux dispositions bienveillantes qui ont inspiré cette observation à Sa Majesté.

On ne peut rien imaginer de plus régulier & de plus soigné que les tas de blé en gerbes, tels qu'on les fait chez Mr. Duckitt. Ils s'élargissent peu-à-peu , & forment un énorme renflement à moitié hauteur, pour diminuer ensuite graduellement, & se terminer en pointe. Ils sont recouverts en chaume avec une extrême propreté , & font grand plaisir à voir. Je suis persuadé que les plus considérables que j'ai vus à cette ferme contenoient plusieurs centaines de bushels de froment.

J'eus le plaisir d'assister à la semaille d'un champ de onze acres, que Mr. Duckitt mettoit en turneps. La promptitude avec laquelle il procède est presque incroyable. Son champ étoit parfaitement labouré & hersé. Il commença au milieu du champ avec deux charrues à semer, qui travaillèrent ensemble en s'écartant peu-à-peu l'un de l'autre. Les semoirs suivoient ; ensuite venoit une charrue à versoirs (*double-mull*, or *strick-furrows-plough*) qui marquoit des planches de dix lignes de turneps semées à onze pouces les unes des autres ; enfin trois herbes légères , réunies par une traverse , & traînées par deux chevaux (qui marchaient à même hauteur des deux côtés de la planche , & dans les raies faites par la charrue à versoir) termi-

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (109)

noient l'ouvrage. — Chaque herse avoit trente dents fort rapprochées , afin que l'instrument remplit plus sûrement l'objet , qui est de recouvrir la semence sans la déplacer.

Les charrues à semer , en retournant dans le sens opposé à celui qu'elles viennent de suivre , reprennent , avec un des focs , la dernière raie tracée : ce qui donne une régularité parfaite à l'ouvrage , & fait que les récoltes sur pied sont admirables à voir. Ce sont les plus belles dont j'aye jamais eu connoissance , & il y a deux raisons essentielles de cette supériorité ; la première , c'est que les graines sont placées à la profondeur convenable , & la seconde , que la houe-à-cheval anime la végétation.

Les instrumens dont se sert Mr. Duckitt sont d'une perfection achevée ; je voudrois pouvoir lui rendre justice dans la maniere de les décrire. Je n'ose l'entreprendre ; mais je dois faire observer qu'il a un instrument destiné à préparer le sol pour les carottes , qui remue la terre , sans la retourner , jusqu'à près de deux pieds de profondeur. Cet instrument seroit extrêmement utile pour préparer le terrain aux plantations des bois. En faisant suivre une forte charrue d'une machine semblable on remueroit la terre à plus de deux pieds de profondeur.

Les instrumens de Mr. Duckitt sont presque tous de son invention. S'ils étoient connus & employés dans tout le Royaume , il en résul-

teroit un très-grand avantage pour l'agriculture (1). Les machines nécessaires à la préparation de la terre, à la semaille, & à la culture de la récolte pendant la croissance, coûteroient environ 30 Livres sterling.

Si une petite partie de l'argent du trésor destiné aux primes pour encourager la culture du lin &c. pouvoit être appliquée à acheter des assortimens complets de ces instrumens, pour être mis à la disposition des fermiers qui en

(1) Pour que les instrumens de Mr. Duckitt pussent être employés dans tout le Royaume, il faudroit que l'agriculture y fût déjà au point où elle est dans Norfolk & dans quelques provinces ou cantons distingués sous ce rapport. Il faudroit aussi que les fermiers fussent tous fort intelligens, fort adroits ; & mécaniciens, comme Mr. Duckitt. Il faudroit enfin que toutes les terres fussent sablonneuses & en plaine, comme les siennes. Commencer par répandre les instrumens, seroit rendre la réussite impossible. L'application peu judicieuse de la belle invention du semoir a ruiné plus d'un particulier, & décrédité l'invention même. Il n'y a qu'un cultivateur-pratique, habile de la tête & de la main, exploitant des terres légères dans un pays de plaine, & dont le domaine soit déjà en très-bon état, qui puisse espérer de n'être pas écrasé par les difficultés d'exécution qui se rencontrent nécessairement dans l'emploi du semoir & de tout son attirail. Il est vrai que lorsqu'on réussit dans ce système de culture, les avantages sont très-grands ; mais il faut que les ignorans ou les demi-savans se gardent du semoir comme de la peste. (R)

TOURNÉE EN SUFFOLK ET SURRY. (111)

seroient le meilleur usage, dans chaque Comté, cela seroit fort utile. Je n'aime pas les idées chagrines de quelques-uns de mes confreres cultivateurs. Il n'y a aucun avantage à gronder sans cesse, & à inculper continuellement l'administration. Je ne désespere pas de voir donner des encouragemens au premier & au plus permanent des intérêts du Royaume, soit par des reformes sur les dixmes, soit par des bills généraux de clôture, ou enfin par des dispositions relatives à l'agriculture sur quelque plan semblable à celui que Mr. Duckitt propose.

Son idée est : de voyager lui-même & de faire voyager d'autres personnes, sous sa direction, dans tout le Royaume, aux frais du public; de faire dans divers terrains les semailles selon sa méthode, de faire donner les soins nécessaires aux récoltes pendant leur végétation, aux frais du public; après quoi les fermiers se décideroient à suivre son système ou à continuer selon l'ancienne pratique.

Mr. Duckitt peut être maintenant trop âgé pour une telle entreprise; mais il a des fils qu'il a élevés lui-même, & qui, sous ses directions, seroient très-capables de la partie active de ce travail.

Je termine ce long détail en rappelant le présent que le Marquis de Rockingham fit à Mr. Duckitt. Il lui donna une grande coupe d'argent, d'un travail rare & précieux avec cette inscription :

(112) AGRICULTURE.

« A WILLIAM DUCKITT, fermier , qui par
» son génie , ses observations judicieuses , ses
» recherches infatigables , fut rendre pratica-
» bles & utiles les principes de TULL , & per-
» fectionna ainsi la culture des terres légères ,
» Charles Marquis de Rockingham présente
» cette coupe en témoignage de respect pour
» son mérite public 1774. »

» *Bonus civis bonus agricola.* »

CORRESPONDANCE.

LETTRE SUR LA LUZERNE.

Montagny près d'Yverdon 25 février 1797.

MESSIEURS,

VOTRE intéressant Journal , en nous faisant connoître le système du célèbre Young , sur la culture de la luzerne , m'a fait naître l'idée , que ceux de vos lecteurs , qui ne sont pas à même de puiser dans les sources , ne feroient pas fâchés de voir comment Pline parle de cette même plante ; & de comparer les méthodes & les auteurs anciens avec les modernes pour juger des progrès de l'art.

Je me suis mis à traduire ce que ce savant , & exact naturaliste a écrit en si peu de mots sur ce sujet.

LETTRE SUR LA LUZERNE. (113)

J'y ai joint un commentaire , dont le texte n'a pas besoin , sans doute , pour les gens du métier , mais qui peut fournir quelques idées utiles , à ceux qui commencent à s'y vouer. J'ai cherché à généraliser un peu plus les principes.

Mais cet essai est bien imparfait. Pour oser vous le présenter , Messieurs , je me cache derrière Plin , je marche à sa suite comme un de ses admirateurs , mais cela ne suffit pas , quoique je soye aussi le vôtre , pour avoir les entrées libres.

Quoiqu'il en soit , comme je n'ai d'autre prétention que celle d'être utile , je vous abandonne mon petit travail , pour en faire l'usage que vous trouverez bon. Mettez-le de côté , si c'est un hors d'œuvre : jetez-le au rebut , s'il ne vaut du tout rien. Décomposez-le : recomposez-le , s'il y a quelque bons matériaux : le sujet ne pourra que gagner en passant par vos mains.

Agréez ma reconnoissance , Messieurs , pour le plaisir que j'ai en lisant votre ouvrage. C'est avec ce sentiment & celui d'une considération distinguée que j'ai l'honneur d'être ,

MESSIEURS ,

Votre très - humble &
très-obéissant serviteur
L. AUBERJONNOIS.

PLINE , Livre XVIII. Chapitre XVI.

De la luzerne.

» *La luzerne*, connue en Grèce sous le nom de *medica*, est une plante, qui y fut apportée par les Medes, pendant les guerres que Darius Roi des Perses fit aux Grecs. Il faut surtout remarquer, qu'elle est si vivace de sa nature, qu'une fois semée, elle peut durer plus de trois cents ans sur le même sol, ».

« Elle est semblable au trèfle par les feuilles, & par la tige, qui est articulée à nœuds. Tout ce qui en sort a une direction droite & élevée : ses feuilles ont la faculté de se contracter, & de se plier selon certaines circonstances. »

» Le sol, où l'on veut la semer, doit avoir été épierré, nettoyé & défriché en automne. Bientôt après avoir labouré & hersé, il faut y faire marcher la herse une seconde, & une troisième fois, en laissant une intervalle de cinq jours entre chaque opération, avec addition de fumier : car cette plante demande, ou un terrain sec, substantiel & riche, ou un terrain qui puisse être arrosé. »

» Après cette préparation, on la sème au mois de mai ; plutôt, elle seroit exposée aux gélées blanches, qui lui sont contraires. Il faut

LETTRE SUR LA LUZERNE. (115)

la semer fort épais , afin , que toute la surface du sol en soit occupée , pour ôter la place aux mauvaises herbes , qui croitroient dans les intervalles , si l'on semoit clair. Cela se fait en semant 20 boisseaux sur un arpent. Il faut prendre garde que la semence ne se brûle , & l'on doit la recouvrir de terre , aussitôt qu'elle est semée. »

» Si le terrain est humide & herbeux , elle est subjuguée & elle dégénere en pré naturel. C'est pourquoi , aussitôt qu'elle est de la hauteur d'un pouce , elle doit être délivrée de toute herbe étrangere ; & cela doit se faire plutôt avec la main , qu'avec un sarcloir. »

» On la coupe quand elle commence à fleurir , & chaque fois qu'elle refleurit ; ce qui arrive six fois dans le courant d'une année , & pour le moins quatre fois. Il faut l'empêcher de monter en graine , parce que le fourrage en est plus utile , jusqu'à sa troisième année. »

» C'est au printemps qu'on doit la semer , & la délivrer de toutes les autres herbes. Quand elle a trois ans , il faut racler le terrain avec des houes ; par ce moyen toutes les autres herbes sont détruites , sans qu'il lui arrive aucun mal , à cause de la profondeur de ses racines. Si les herbes ont pris le dessus , le seul remède est , de la labourer , en retournant la terre plusieurs fois , jusqu'à ce que toutes les autres racines soyent détruites. »

» Il ne faut pas en donner au bétail autant qu'il pourroit en manger, pour n'être pas obligé d'avoir recours à la saignée, pour désemplir les vaisseaux. Il est plus avantageux de la donner en vert. En la séchant pour en faire du foin, les cotons deviennent durs & ligneux, & au bout d'un certain temps, elle se réduit en poussière, qui n'est bonne à rien. »

Commentaire.

Voilà un détail qui renferme avec précision, à-peu-près tout ce qu'il y a d'essentiel pour la culture & l'usage de la luzerne. Le sol qui lui convient est bien désigné, sa préparation est exacte. Elle consiste à le nettoyer de ce qui pourroit s'opposer au travail pivotant des racines, & à rendre la superficie du terrain parfaitement regalée, meuble, & réduite presque en poussière.

Le travail répété de la herse paroît plus propre que celui de la charrue & que tout autre à obtenir ces deux conditions: l'inégalité de la surface nuit à la distribution de la semence, & la grossièreté de la terre nuit à sa levée.

La quantité de semence à répandre sur un arpent Romain, qui est à-peu-près les cinq sixièmes, du petit arpent de France, de 100 perches de 18 pieds de roi, paroît démesurée: mais, ou bien il y a ici une faute de copiste, 20 boisseaux pour 20 livres; ou bien, il s'agit de

LETTRE SUR LA LUZERNE. (117)

de semences contenues encore dans leurs enveloppes, & qui n'ont point été mondées. Cette dernière explication est cependant défectueuse, parce que les coiffes de la filique, & les poussieres n'ayant pas une proportion déterminée, & toujours la même, avec les graines qui y sont contenues, on est exposé en la suivant à ne savoir pas précisément la quantité de germes de plantes, ou de graine, qu'on répand sur un arpent; & par conséquent à semer trop clair, ou plus épais qu'il n'est nécessaire. Il vaut donc mieux semer le grain nud, & net; & j'ai cru remarquer, que 15 liv. étoient le minimum de semence pour le petit arpent des environs de Paris, qui équivalait à la pause de 500 toises de neuf pieds de Berne; & 20 livres pour le maximum: en observant en même temps, qu'il vaut mieux semer trop épais que trop clair.

Le temps de la semaille est fixé au mois de mai, à cause des gelées blanches qui sont en effet redoutables pour cette plante *à sa levée*. Ainsi chacun doit consulter son climat, & les probabilités du temps.

L'époque précise pour tous, au printemps, est celle où les gelées blanches ne sont plus *beaucoup* à craindre. Il faut anticiper autant qu'on le peut, pour jouir du bénéfice d'une terre fraîche, des pluies végétatives de cette saison; éviter les sécheresses, qui souvent le

Agriculture. Vol. 2, N°. 3. Mars 1797. I

suivent de très près, & les pucerons dévorans qui se montrent souvent de bonne heure.

Pline recommande en deux endroits de semer au printemps comme s'il eût craint de l'omettre; parce que cette époque étoit la seule bonne, dans un pays très-chaud, pour lequel il écrivoit, où les pluies d'automne arrivent trop tard pour qu'on puisse espérer de voir la luzerne, semée dans cette saison, lever, grandir, & se fortifier assez avant les premiers froids, pour n'avoir plus à les craindre.

Il est extrêmement essentiel au succès de la luzernière, que la levée ait été prompte & simultanée; & sa première végétation non interrompue: car la plante se ressent long-temps des accidens & des maladies de son enfance; elle demeure languissante, & finit presque toujours par périr avant le temps: Dans la germination lente, le plant est ordinairement rare & inégal, & la plante forte détruit la faible qui leve à ses côtés.

Dans les climats tempérés les approches de l'automne sont encore une saison favorable à la semaille: à la fin du mois d'août, les terres sont chaudes; on n'est pas long-temps à attendre des pluies, qui font germer & croître rapidement cette plante qui a encore assez de temps pour se fortifier avant l'hiver. J'ai semé au 22 août, avec un succès complet, dans une terre médiocrement forte, mais douce &

LETTRE SUR LA LUZERNE. (119)

Substantielle, que je ne trouvais pas assez meuble au printemps, quoiqu'elle eût été labourée avant & après l'hiver. Je la pulvérisai pendant l'été & j'eus lieu de ne pas regretter ce renvoi. La hâte de jouir en agriculture, comme en bien d'autres choses, est le plus grand ennemi de la jouissance & des succès.

La manière de semer n'est pas indifférente. Il y a des inconvénients à mêler la semence avec du sable fin, ou de la cendre, & plus encore avec des graines dont la pesanteur spécifique & le volume en diffèrent davantage. La semence ne se distribue pas avec la même égalité, & les poignées sont sujetes à contenir plus ou moins de grains de luzerne. Il faut donc la semer, sans mélange, par pincées entre les deux premiers doigts de la main & le pouce ; & recouvrir tout de suite la semence avec une herse légère.

Pline ne parle pas de semer aucune plante céréale avec la luzerne pour lui servir d'abri, quoiqu'il écrive pour un pays très-chaud.

Mes petites expériences me portent aussi à croire qu'il vaut mieux la semer seule. J'ai remarqué que si les blés semés sont clairs, ils ne protègent pas beaucoup la luzerne, & que s'ils sont épais, ils l'étouffent.

Les plantes du blé, quel qu'il soit, végètent aux dépens des plantes voisines qu'elles affament ; & comme la terre est très-bien préparée, il talle

beaucoup, il s'épâte, fait touffe; & quelque clair qu'il ait été semé, il laisse de grands vides après moisson. Enfin dans tous les cas, la récolte du blé ne se fait jamais que la luzernière n'en souffre; soit par l'introduction des chariots & des attelages, soit par le séjour des ondain sur le pré. Il m'est arrivé d'avoir été obligé d'y laisser de l'avoine fauchée, pendant cinq ou six jours, à cause des pluies qui survinrent; tout ce qui se trouva dessous les ondain, fut entièrement étouffé, & la place nue.

Le sarclage seroit, sans doute, une très-bonne opération pour ôter les mauvaises herbes, s'il pouvoit se faire sans de trop grands frais, & avec assez de précaution pour ne pas endommager les plantes de luzerne, surtout quand elles ne sont encore que de la hauteur d'un pouce. L'essai que j'en ai fait m'a convaincu, que ce moyen dommageable & dispendieux ne peut convenir d'aucune manière à une culture en grand.

Je n'ai pas tenté d'y suppléer en raclant le terrain avec des houes. Il semble que le collet de la racine & la tête de la plante devroient en souffrir; mais j'ai fait passer une forte herse chargée, & traînée par deux forts bœufs sur des luzernières bien enracinées, & j'en ai obtenu d'arracher ainsi une grande quantité d'herbes étrangères. Cependant ce moyen étant

LETTRÉS SUR LA LUZERNE. (121)

encore insuffisant , j'ai eu recours à la charrue d'après Mr. Sarcy de Sutieres , qui la recommandoit expérimentalement.

Ma charrue étoit de celles qu'on appelle à l'allemande , dont le foc n'est qu'une espece de coin de bois recouvert d'une forte lame de fer aciérée. Je me suis servi d'une de ces charrues déjà un peu usée , dont le foc de fer s'étoit apointi au bout ; en sorte qu'il piquoit sans qu'il y eût aucune partie tranchante , dans toute l'armure du foc , & je ne mis point d'oreille.

Je pris donc quatre pouces de terre , environ , en profondeur , sur des largeurs de 12 pouces. Comme le foc étoit peu engagé , il ne remuoit pas toute la terre qui se trouvoit entre les rayes qu'il traçoit. Il y eut quelques plantes déchirées mais en somme totale , ma luzerniere s'en trouva très-bien. J'ai fait cette opération en différens temps sans aucun inconvénient.

Il faut cependant observer qu'elle seroit très-difficile , & même dommageable , en temps trop sec , pour peu que la terre soit forte. Il faut que la surface soit molle , & docile : si elle est ferme & résiste au foc , les têtes des plantes sont arrachées. Ainsi , à moins que le terrain ne soit un sablon gras , & très-mince , il ne faut labourer qu'en terre fraîche. Mais après la charrue , il faut faire passer la herse chargée , &

après la herse le rouleau , lorsqu'on aura enlevé les pierres que les deux premières opérations ont amenées sur la superficie du sol.

Pline observe judicieusement , que le bétail qui en est nourri avec trop d'abondance , est sujet à la plethore. La saignée est le remède à ce mal. Mais il ne parle pas des gonflemens que cet aliment occasionne aux bêtes à cornes , surtout en vert , & à la première pousse du printemps , comme à celle de septembre , où il est le plus dangereux.

Le remède indiqué par feu Mr. Bourgelat est infallible , pour peu qu'il soit appliqué à temps. C'est , pour un gros bœuf , un verre , soit environ quatre onces de bonne eau - de - vie , dans laquelle on a fait fondre une once de nître , & qu'on lui fait avaler.

J'ai sauvé avec ce seul remède , des bêtes à cornes qui sembloient suffoquer , tiroient la langue , & étoient entièrement météorisées , avec une timpanite la plus décidée ; mais j'ai eu soin en même temps , de les faire nettoyer par le fondement , parce que le spasme retient les vents. L'animal tenu au régime sec un ou deux jours , ne s'en est point ressenti dans la suite.

Comme pour fondre promptement le nître , on est obligé d'employer de l'eau chaude , qui affaiblit l'eau-de-vie par son mélange , je présume , qu'en prenant de l'esprit-de-vin , au lieu d'eau-de-vie , son mélange avec les trois onces

d'eau bouillante nécessaires pour fondre le nître, ressembleroit à de l'eau-de-vie, & auroit une vertu énergique.

MANURES CONSIDERED. Des Engrais.
(*Tiré de N. Kent's Hints to gentlemen of landed property*).

LES engrais constituent une partie si essentielle de l'agriculture, qu'il n'y a point d'objet plus important dans la pratique que de chercher à s'en procurer une quantité suffisante, & d'une bonne qualité. L'expérience prouve que la terre la plus fertile cesse de produire si l'on ne renouvelle ses sucs par les engrais ; & que le terrain le plus ingrat, judicieusement amendé, donne des récoltes considérables. Il importe donc de s'attacher à produire autant d'engrais animaux & végétaux qu'il est possible, & d'accroître encore cette quantité par l'addition des autres substances que les circonstances locales permettent de se procurer.

Rien ne contribue plus efficacement à l'augmentation des engrais animaux & végétaux, qu'un assolement bien calculé (1). Je suis porté

(1) Voyez sur cette partie fondamentale, & trop ignorée, ce que nous en avons dit en développant le système de Norfolk, p. 297 & suiv., & 429 & suiv. vol. I d'Agriculture. (R)

(124) AGRICULTURE.

à croire qu'une étendue quelconque d'un terrain médiocre , pourvue convenablement de bétail , & bien cultivée , produira la quantité d'engrais nécessaire pour le maintenir en bon état pendant des siècles , sans secours étrangers. Mais il est difficile de donner des règles exactes sur les assolemens , à cause de la prodigieuse variété des terrains. On peut cependant affirmer que l'ancienne méthode qui consistoit à semer du grain trois ans de suite , puis à laisser , ce qu'on appeloit *reposer la terre* pendant deux ou trois ans , n'est pas la meilleure. Il est temps de renoncer enfin à ce système. Une agriculture semblable à celle de la Flandres est de toutes la plus productive. La terre y donne , comme dans nos jardins , une récolte chaque année , sans rien perdre de sa qualité (1). Tout le secret gît dans l'ordre de la succession des récoltes , & à remplacer des productions à l'usage de l'homme , telles que le froment , l'orge , les pommes de terre , les fèves , les pois , par des récoltes à l'usage des bestiaux telles que les turneps , les carottes , les vesces , le colza , & les foins artificiels. Plus nous nous rapprochons de la maxime de semer alternativement à

(1) Nous renvoyons aux détails que nous avons donnés sur la culture des terres ingrates de Norfolk , ceux de nos lecteurs qui se récrieroient sur ce qu'on propose ici en exemple les riches plaines de la Flandre. (R)

DES ENGRAIS. (125)

l'usage de l'homme & des bestiaux, & plus nous pouvons nous assurer d'être dans les vrais principes des assolemens, & de suivre la méthode par laquelle on produit la plus grande quantité d'engrais animaux & végétaux (1).

Le système de la culture des turneps en Norfolk se rapproche beaucoup de la pratique des Pays-bas. Un de leurs meilleurs assolemens est le suivant.

1^{re}. Année, blé après trefle ou autre foin artificiel.

2^{de}. Orge.

3^{me}. Turneps.

4^{me}. Orge & trefle ou autre foin artificiel.

5^{me}. Trefle, ou autre foin artificiel.

6^{me}. Seconde année de la même herbe, qu'on fait pâturer.

On fume constamment le blé & les turneps, c'est-à-dire deux fois en six ans. Cet assolement entretient beaucoup de bestiaux, & maintient la terre nette & en bon état. Mais on trouve que le trefle y revient trop souvent, & que le terrain s'en fatigue. En se rapprochant davantage de la culture flamande, on perfectionneroit ce cours. On pourroit y admettre huit divisions, & les faire succéder dans l'ordre suivant.

1^{re}. Année, blé après un trefle d'un an.

(1) Voyez la conclusion de la culture de Norfolk, vol. I, pag. 285 & suiv.

2^{de}. Turneps.

3^{me}. Orge.

4^{me}. Pois, fèves, patates (1), vesces, ou colza.

5^{me}. Blé.

6^{me}. Turneps.

7^{me}. Orge & trèfle.

8^{me}. Trèfle.

Le sol produiroit ainsi presque régulièrement des récoltes alternatives pour l'homme & le bétail. La terre ne se lasseroit point du trèfle, qui ne reviendrait qu'une année sur huit, au lieu de deux sur six. Les récoltes *améliorantes* reviendroient de deux en deux ans; le sol seroit parfaitement net, & il résulteroit assez d'engrais des productions pour entretenir la terre constamment en bon état. Je ne conseillerois néanmoins cet assolement que dans un terrain d'assez bonne qualité : il ne réussiroit pas dans une terre stérile. Pour les terrains ingrats la culture des moutons est la plus profitable; parce que l'amendement qu'on obtient par le parc est le meilleur, comme le moins coûteux, qu'on puisse se procurer. Il faut alors des prés

(1) L'auteur met ici indifféremment les fèves & les patates comme préparation au blé. Les belles expériences d'Arthur Young ont prouvé qu'il y a, sous ce point de vue, une prodigieuse différence entre ces deux productions. Voyez le détail de ces expériences vol. I d'Agriculture, p. 429. (R)

artificiels qui durent au moins quatre ans , & qu'on ait soin de bien fumer dans l'année qui suit la semaille.

Tout cultivateur intelligent, & qui voudra y réfléchir, sentira qu'un bon assolement est le moyen le plus efficace d'améliorer ses terres.

Je recommanderois ensuite, comme un objet essentiel, de tirer parti de cette quantité de terre vierge qui se trouve dans les bordures d'un grand nombre de nos routes, mêlée avec du fumier ou de la chaux; cette terre fait un excellent engrais pour les blés, & les turneps. Dans le Comté d'Essex on connoît bien la valeur de cette terre. On a soin d'enlever les bordures de l'intérieur des pièces, jusqu'à un pied de profondeur, pour les mêler avec du fumier, & les répandre sur les champs. Ces bordures, enrichies par la chute annuelle des feuilles, donnent cependant très-peu, parce que l'ombre leur nuit, & que les oiseaux dévastent la récolte; enforte qu'il y a un profit évident à les enlever pour améliorer les autres parties. Il y a un grand nombre de domaines qui possèdent des trésors dans ce genre, & un fermier qui néglige d'en tirer parti est inexcusable. Ce n'est, dira-t-on, qu'un avantage passager, & le procédé ne sauroit se répéter. Mais l'avantage d'améliorer le terrain ne peut être considéré comme passager. La terre est comme les animaux : une fois en bon état, il est facile

de l'y maintenir ; mais si un fonds est détérioré à un certain degré , il devient très-difficile de le rétablir.

Il ne faut pas non plus négliger les recurges de fossés , & les dépôts de boue qui se forment au fond des étangs. Ces substances ont un très-bon effet sur les prés , surtout si l'on y mêle une petite quantité de chaux. Dans le *compost* de la terre vierge qu'on destine aux prairies il convient de faire entrer $\frac{5}{7}$ de cette terre , $\frac{1}{7}$ de chaux , & $\frac{1}{7}$ de fumier.

Les terres argilleuses , de toutes les variétés , sont d'un très-grand effet sur les terrains sablonneux & légers , parce qu'elles leur donnent plus de corps , de tenacité , & qu'elles les rendent capables de retenir l'humidité.

Par les raisons contraires , le sable ne convient pas moins aux terres argilleuses , pesantes ou tenaces. Il détruit la cohésion de leurs parties , & les rend pénétrables aux rayons du soleil , & à l'action de l'air & des gelées. Cela doit être sensible pour tous ceux qui veulent y réfléchir ; & cependant les améliorations de ce genre que l'on fait , ne sont rien auprès de celles qu'on pourroit faire , en mettant à profit les avantages de localité. Il convient de remarquer ici , toujours en raisonnant sur le même principe , qu'on ne doit point ôter les pierres dans les terrains tenaces & froids.

Le sable est encore très-avantageux sur les

prés aigres & raboteux. Rien ne rend la surface plus unie, & ne produit une plus grande quantité de trefle blanc.

La craie, lorsqu'elle est onctueuse & douce, lorsqu'elle se dissout aisément, est un très-bon engrais dans diverses terres. Elle a surtout un effet étonnant sur les glaises, & sur les terrains aigres : elle les divise, les adoucit, les rend fertiles, & si on l'emploie sur des prés elle améliore sensiblement la qualité de l'herbe. Lorsqu'elle entre dans les *composts*, on peut en répéter l'usage, sans inconvéniens, pendant des siècles.

Les marries different beaucoup les unes des autres. La meilleure est celle qui est la plus pesante & la plus savonneuse lorsqu'elle est mouillée. Quand elle est bien choisie, & répandue en quantité suffisante, elle met une forte de fermentation dans le sol, qui en change tout-à-fait la nature. Il est rare qu'elle ait un effet bien sensible avant la troisième année. Mais ce retard est amplement compensé ensuite, puisqu'elle agit pendant vingt ans sans être renouvelée. Il n'y a aucun engrais dont l'effet soit si durable. On a prétendu que la marne ne pouvoit pas être employée deux fois sur le même terrain ; mais je pense, qu'en la mêlant dans les *composts*, on peut y revenir avec succès tous les dix ou douze ans.

Les cendres, de toute espèce, sont assurément

ment de très-bons engrais, mais les cendres de tourbe, en particulier, sont, peut-être, le plus efficace de tous pour les prés artificiels. Ceux qui vivent dans le voisinage de Newbury en Berkshire connoissent tout le prix de cette substance. Il y a un très-grand nombre de prairies & de communaux dans d'autres Comtés où l'on trouveroit de la tourbe; mais la cendre, comme engrais, est bien éloignée d'être appréciée tout ce qu'elle vaut, & est peu recherchée.

La fuye est excellente sur la plupart des terrains. Elle convient singulièrement aux prairies artificielles.

Les pays de côtes ont de grands avantages relativement aux engrais; non-seulement à cause de l'importation qu'on peut en faire, mais encore à cause de la quantité de plantes marines, & de sable qu'on peut recueillir sur les bords de la mer.

On reconnoit généralement que le sel est un stimulant très-actif de la végétation. Ce seroit un grand service à rendre aux cultivateurs & au public que de réduire les droits sur la partie des sels qui s'emploieroient dans l'agriculture. Mais je pense que cette substance seroit appliquée plus utilement si on la mêlangeoit avec d'autres engrais, avant que de s'en servir (1). Une petite quantité seroit ainsi un

(1) Nous voyons qu'Arthur Young est dans l'usage d'en faire mêler à ses fumiers d'étables. (R)

effet notable ; & l'on pourroit revenir à ces engrais dans le même terrain.

Je ne m'arrête pas à parler ici de divers autres engrais , excellens de leur nature , mais qu'on ne peut se procurer qu'en trop petite quantité pour produire des effets marqués sur une exploitation en grand : tels sont , par exemple , les os , les rognures d'étoffes , la fiente des volailles , &c. Ceux qui sont à portée d'employer profitablement ces articles , ne seront pas assez aveugles pour les négliger (1).

(1) On peut remarquer encore ici l'omission capitale du gypse dans la liste des engrais. Il a incomparablement plus d'effet sur les prés artificiels que celui des engrais salins auquel l'auteur en accorde le plus , savoir la cendre de tourbe. (R)

A N N O N C E S.

REMEDE CONTRE LA GALE DES MOUTONS:

Maniere de guérir la gale des Moutons. Remede communiqué par Sir JOSEPH BANCKS, Bart. Président de la Société Royale, à la Société pour l'encouragement des Arts , des Manufactures & du Commerce.

PRENEZ une livre de vif argent ; demi livre de térébenthine de Venise ; demi pinte d'huile de térébenthine ; quatre livres de graisse de porc ; triturez le tout dans un mortier jusqu'à-ce que le mercure soit

(132) AGRICULTURE, &c.

tout-à-fait incorporé avec les autres ingrédients. Il conviendra, peut-être pour cette préparation, de prendre l'avis de quelque Pharmacien, ou de se faire aider par quelque personne accoutumée aux manipulations de ce genre (1).

On se sert de cet onguent de la manière suivante. On trace un sillon sur le dos de la brebis, de la tête à la queue, en séparant la laine de part, & d'autre, jusqu'à ce qu'on découvre la peau. On passe dans le fond de ce sillon le doigt légèrement enduit de l'onguent, ce qui laisse une tache bleue sur la peau & la laine contigue. On fait partir de ce sillon d'autres sillons qui descendent par les épaules & les cuisses jusqu'aux endroits où la laine se termine ; & si l'animal est fort infecté, on trace deux sillons latéraux parallèles au premier, & un qui descend de part & d'autre par le milieu de la longueur de l'animal.

Immédiatement après l'avoir ainsi préparé on laisse d'ordinaire retourner l'animal dans le troupeau sans crainte que son mal se communique. On n'a presque pas vu d'exemple de brebis qui ait souffert de l'application de ce topique ; les pustules se dessèchent en peu de jours, la démangeaison cesse & l'animal est complètement guéri. On trouve en général plus convenable de ne pas différer l'opération au-delà de la St.-Michel.

Cette application a l'avantage de détruire l'insecte appelé dans le Lincoln-Shire *sheep-fagg* (*hippobosca ovina*) animal très-connu des bergers, qui se loge dans la laine & nuit doublement aux moutons par la démangeaison qu'occasionne sa morsure & par le sang qu'il suce. La laine ne souffre point d'ailleurs de l'effet de l'onguent ; les acheteurs prennent avec quelque préférence celle qui porte les traces de l'onguent, par l'opinion où ils sont que son usage a préservé l'animal du tourment de la gale ou des insectes, & que la laine en est moins sujete aux défauts ou nœuds ; inconvenient qui est le résultat ordinaire d'une suspension soudaine dans le bien-être de l'animal, soit par le défaut de nourriture ou par la maladie.

(1) Quoiqu'il ne paroisse pas y avoir de différence entre cet onguent & l'*unguentum caruleum* (l'onguent gris) des boutiques, j'ai préféré donner la recette exactement telle que je l'ai reçue.

Observation au niveau 2 Sol.		Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.			OBSERVATIONS Diverses.
h.	C. du S.	L. du S.	2 h.	C. du S.	
Dou	Li. Dou	D. dix.	D. dix.	D. dix	
NH					La constance du beau temps a permis d'avancer beaucoup les travaux des vignes & des hautains; on a commencé dès le 10 à rompre celles-là, mais l'extrême sécheresse de la rame a empêché de tendre ces derniers aussi tôt qu'on l'auroit fait sans cela. Depuis les premiers jours du mois on a semé les treffes sur les blés & la bourre pour les orges. Les blés se sont soutenus assez verds dans les terres légères, mais ils sont violâtres dans les terres fortes. Les abricotiers ont fleuri dès le 15.
NH-3	0. 4	+1. 5	+2. 3	+ 2. 5	
NH-3	0. 4	1. 0	2. 3	2. 7	
SO-2	0. 3	1. 3	2. 5	3. 3	
SO-1	0. 2	1. 7	2. 7	3. 0	
id—	—	2. 3	3. 0	3. 3	
N-1	0. 2	2. 7	3. 5	4. 0	
N-1	0. 2	3. 7	4. 7	5. 3	
N-1	0. 2	3. 3	4. 0	4. 5	
N-1	0. 2	2. 5	3. 5	4. 0	
N-1	0. 2	3. 5	3. 5	3. 5	
N-1	0. 2	2. 5	3. 7	4. 0	
N-1	0. 2	3. 0	3. 5	3. 7	
N-1	0. 2	3. 0	3. 5	4. 0	
N-0	0. 1	3. 0	3. 3	3. 5	
N-1	0. 2	2. 5	3. 3	3. 5	
N-2	0. 3	2. 7	3. 5	4. 3	
N-2	0. 3	3. 5	3. 7	4. 0	
N-1	0. 2	2. 7	3. 5	4. 0	
N-1	0. 2	2. 5	3. 5	4. 3	
N-2	0. 3	2. 5	3. 5	3. 7	
N-2	0. 3	1. 5	1. 7	2. 0	
N-2	0. 3	1. 0	2. 0	2. 5	
SC-2	0. 3	1. 0	2. 7	3. 7	
SC-3	0. 4	2. 0	4. 3	5. 3	
SC-3	0. 4	4. 0	6. 3	7. 0	
SC-2	0. 3	6. 7	8. 0	8. 5	
SC-3	0. 4	7. 0	8. 5	9. 3	
SC-2	0. 3	7. 5	8. 7	9. 3	
SC-2	0. 3	7. 5	8. 5	9. 0	
SC-1	0. 2	7. 0	7. 3	7. 3	
—	0. 3	6. 3	7. 5	7. 7	
al. Moy.		+3,39	+4,27	+ 4,73	
		6,8			

(132

ONS ATMOSPHERIQUES.

Ombre de terre à 30 part.	Hygromètre. à cheveu.				Elec- tromè- tre.	Pluye ou neige en 24 heu.	Gelée blanche ou Roée.	L
	C. du S. D. dix.	L. du S. Deg.	2 h. Deg.	C. du S. Deg.				
à la								
jusq								
fond								
guer	5 + 3. 0	83	60	62	$\frac{3}{4}$	—	G. B	NI
la l	0 4. 5	93	53	62	$\frac{3}{4}$	—	G. B	NI
fillo	0 5. 3	95	57	56	I	—	G. B	NI
jusq	0 2. 5	97	76	78	$\frac{1}{2}$	—	G. B	SO
mal	5 3. 3	98	75	83	—	neig. 3 l.	—	SC
par	5 5. 7	93	70	68	$\frac{1}{2}$	—	—	Ca
d'a	7 0 5. 7	81	53	63	$\frac{1}{2}$	—	R.	N
l	0 4. 0	89	64	69	—	—	G. B	N
d'o	0 4. 5	91	65	71	$\frac{1}{2}$	—	G. B	N
cre	5 2. 0	80	76	78	—	—	—	N
pa	0 4. 3	90	61	68	$\frac{1}{2}$	—	—	N
tie	0 3. 5	83	71	75	$\frac{1}{2}$	—	—	N
jo	0 3. 5	84	67	76	$\frac{1}{2}$	—	—	N
m	0 3. 3	82	73	75	—	—	—	N
de	0 5. 5	82	58	62	$\frac{3}{4}$	—	—	N
ap	0 6. 0	72	47	50	$\frac{3}{4}$	—	—	N
o	3 3. 0	75	64	65	—	—	—	N
la	7 4. 0	68	55	55	$\frac{3}{4}$	—	—	N
9	0 4. 7	76	60	64	I	—	—	N
9	0 2. 0	66	55	60	$\frac{1}{2}$	—	—	N
1	9 3 1. 7	65	39	34	$\frac{1}{2}$	—	—	N
1	9 7 4. 3	59	38	44	$\frac{1}{2}$	—	—	N
1	2 3 7. 0	74	32	35	I	—	G. B	N
1	2 3 6. 7	72	38	55	I	—	—	N
1	2 3 9. 7	67	45	55	I	—	—	N
1	2 0 9. 5	82	50	52	$\frac{1}{2}$	—	—	N
1	2 5 11. 0	89	50	49	$\frac{1}{2}$	—	R.	N
1	2 7 9. 0	74	48	56	—	—	—	N
1	2 0 8. 5	82	60	66	$\frac{1}{2}$	—	—	N
1	2 5 5. 5	92	69	78	—	—	R.	N
1	2 0 6. 5	94	44	54	$\frac{1}{4}$	—	—	N
le 6,97	+ 5,15	+ 81,55	57,19	61,87	—	neig. pl. 3 l. o. 4	—	N

• E B S

Lev. du Sol. 2 heures Cou. du St

Déclinaison de l'aigu

	Gakée blanche ou Rôtée.	L. S.
	G.B NE	
	G.B NE	
	G.B NE	
	G.B SO	
I.	SO	
	calme	
	R. NE	
	G.B NE	
	G.B NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	NE	
	E	
	SO	
	SO	
	SO	
	R. SO	
	SO	
	SO	
	SO	
	R. SO	
	SO	
	SO	
	SO	
	SO	
4		

AGRICULTURE.

De la quantité de Semence la plus convenable pour les différentes graines. (Tiré de l'ouvrage d'ARTHUR YOUNG , intitulé : SIX MONTH'S TOUR. Lettre XXX.) ,

PENDANT tout mon voyage , j'ai fait une grande attention à la proportion de la semence avec les produits des différentes graines ; parce que cet objet est important , non-seulement sous le rapport des récoltes , mais encore sous le point de vue politique de la consommation des grains. Je vais vous donner la table des quantités comparatives de froment , de seigle , d'orge , d'avoine , de pois & de fèves , que l'on emploie en semence , dans les différens endroits où j'ai fait mes observations. Je prendrai des moyennes entre les nombres de ces tables ; & j'y joindrai quelques idées sur les résultats qui me frappent. — J'appellerai *pois* le mélange des pois avec les fèves.

Ici l'auteur donne (avec la méthode & le détail dont nous avons déjà vu des exemples dans les extraits du même ouvrage) ses observations dans 77 endroits différens , sur les graines ci-dessus ; avec les quantités semées &

Agriculture, Vol. 2, N°. 4, Avril 1797. K

(134) AGRICULTURE

recueillies. Voici les moyennes des quantités de semence employées par acre.

Blé 2 bushels 1 peck	Avoine 4 bushels 1 peck.
Seigle 2 bushels 1 peck	Pois 3 bushels
Orge 3 bushels 1 peck	Fèves 3 bushels 3 pecks

Telles sont (c'est l'auteur qui parle) les quantités moyennes de semence employées dans cette grande étendue de pays. Je suis un peu surpris que ces moyennes ne soient pas plus élevées : je m'étois formé l'idée d'une quantité plus considérable. Il sera fort utile de voir quelle est la quantité la plus profitable ; & je remarquerai que le résultat , sans être absolument décisif, fera une autorité de grand poids. La manière de cultiver , la qualité & la valeur du sol , sont beaucoup sans doute ; & quelquefois ces circonstances causent des variations plus fortes que les quantités de semence employées ; mais le tableau général que je présente comprend toutes les circonstances sans distinction : les chances de variétés de terrains de cultures , d'engrais sont également pour & contre , & n'affectent pas plus , ni moins , les semences claires que les semences épaisses.

La quantité de semence à répandre dans les terres est un des points les plus importants , & les plus douteux de l'agriculture. Les récoltes doivent en dépendre tellement , qu'il est impossible que les moyennes des produits ne suivent pas dans un certain rapport les moyennes

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (135)
des quantités semées. Je commencerai par le blé;
mais je négligerai les noms des lieux; parce qu'au
moyen des numéros le lecteur peut les retrouver
en jetant les yeux sur le premier tableau.

B L É.

*Depuis la plus petite quantité jusqu'à deux bushels
inclusivement, par acre.*

Semence. Produit.	Semence. Produit.
N°. 4 — 2 — 15 bush.	N°. 41 — 2 — 20 bush.
5 — 2 — 20	44 — 2 — 21
6 — 2 — 24	45 — 2 — 32
7 — 2 — 25	48 — 2 — 15
8 — 2 — 15	51 — 2 — 25
9 — 2 — 22	52 — 2 — 33
10 — 2 — 15	53 — 2 — 16
11 — 2 — 24	55 — 2 — 20
14 — 2 — 27	57 — 2 — 10
20 — 2 — 22	59 — 2 — 18
23 — 2 — 17	64 — 2 — 24
24 — 2 — 21	66 — 2 — 20
26 — 2 — 32	67 — 2 — 13
27 — 2 — 24	70 — 1½ — 27
32 — 2 — 24	71 — 2 — 30
34 — 2 — 20	73 — 2 — 25
38 — 2 — 25	75 — 2 — 28
39 — 2 — 20	76 — 2 — 28
40 — 1 — 20	

Le produit moyen est 22 bushels par acre.

Deux bushels & demi de semence par acre.

Produit.	Produit.	Produit.
N°. 1 — 25 bush.	N°. 30 — 18 bush.	N°. 47 — 20 bush.
2 — 23	31 — 27	49 — 22
3 — 15	35 — 28	54 — 14
12 — 20	37 — 16	65 — 37
19 — 20	42 — 25	74 — 24
22 — 30	43 — 16	77 — 20
29 — 32	46 — 20	

Le produit moyen est de 23 bushels & 2 pecks.

K 2

Trois bushels de semence par acre.

Produit.	Produit.	Produit.
N°. 17 — 16 bush.	N°. 28 — 24 bush.	N°. 60 — 24 bush.
18 — 20	36 — 24	61 — 30
21 — 19	56 — 21	62 — 20
25 — 24	58 — 24	69 — 35

Le produit moyen est 23 bushels & 1 peck.

Comme il n'y a que deux endroits, sur les soixante-dix-sept, où la quantité de semence excède trois bushels, on ne peut indiquer une moyenne; mais il est remarquable que dans l'un de ces deux endroits le produit excède de trois bushels, par acre, la moyenne des lieux où l'on répand trois bushels de semence.

Le produit de 3 bushels par acre est donc 23. 1.

de $2\frac{1}{2}$ 22. 2.

de 2 22.

La différence entre ces nombres est peu considérable, mais elle suffit pour faire conjecturer que les auteurs qui se récrient sur l'abus de semer trop épais, & sur le dommage qui en résulte, exagèrent les choses. Ils affirment que le cultivateur y perd infiniment : il est vrai que les quantités de deux bushels, & de deux bushels & demi par acre, donnent des résultats parfaitement égaux; il n'y a donc point de *perte* à semer deux bushels & demi, quantité qui, à en croire certains auteurs, est trop considérable; & enfin la balance entre deux & demi & trois bushels est d'un peck en faveur de la dernière quantité, ce qui est contraire à

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (137)
 leurs idées. Je ne prétends pas néanmoins qu'on
 puisse conclure définitivement de ces données.
 Je dis seulement que c'est une présomption,
 & que la question doit être décidée d'une ma-
 nière expérimentale, non par des assertions ha-
 sardées qui ne prouvent rien.

S E I G L E.

D'un à deux bushels inclusivement par acre.

Produit.	Produit.	Produit
N°. 17 — 16	N°. 41 — 25	N°. 55 — 20
22 — 25	43 — 40	58 — 30
23 — 20	44 — 27	59 — 20
35 — 28	49 — 45	64 — 24
37 — 28	53 — 30	67 — 13
39 — 28	54 — 20	73 — 30

Le produit moyen est de 26 bushels.

Deux bushels & demi.

Produit.	Produit.
N°. 25 — 24	N°. 51 — 40
31 — 24	61 — 35
42 — 40	75 — 20
46 — 20	

Le produit moyen est de 29 bushels.

Trois bushels.

Produit.	Produit.
N°. 27 — 24	N°. 62 — 20
36 — 20	68 — 32

Le produit moyen est de 24 bushels.

Dans un seul endroit $4\frac{1}{2}$ bushels en produi-
 sent 18.

(138) AGRICULTURE.

Il seroit en effet étonnant qu'une si grande quantité produisît une belle récolte.

Le produit de 2 bushels par acre est donc 26.

de 2 $\frac{1}{2}$ 29.

de 3 24.

Je n'aurois pas cru, que, pour un grain si menu, deux bushels & demi eussent mieux valu que deux bushels. Il est vrai qu'il y a dans le nombre quelques endroits où l'on ne sème pas même 2 bushels, ce qui peut contribuer à donner de l'infériorité à la moyenne des deux bushels; mais la différence dans les produits est si forte qu'il est extrêmement probable que deux & demi sont une quantité de semence plus convenable que deux. Trois bushels sont évidemment trop.

O R G E.

Depuis un à deux bushels inclusivement.

Produit.		Produit.	
N°. 5	— 24	N°. 41	— 32
34	— 32	50	— 40
35	— 40	52	— 45
38	— 40	54	— 29
40	— 32	55	— 40

Le produit moyen est de 4 quaters (1), 2 bushels & 2 pecks.

(1) Nous renvoyons le lecteur, pour toutes les mesures, à la table annexée au premier volume d'agriculture. (R)

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (139)

Deux bushels & 2 demi.

Produit.		Produit.	
N°. 37	— 24	N°. 51	— 35
44	— 32	53	— 30
47	— 28	64	— 25
48	— 20	70	— 20
49	— 32	76	— 32

Le produit moyen est de 3 quarts 3 bushels & 3 pecks.

Trois bushels.

Produit.		Produit.	
N°. 4	— 23	N°. 43	— 25
16	— 36	46	— 20
17	— 28	57	— 24
22	— 35	59	— 24
23	— 15	61	— 32
25	— 24	62	— 20
26	— 40	67	— 20
31	— 40	68	— 30
32	— 28	69	— 30
33	— 9	72	— 40
42	— 45		

Le produit moyen est de 3 quarts 4 bushels.

Trois bushels & 2 demi.

Produit.		Produit.	
N°. 19	— 32	No. 73	— 40
24	— 38	74	— 25
58	— 28	75	— 35

Le produit moyen est de 4 quarts 1 bushel.

Quatre bushels.

Produit.	Produit.	Produit	Produit.
No. 1 — 32	No. 10 — 24	No. 20 — 28	No. 30 — 32
2 — 36	11 — 32	21 — 32	36 — 28
3 — 24	12 — 32	27 — 32	56 — 40
6 — 24	14 — 27	28 — 36	71 — 33
8 — 28	15 — 32	29 — 40	77 — 24
9 — 24	18 — 32		

Le produit moyen est de 3 quarts, 6 bushels, 2 pecks.

K 4

Quatre bushels & demi, & au-dessus.

Produit

N ^o .	7	—	40
	13	—	16
	50	—	36

Le produit moyen est de 3 quarts, 6 bushels, 1 peck.

Les produits sont donc comme suit :

2 bushels	rendent	34 bushels	2 pecks.
3½	.	32	1
4	.	30	2
4½	.	30	1
3	.	28	.
2½	.	27	3

Cette proportion est si singulière qu'on ne fait guères qu'en penser. La plus petite quantité donne le plus grand produit. Il semble qu'à mesure qu'on augmente la quantité de semence le produit doit diminuer ; & cependant nous voyons que 2 ½ bushels donnent le moins : 4 bush. donnent davantage. De 2 ½ à 3 & de 3 à 4, il y a une augmentation graduelle, mais une diminution à 4 ½ & la chaîne est rompue à 2 ½ à 3 ½. — Il est inutile de raisonner sur de tels faits, qui ne sont point susceptibles d'être expliqués. Je dois ajouter cependant que la quantité de deux bushels par acre est adoptée par d'excellens cultivateurs ; & nommément par Mr. *Scroop* & Lord *Darlington*, dont les champs sont en très-bon état ; c'est d'ailleurs la quantité usitée dans d'autres terres riches. Le tallement, qui est plus considérable dans de tels terrains,

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (141)

donne probablement l'avantage à cette petite quantité dans la table ci-dessus. La quantité de 4 $\frac{1}{2}$ bushels a le désavantage de renfermer la pratique de *Stamford* & de *Grimsthorpe*, où l'agriculture est plus misérable qu'à aucun autre endroit que j'aie visité dans ma tournée ; mais le résultat des calculs est trop étrange, pour n'être pas déterminé par quelque circonstance inconnue.

A V O I N E.

Au-dessous de trois bushels.

Produit.		Produit.	
N°. 4	— 28	N°. 44	— 30
13	— 16	76	— 52
35	— 40		

Le produit moyen est de 4 quarts 1 bushel.

De trois à quatre bushels.

Produit.		Produit.		Produit.		Produit.	
N°. 1	— 32	N°. 17	— 24	N°. 31	— 36	N°. 48	— 24
2	— 36	18	— 32	32	— 16	49	— 35
3	— 12	20	— 40	33	— 12	50	— 50
5	— 32	22	— 55	34	— 24	51	— 40
6	— 24	23	— 32	37	— 30	64	— 28
8	— 18	24	— 36	38	— 40	67	— 24
9	— 24	26	— 40	39	— 40	70	— 20
10	— 16	27	— 40	41	— 40	73	— 45
12	— 40	28	— 48	45	— 56	75	— 36
15	— 32	29	— 32	47	— 30	77	— 32

Le produit moyen est de 4 quarts.

Quatre bushels & demi.

Produit.		Produit.	
N°. 21	— 40	N°. 52	— 45
36	— 32	53	— 30
40	— 45	71	— 45
46	— 24		

Le produit moyen est de 4 quart. 5 bus. 1 peck.

(142) AGRICULTURE

Cinq bushels.

Produit.		Produit.	
N°.	7 — 36	N°.	42 — 45
	16 — 40		43 — 33
	19 — 32		54 — 30
	25 — 32		72 — 45
	30 — 40		74 — 32

Le produit moyen est de 4 quaters 4 bushels 2 pecks.

Six bushels.

Produit.		Produit.	
N°.	55 — 40	N°.	59 — 50
	56 — 48		61 — 90
	57 — 30		68 — 40
	58 — 40		

Le produit moyen est de 6 quaters 1 peck.

Sept bushels.

Produit.		Produit.	
N°.	60 — 50	N°.	65 — 50
	62 — 50		69 — 45

Le produit moyen est de 6 quaters, 3 pecks.

Il n'y a qu'un numéro à sept & demi bushels, on ne peut pas le faire entrer en ligne de compte.

Les produits sont donc comme suit :

7 bushels	rendent	48 bushels	3 pecks.
6	.	48	.
4 $\frac{1}{2}$	.	37	.
5	.	36	.
3	.	32	.
4	.	32	.

Une autre maniere de présenter les produits

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (143)
 moyens pourra paroître plus claire & plus instructive.

6 & 7 bushels rendent 48 bushels 2 pecks.

4 $\frac{1}{2}$ & 5		36		3
3 & 4		32		2

Cette gradation démontre clairement certaines choses, & en laisse d'autres douteuses. Parmi celles-ci il faut compter les distinctions entre six & sept, quatre & demi & cinq, trois & quatre. Les différences entre ces quantités, quant au produit, sont si petites, que si l'on déduit la semence on ne saura lesquelles préférer. Il paroît aussi que les différences entre les quantités au-dessous de cinq sont si petites, qu'en déduisant la semence elles reviennent à-peu-près au même dans le résultat. Mais la supériorité des quantités six & sept est si grande qu'il est extrêmement probable qu'il y a ici un avantage marqué. Du moins s'il n'en est pas ainsi, il faut l'attribuer à des circonstances qui n'ont aucun rapport aux recherches actuelles.

Six & sept bushels par acre sont une quantité si considérable, si on la compare aux opinions reçues, & à toutes les recommandations des auteurs, que beaucoup de gens seroient tentés de décider à l'avance que la récolte ne peut être que mauvaise, avec une telle quantité de semence. Mais ici les faits parlent si haut qu'il en faut au moins inférer que les idées modernes sur le grand avantage de semer clair ne doivent pas être adoptées sans modi-

(144) AGRICULTURE.

fications. Il faudroit répéter des expériences dans toutes sortes de terrains & de situations, & sur des portions peu considérables de terre (afin que le sol fût exactement semblable) dans le but de déterminer le point important. Mais jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de décisif sur cet article, il faut nous contenter des autorités que la pratique commune nous fournit.

P O I S.

Au-dessous de deux bushels.

Produit.		Produit.	
N°. 23	10	N°. 54	14
36	16	59	10
41	16	64	16
43	17	67	7
47	30		

Le produit moyen est de 1 quarter 7 bushels

Deux bushels & demi.

Produit.		Produit.	
N°. 2	17	N°. 37	16
9	20	46	24
30	20	51	
35	15		

Le produit moyen est de 2 quaters, 4 bushels, 1 peck.

Trois bushels.

Produit.		Produit.	
N°. 4	32	N°. 42	16
12	20	44	20
16	24	48	12
17	14	55	20
19	20	62	15
20	15	68	30
21	14	74	20
32	24	77	24

Le produit moyen est de 2 quaters 4 bushels.

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (145)

Trois bushels & demi.

Produit.		Produit.	
N ^o . 13	16	N ^o . 31	24
15	24	58	20
24	16	75	30
29	32		

Le produit moyen est de 2 quaters 7 bushels,

Quatre bushels.

Produit.		Produit.	
N ^o . 1	20	N ^o . 22	17
3	17	45	32
5	24	49	32
6	20	56	25
7	20	57	15
10	12	73	30

Le produit moyen est de 2 quaters 6 bushels:

Quatre & demi à cinq bushels.

Produit.	
N ^o . 38	30
61	15

Le produit moyen est de 2 quaters 6 bushels 2 pecks. Les produits sont donc comme suit:

3 $\frac{1}{2}$ bushels	rendent	23 bush.	.
4 $\frac{1}{2}$ & 5	.	22	2 pecks.
4	.	22	.
2 $\frac{1}{2}$	.	20	1 peck
3	.	20	.
2	.	15	.

On peut tirer deux moyennes seulement, de la manière suivante :

de 3 $\frac{1}{2}$ à 5 bush.	rendent	22 bush.	2 pecks.
de 2 à 3	:	18	1

Il y plusieurs disproportions dans la première de ces tables. On ne fait comment établir la gradation des produits en passant d'une moindre à une plus grande quantité de semence, ou inversement. Trois l'emportent sur deux; mais deux & demi rendent plus que trois. Quatre l'emportent sur trois; quatre & demi & cinq l'emportent sur quatre; mais trois & demi ont l'avantage sur tout le reste. Il y a des contradictions apparentes; cependant il y a des points de comparaison qui sont utiles. Ainsi, par exemple, trois & demi se trouvent fort supérieurs à deux & à trois; quatre & demi & cinq l'emportent même de beaucoup sur deux. Il faut conclure que trois & demi sont la quantité la plus profitable. La seconde table prouve aussi avec évidence qu'il est avantageux de semer épais.

Je ne suis point surpris de cela; car si les pois ne sont pas sarclés (& c'est le cas dans les neuf dixièmes du Royaume) il faut semer assez épais pour étouffer les mauvaises herbes. Or cela ne peut arriver que lorsque les plantes se réunissent, & que les vrilles s'entrelacent dans les branches des plantes voisines. L'ombre alors tue l'herbe. Mais si les pois sont semés clair, les mauvaises plantes ont le temps de prendre beaucoup de vigueur avant d'être affectées par la récolte. Et quant à la richesse du sol, ou à l'avantage de la vigueur d'une plante

QUANTITÉ DE SEMENCE LA PLUS CONV. (147)
 isolée contre d'autres qui se touchent, le raisonnement peut s'appliquer à la mauvaise plante, tout comme à la récolte : la fertilité du sol fait prospérer l'une tout comme l'autre.

F È V E S.

Deux, & deux bushels & demi.

Produit.		Produit.	
No.		No.	
2	20	67	23
4	25	70	30
9	24	76	40
30	32		

Le produit moyen est de 3 quarts 3 bushels 2 pecks.

Trois, & trois bushels & demi.

Produit.		Produit.	
No.		No.	
19	30	28	23
20	18	29	40
23	24	50	31
24	30	54	28
26	32	57	18
27	20	71	40

Le produit moyen est de 3 quarts 3 bushels 3 pecks.

Quatre, & quatre bushels & demi.

Produit.		Produit.		Produit.	
No.		No.		No.	
10	15	22	17	44	30
11	24	31	18	45	30
14	20	32	28	46	24
15	24	35	24	49	22
16	20	36	16	68	36
18	18	41	20	69	30
21	26				

Le produit moyen est de 2 quarts 7 bushels, 1 peck.

(148)

AGRICULTURE

Cinq, cinq & demi, & six bushels.

		Produit.			Produit.
N ^o .	7	20	N ^o .	55	45
	25	22		56	60
	37	24		61	40
	42	25			

Le produit moyen est de 4 quarters 1 bushel, 2 pecks.

Les produits sont donc comme suit :

5 & 6 bush. rendent 33 bush. 2 pecks.

3 & $3\frac{1}{2}$ " " 27 " 3

2 & $2\frac{1}{2}$ " " 27 " 2

Il y a ici une progression régulière ; mais si l'on déduit la semence, les résultats sont assez égaux depuis deux à trois & demi. De cinq à six ils ont beaucoup d'avantage ; ce qui me paroît fort extraordinaire, car il n'y a pas la même raison de semer épais pour les fèves que pour les pois. J'aurois imaginé, qu'en ajoutant encore deux bushels à la quantité de trois par acre, on auroit nui à la récolte, bien loin de l'augmenter.

Les quantités de semence les plus profitables paroissent, d'après les observations ci-dessus, devoir être les suivantes.

Blé	3 bushels par acre.
Seigle	$2\frac{1}{2}$
Orge	2
Avoine	6
Pois	$3\frac{1}{2}$
Fèves	$5\frac{1}{2}$

De tous les nombres de cette table, aucun ne m'étonne d'avantage que celui de deux bushels.

DU COMTÉ DE WILTS. (149)

shels d'orge, comme la quantité la plus avantageuse (1); mais les explications que j'ai données peuvent servir à faire comprendre la chose. La quantité de semence des fèves m'étonne aussi beaucoup. Quant aux autres graines, il n'y a rien qui ne soit assez d'accord avec l'expérience des meilleurs fermiers du Royaume. »

EXTRAIT d'un Mémoire intitulé, *GENERAL VIEW OF THE AGRICULTURE, &c.* Coup-d'œil général sur l'Agriculture du Comté de Wilts; & observations sur les moyens de la perfectionner, par THOMAS DAVIS de LONGLEAT.

LE Comté de Wilts a une forme à-peu-près ovale, & son grand diamètre est presque Nord & Sud. Le Comté a environ 54 milles de long, & 34 de largeur moyenne, c'est-à-dire qu'il contient environ 1372 milles carrés ou 878,000 acres.

Il y a une différence extrêmement marquée entre la borne Sud-Est, & la borne Nord-Ouest de cette Province. La première est cou-

(1) Voyez sur cet article le résultat de l'expérience d'un cultivateur-pratique p. 81 du 2^d. vol. d'Agriculture. (R)

Agriculture. Vol. 2. N^o. 4. Avril 1797.

(150) A G R I C U L T U R E

pée par des collines de craie qui viennent du Berkshire, du Hampshire, & du Dorsetshire, & qui se terminent en une ligne d'escarpemens du Nord-Est au Sud-Ouest. La borne du Comté au Nord-Ouest est formée par une succession de riches vallées qui s'élèvent peu-à-peu & joignent ensuite les montagnes du Gloucestershire.

Sous les rapports de l'agriculture, il convient de diviser le Comté en *South-Wiltshire* & *North-Wiltshire*. La première partie, ou celle du Sud, comprend les collines craieuses communément appelées *Downs*, & destinées aux grains & aux moutons. La partie du Nord est remarquable par ses gras pâturages sur les bords de l'Avon & de la Tamise, où l'on engraisse beaucoup de bestiaux, & où l'on fait un des fromages les plus estimés de l'Angleterre.

Les champs communs font une très-grande portion de la partie arable de cette province. Voici comment les habitans d'une paroisse s'entendent, en général, pour leur exploitation.

Les pâturages secs pour les moutons (*Sheep Downs*) sont ouverts aux troupeaux de la commune pendant tout l'été & l'automne. Les chaumes de l'année précédente & les jachères sont également ouvertes jusqu'à-ce que tout soit labouré pour semer les blés. Alors les moutons sont bornés aux *downs* ou bruyères, jusqu'à-ce que la moisson soit faite. Ils ont ensuite les chau-

DU COMTÉ DE WILTS. (151)

mères & les *downs* jusqu'à ce que la saison oblige de les mettre au foin. Chaque propriétaire fournit alors les claies & le foin, à proportion du nombre de moutons qu'il a, & le berger commun donne ses soins au troupeau. Lorsque les brebis sont prêtes à mettre bas, les propriétaires les renferment dans des prés clos ; & lorsque tous les agneaux sont faits, les prés arrosés fournissent de l'herbe fraîche aux brebis.

Pendant que les brebis pâturent dans les prés arrosés, on les parque sur les terres destinées à l'orge. Lorsque les orges sont semées, les *ray-grass* ou les *jachères* reçoivent les troupeaux jusqu'à la tonte. On donne le bélier aux brebis à la mi-septembre. Les frais des béliers se font en commun, ainsi que ceux du berger.

Dans cet état de communage & de culture, il y a nécessairement disette de fourrage d'hiver. En conséquence, il est d'usage de vendre au commencement d'octobre les vieilles brebis & les agneaux mâles, & d'envoyer hiverner les agnelles dans des cantons à turneps, quelquefois même hors de la province. Il en coûte de 5 à 8 shellings par tête, pour six mois de la nourriture de ces jeunes bêtes ; & malgré la réduction des troupeaux par les dispositions ci-dessus, il arrive souvent aux communiars de ces paroisses d'être obligés d'acheter du foin pour passer l'hiver, & de l'aller chercher à 10 ou 15 millés de distance.

Il n'y a peut-être aucune partie du Royaume où l'on entende mieux les arrosemens que cette province. Ce n'est que du commencement de ce siècle qu'on s'est attaché à cette industrie. Les prés dont les arrosemens sont le mieux disposés ont été arrangés sous les directions d'un nommé Raverstock entre 1700 & 1705 ; & maintenant il y a à peine un ruisseau dans le Comté dont on ne tire quelque parti.

Tout l'art des arrosemens consiste en dernière analyse, à mettre & à ôter à propos, dans les prés, une eau dont on dispose à volonté. Mais le temps où l'eau doit rester sur le pré, pour le plus grand effet possible, dépend des terres & des saisons ; ce n'est donc que par le tâtonnement qu'on est parvenu à établir cette suite d'opérations dont dépend l'abondance des foin, & dans laquelle les aqueducs apportent & emmenent les eaux avec autant de régularité que les artères & les veines conduisent le sang dans toutes les parties du corps.

Il y a deux sortes de prairies dans lesquelles on se sert des eaux pour donner de l'activité à la végétation : les prés en pente dans lesquels on fait parvenir les eaux *par irrigation*, & les prés plats qui sont situés dans le voisinage d'une rivière ou d'un ruisseau, & que l'on arrose *par inondation* : ces derniers sont les plus communs dans la province.

Dans les irrigations (*catch-work*) on coupe

DU COMTÉ DE WILTS. (153)

ordinairement une tranchée qui sort du principal cours d'eau dont on veut profiter. On met cette tranchée de niveau ; & en la bouchant à son extrémité on force l'eau à s'échapper sur toute la longueur de la tranchée. Mais dans cette méthode il y a l'inconvénient que l'eau cesse bientôt de verser également partout , & qu'il se fait des petits courans qui s'élargissent & s'approfondissent en rongant la terre. On trouve donc plus convenable de faire sortir du cours d'eau des rigoles parallèles, de vingt pieds en vingt pieds. On bouche ces rigoles à leur extrémité ; l'eau s'extravase , & est reçue par la rigole inférieure après avoir arrosé l'intervalle qui la sépare de la supérieure. Cette opération se répète jusqu'à la partie la plus basse du pré, où l'eau est reçue par un canal pour être employée à un pré situé plus bas.

Lorsqu'on veut donner l'eau au pré , l'on coupe à la beche des gazons que l'on place dans le principal cours , vis-à-vis de l'origine de la rigole supérieure , jusqu'à ce que toute la partie à arroser soit bien couverte d'eau. Lorsque l'on veut ensuite ôter l'eau on déplace les gazons.

La dépense d'établissement & d'entretenir de ces irrigations est comparativement peu considérable , & l'effet en est prodigieux. (1)

(1) L'auteur paroît croire que toutes les eaux , bien ménagées , ont un effet salutaire sur les prés. Cela

La conduite des arrosemens dans les prés bas & plats est beaucoup plus difficile & plus dispendieuse. La premiere chose à considérer dans ces prés là , c'est le moyen de se débarrasser de l'eau après qu'on aura inondé. Or, pour y réussir , on est souvent obligé de disposer le terrain en planches séparées par des fossés profonds. On détourne ensuite un canal de la rivière ou du ruisseau principal , dans une partie assez élevée pour que le niveau de ce canal soit supérieur à la crête des planches , puis on tire l'eau de ce canal par des petites rigoles qui suivent la crête de chaque planche & dans lesquelles on l'arrête à volonté par des obstacles pour la faire refluer des deux côtés. Rassemblée ensuite à l'extrémité des fossés de séparation par un autre canal, elle est employée de la même maniere dans un pré plus bas.

La dépense d'établissement de ces arrosemens à plat est très-considérable , mais l'effet en est étonnant. On calcule qu'il y a , dans la province , de 15 à 20 milles acres de prairies arrosées de cette maniere. — On trouve un si prodigieux bénéfice à cette méthode d'arrosement que tous les terrains bas & plats, situés dans

peut être pour les eaux du Wiltshire ; mais il est très-certain qu'il y a des eaux froides ou crues , qui n'engendrent qu'un foin aigre ou marécageux , lors-même que les irrigations sont faites avec intelligence. La seule ressource pour profiter de ces eaux-là c'est de les réchauffer avec du fumier. (R)

le voisinage des rivières ou des ruisseaux sont convertis en prairies à inondations, à moins qu'il ne se trouve quelque moulin qui s'y oppose.

On a pensé quelquefois que ce genre de prairies pouvoit rendre'un pays malsain; mais l'expérience prouve le contraire; & en effet, dans cette méthode d'arrosement, la putréfaction, qui dans les terrains marécageux répand des miasmes nuisibles, n'a jamais lieu; parce que le fermier a soin d'ôter l'eau dès l'instant où une certaine écume se montre sur le pré, cette écume annonce le commencement de la putréfaction des racines; & si l'on n'ôtoit pas l'eau immédiatement, le pré seroit gâté pour l'année. Le principe même de cette économie des prairies exclut la stagnation des eaux, si nuisible à la salubrité de l'air; d'ailleurs les prés à inondation étoient tous originairement des terrains marécageux & malsains.

On a souvent demandé comment il se faisoit que ces prairies à inondation, dont les fermiers de Wiltshire ne pourroient point se passer, ne parussent pas nécessaires ailleurs. Je réponds à cela qu'il ne s'agit pas de savoir comment on se passe de ces prés dans d'autres pays, mais comment les fermiers de Wiltshire qui ont ces prairies pourroient élever les moutons, ainsi qu'ils le font, s'ils étoient privés de cet avantage. — Or cette économie des moutons est, je crois, la plus profitable pour eux

& pour les propriétaires, qu'il soit possible d'établir. Il suffit, pour être frappé de cet avantage, d'observer le contraste entre les fermiers du pays qui ont des prés à inondation, & ceux qui n'en ont point.

Tous ceux qui tiennent un troupeau de bêtes à laine, pour élever, dans un pays aussi tardif que la province de Wilts, sont souvent très-embarrassés au mois d'avril, dans ce mois qui est entre le foin & l'herbe, s'ils n'ont une prairie à inondation pour y mettre les brebis & les agneaux. Les brebis pleines peuvent fort bien ne manger que du foin. On leur conserve quelques turneps, qui, dans les années favorables, suffisent pour le mois de mars; mais s'il faut ensuite revenir au foin, le lait de la mère diminue, l'agneau dépérit, & l'été le plus favorable ne le remet point. Pour prévenir cet inconvénient, on met les brebis dans les jeunes trefles, dans les prés secs qu'on destine au foin, dans les blés; en un mot, on leur donne du vert à tout prix. Comment estimer la perte qui en résulte pour le fermier?

Il convient d'entrer ici dans quelques détails sur la manière de ménager les eaux dans ces prés bas dont la possession est si précieuse.

Lorsqu'après les regains, le pré a été pâturé aussi ras qu'il est possible; le *noyeur* (the drowner) commence ses opérations en nettoyant le principal cours d'eau, & toutes les tranchées

DU COMTÉ DE WILTS. (157)

ou rigoles qui en dérivent, & en réparant ce que les pied des bêtes ont gâté. Si les eaux sont abondantes, il inonde alors toute la partie préparée, & s'occupe ensuite d'en préparer une autre. Il faut que cet ouvrage soit fait à temps pour profiter, s'il est possible, des premières grandes eaux après la St. Michel (le 10 octobre), parce que c'est l'époque du premier lavage général des champs, des collines crayeuses, & des chemins.

La durée de cette inondation d'automne ne sauroit être déterminée : elle dépend de la situation, & des circonstances ; mais, si l'on dispose de l'eau à volonté, la règle est de donner d'abord une inondation complète de quinze jours, trois semaines, ou un mois, mais avec un intervalle de sécheresse qui varie depuis un jour jusqu'à une semaine. Ensuite on ôte l'eau. On trouve que cette inondation d'automne est de la plus grande importance pour la quantité & la qualité de l'herbe, & surtout pour favoriser la végétation des nouvelles plantes au printemps suivant.

Lorsqu'au mois de mars l'herbe paroît pousser avec vigueur, on ne redonne point d'eau ; mais à l'instant où la végétation semble languir, on inonde pour un jour ou deux ; en ayant toujours pour règle fondamentale *de dessécher le pré autant qu'il est possible entre chaque inondation, & d'ôter l'eau dès qu'il se manifeste de l'écume sur le pré.*

(158) **A G R I C U L T U R E**

Les mêmes prairies qui supportent trois semaines d'inondation en octobre, novembre, ou décembre, n'en supportent pas une semaine en février ou mars, & peut-être pas deux jours en avril ou mai.

Dans les prés à irrigations, l'attention principale à avoir c'est de les tenir aussi secs qu'il est possible dans les intervalles des arrosements. Comme l'eau y est ordinairement rare, & que les inondations ne les affectent pas, on a soin de ménager l'eau de manière à l'employer plusieurs fois de suite, s'il est possible; & on la fait séjourner plus long-temps dans les parties inférieures qui ordinairement n'ont de l'eau qu'en moindre quantité, afin d'en égaliser l'effet.

Le grand objet des prés inondés, pour les fermiers du pays, c'est de leur procurer le moyen d'élever des agneaux. C'est ordinairement au milieu de Mars que les agneaux sont en état de suivre la mère, & qu'on les met dans ces prés, après avoir eu soin de les dessécher pendant quelques jours. On renferme les brebis par des claies, qu'on change d'un jour à l'autre, afin que les bêtes ne foulent pas l'herbe inutilement. On laisse aux claies quelques ouvertures pour les agneaux, qui vont ainsi paître l'herbe fraîche en dehors du parc. Un acre de pré suffit à mille bêtes pour un jour.

On ne laisse point pâturer les brebis à la

DU COMTÉ DE WILTS. (159)

rosée, ni à ventre vide, dans ces prés. Les heures de pâturage sont ordinairement de dix à onze dans la matinée, & le soir de quatre à cinq. Dans les intervalles on met les bêtes au parc sur les terres destinées à l'orge ; & pour bien faire, il faut avoir du pâturage pour les meres & les agneaux jusqu'à ce que les orges soient toutes semées.

Dès que les bêtes à laine ont passé sur la totalité de la partie qu'on leur destinoit, on met l'eau dans le pré. Trois jours suffisent alors ; & de ce moment là on tient le pré sec pour obtenir une coupe de foin. Six semaines sont ordinairement parvenir l'herbe à sa maturité. Il est rare qu'il faille deux mois pour mûrir le foin, & quelquefois cinq semaines produisent une coupe abondante. Comme le foin de ces prairies est naturellement grossier, il importe de ne pas trop tarder à le couper ; mais lorsqu'il est pris à temps, il est d'une qualité nourrissante, & produit beaucoup de lait soit aux brebis soit aux vaches.

Quelquefois l'on demande encore à ces prés une seconde coupe de foin ; mais ce n'est gueres que dans les années où le fourrage est rare ; non que l'on croye nuire à la terre en coupant le regain au lieu de le faire pâturer, mais parce qu'il est rare que cette seconde coupe puisse sécher convenablement & être resserrée à propos. On trouve beaucoup mieux son

compté à la faire pâturer par les vaches à lait. Celles-ci restent dans les prés jusqu'au moment où le noyeur dispose ces terrains à recevoir l'inondation d'automne.

Les prés que nous venons de décrire sont très-salubres pour les brebis au printemps ; mais en automne elles ne sauroient y pâturer sans risquer la pourriture. Ce fait singulier pourroit conduire peut-être à la connoissance des causes de cette maladie. Ce n'est point , au reste , une circonstance défavorable aux fermiers ; elles les conduit à entretenir quelques vaches à lait qui leur sont très-profitables.

En observant combien nous appuyons sur la nécessité de maintenir les prés secs après les avoir inondés , le lecteur doit naturellement conclure qu'il y a beaucoup d'avantage à ce que le sol inférieur absorbe l'eau ; & en effet , cette circonstance influe d'avantage sur le succès du pré que la qualité ou l'épaisseur de la couche végétale supérieure.

Ce n'est pas cependant que des terrains tourbeux , ou qui reposent sur la glaise , ne soient susceptibles d'une très-grande amélioration par cette économie des eaux ; mais les prés de cette nature ont moins de valeur , à cause de la difficulté de les rendre assez fermes pour supporter le piétinement des bestiaux.

Un gravier pur , ou des detritus de cailloux sous la couche végétale , assurent les plus belles

récoltes , lors même que cette couche n'a que six pouces d'épaisseur. C'est dans les prés de cette espece que la végétation est la plus hâtive au printemps. On ne doit pas s'inquiéter de la qualité des plantes qui composent l'herbe du pré ; les plantes qui s'accordent le mieux avec le genre de la terre dominant bientôt tout le reste , lorsqu'on arrose dans les principes indiqués ci-dessus ; & les plantes qui par elles-mêmes sont les moins bonnes , acquièrent une excellente qualité lorsqu'elles ont de l'eau ce qu'il leur en faut.

Je ne prétends pas , en parlant des terres arables , entreprendre de décider une question qui a long-temps divisé les plus habiles agronomes : savoir , si la culture au semoir doit avoir la préférence sur le système commun. Si l'une & l'autre méthode n'avoient pas leur mérite propre , elles n'auroient pas été si bien , ni si long-temps , défendues. Différentes terres , & différentes situations , exigent des moyens différens. Les charrues de Wiltshire (drag-ploughs) ne sont autre chose que des charrues à semer (drill-ploughs) mais dans un état d'imperfection. Si ces charrues assurent depuis long-temps dans les *downs* de cette province de fortes récoltes de blé , pourquoi l'addition d'une boîte à semer , qui détermineroit une profondeur uniforme de la semence , ne seroit-elle pas un perfectionnement ? Quand aux terres

sabloneuses, tout le monde convient que le semoir y réussit, parce que les mauvaises herbes poussent avec une telle abondance dans ces terres que la houe y est indispensable pour les empêcher détouffer la récolte. Ceux qui en doutent peuvent s'en assurer en venant visiter les terres sabloneuses de Wiltshire; mais je leur conseille de se hâter; car si l'on peut obtenir que les champs communs soyent enclos, on ne trouvera peut-être pas, dans sept ou huit ans, un seul fermier qui ne fasse usage du semoir.

Les terres argileuses fournissent de fortes objections contre le semoir, du moins pour le blé. Il est très-vrai aussi que ces terres n'ont pas besoin de la houe, parce qu'elles ne produisent pas d'herbe. Les mottes de terre qui restent aux semailles, & qui se fondent pendant l'hiver ou au printemps, garnissent la plante, & font l'effet d'une culture pour la production favorite de ces terres, qui est le blé.

Il est difficile que l'expérience décide jamais complètement la grande question du semoir. L'influence de la température d'une saison sur une expérience établit des préjugés qu'on ne peut vaincre. Ce qui est bon une année, & plusieurs années de suite, peut être mauvais dans une autre. Le fermier qui a beaucoup souffert en suivant un bon système dans une mauvaise année, en est dégoûté pour long-temps;

Surtout s'il s'étoit écarté de la routine du canton , parce qu'alors , non-seulement il éprouve une perte , mais il ne manque jamais d'être moqué par ses voisins , & par ses propres domestiques. C'est-là un très grand obstacle à ce que l'agriculture puisse jamais se réduire à un système invariable.

Dans les terres légères , où les labours ne servent gueres qu'à détruire les mauvaises herbes , l'instrument de Mr. Cook , nommé le *scuffler* , qui nettoye cinq à six acres par jour , est fort estimé ; mais cet instrument n'est point assez généralement connu.

Les fermiers de Wiltshire ont très - grand soin de ne pas labourer plus bas que la couche végétale. Lorsqu'il arrive que l'on ramene dessus soit la craye soit les cailloux , la qualité du terrain est souvent altérée pour plus de vingt-ans : c'est un véritable poison pour la terre. Les cultivateurs ne permettent pas que l'on ôte les pierres dans leurs champs , de peur de diminuer la couche sur laquelle la charrue travaille. Dans le voisinage de Lavington , où les terres sont sablonneuses , on laboure très - profond , & souvent on fait passer une seconde charrue dans le même sillon pour ramener à la surface une terre neuve , & mettre dessous celle que l'on suppose épuisée (1).

(1) Quand on se rappelle , qu'en Norfolk , une couche de cinq pouces d'épaisseur d'une terre sablonneuse suffit à produire chaque année une belle récolte , sans qu'on

On ne laboure gueres avec les bœufs dans cette province. Depuis qu'il y a moins de pâturages communs pour les vaches , l'usage des bœufs pour la charrue est devenu plus rare. Il est probable que la division des communes diminuera encore le nombre des attelages de bœufs , surtout dans les parties montueuses du Comté. Ce n'est pas cependant qu'on ne reconnoisse en Wiltshire la supériorité des argumens en faveur de la culture des bœufs ; mais il y a des motifs de localités qui s'opposent à son adoption. Le principal est la rareté des pâturages clos , & la difficulté d'en avoir beaucoup de tels. Une autre circonstance s'oppose à l'usage des bœufs , c'est la distance des marchés où l'on ne parvient que par des routes pierreuses , au travers d'un pays inégal. Tous les fermiers qui menent du blé au marché sont obligés de tenir au moins six chevaux. Ils mettent un grand amour-propre , ainsi que leurs gens , à avoir de beaux attelages , & il renonceroient difficilement à cette petite gloire , pour revenir à l'usage plus modeste des bœufs. Cependant , il y a encore des fermiers qui ont le bon sens de tenir à ceux-ci , & qui s'en applaudissent , surtout depuis qu'ils ont échangé le joug contre le collier. Ils trouvent aux bœufs cet avantage particulier

puisse observer aucune diminution dans la force végétative , on est disposé à croire que la supposition de l'épuisement est bien fautive. (R)

particulier de pouvoir être achetés & vendus plus promptement & plus facilement lorsqu'il faut augmenter ou réduire la force des attelages selon la saison. Je suis convaincu que le piétinement des bœufs dans les pâturages des moutons augmente beaucoup plus l'herbe à l'usage de ceux-ci, que les bœufs ne la diminuent par la consommation qu'ils en font. J'ai vu un très-grand nombre d'exemples de pâturages fecs, destinés aux moutons, qui perdoient sensiblement de leur qualité parce qu'on en avoit ôté les vaches qui auparavant y païssoient d'habitude.

Le plus grand nombre des paroisses de la province conserve l'usage des champs communs, malgré les propositions & les démarches répétées pour obtenir les clôtures. Les désavantages principaux de cette disposition des champs sont la nécessité de suivre la même agriculture sur toutes les terres; la difficulté de perfectionner la race des brebis avec un troupeau commun; & la perte de temps & de travail qui résulte de la dispersion des pièces. Il faut convenir, néanmoins, que les petits fermiers pourroient perdre à la division & à la clôture des terres; & la principale raison de cette différence entre leur intérêt & celui des gros fermiers, sur ce point, c'est que dans des possessions très-resserrées ils ne pourroient point suivre à la culture des moutons, principale res-

source des cultivateurs de la province , & qui est assurée aux petits fermiers comme aux grands, par l'établissement des bergers communs.

L'écobuage ne s'emploie gueres en Wiltshire pour la culture des terrains en activité de labourage ; mais c'est la maniere usitée pour mettre en valeur les terres en friche. Il seroit intéressant de déterminer ce qu'il y a de vrai dans les deux assertions contradictoires des fermiers à l'égard de cette méthode. Les uns la regardent comme de beaucoup la plus économique & la meilleure pour mettre en valeur des terres incultes ; les autres affirment que si ce procédé enrichit les peres , il ruine les enfans — L'écobuage , ainsi que d'autres procédés d'agriculture long-temps controversés , est bon ou mauvais selon les circonstances. Quant à la province de Wilts en particulier , il me paroît que cette méthode ne devroit jamais être employée dans les terres cultivées depuis long-temps , parce qu'en général les terrains de ce district sont légers & peu profonds , & que le parc est la meilleure maniere de leur donner de la solidité en augmentant les suc de la végétation. On peut employer l'écobuage dans les terres qui supportent les grains, après que le stimulus accidentel de la cendre a perdu son effet. Parmi les terrains incultes de la province , aucune qualité de sol ne supporteroit des grains à la longue sans addition d'un engrais altérant ;

DU COMTÉ DE WILTS. (167)

or il n'y a point de marne , & le seul engrais propre à changer la qualité du sol , qu'on puisse s'y procurer , est la chaux.

La chaux agit d'une manière favorable sur les terres rouges ; mais elle est à-peu-près sans effet sur les terres noires. Celles-ci , toujours peu profondes , toujours trop peu substantielles pour supporter la charrue , devraient rester en pâturages. Quant aux terres rouges suffisamment profondes , & surtout lorsqu'elles sont embarrassées de buissons , de racines , ou d'autres obstacles , l'écobuage est assurément le meilleur & le plus économique des moyens de les mettre en valeur (1).

C'est un fait , que les collines de Wiltshire donnent une rente beaucoup plus forte que les terrains situés de même dans le Hampshire , le Dorsetshire & le Gloucestershire. Ces Comtés avoient autrefois précisément l'économie rurale de Wilts relativement au parc ; & il y a dans plusieurs parties du Hampshire & du Dorsetshire des prairies à inondations tout aussi bonnes que celles de Wilts. Quelle est la raison qui a fait abandonner dans ces Comtés le système de la province qui nous occupe ?

Il paroît que la manie des belles races de

(1) Voyez l'avis d'Arthur Young sur l'écobuage , & les rapports faits sur ce sujet au Département d'Agriculture pag. (249) du I. vol. d'Agriculture. (R)

brebis est la cause de ce changement. On a perdu de vue, dans ces Comtés, les incomparables avantages du parc, pour s'occuper d'avoir des races distinguées. On a moins de bêtes à laine, & on laboure davantage; les terrains s'épuisent par le concours de ces deux causes. On avoit bien commencé à prendre la manie des belles races en Wiltshire, & sacrifier par conséquent une partie des effets du parc; mais l'introduction des brebis de South-Down a arrêté la mode qui gagnoit au détriment des terres.

On ne sauroit parler avec trop d'éloges de l'usage des prairies inondées, ni assez en recommander l'imitation. On ne peut nier qu'il n'y ait dans le Royaume un très-grand nombre d'endroits où cette industrie pourroit être imitée. Quant à ceux qui doutent de l'avantage de ces prés, je les invite à venir visiter la province de Wilts dans le mois d'avril; & à indiquer ensuite une autre ressource sur laquelle le fermier puisse compter avec une certitude égale, pour nourrir ses troupeaux dans ce mois de détresse. Les prés inondés ont trois ou quatre semaines d'avance sur les ray-grass & sur tous les prés naturels.

Quels que soient les avantages que l'Angleterre retire des racines & fourrages verts pendant la saison froide, (& assurément ces) avantages sont inestimables) cependant on peut

poser en fait que, soit que l'hiver soit rude ou qu'il soit doux ; que le printemps soit hâtif ou tardif, il y a toujours, pour nous, un intervalle critique entre la fin des fourrages d'une année, & le commencement des fourrages de l'année suivante. La même température qui fait pousser l'herbe au printemps, fait monter en graine les turneps, le colza, les choux, &c. en sorte que non-seulement ils perdent leur qualité nourrissante, mais ils épuisent le terrain dans lequel ils végètent.

Un moment de réflexion suffit pour faire comprendre qu'il doit en effet y avoir un intervalle dans la nourriture verte des bestiaux. Il faut l'art du jardinier pour amortir les effets de l'hiver, & avancer ceux du printemps. Il y réussit par les ferres chaudes, & les couches : les prés inondés sont de véritables couches pour le fermier ; & il en obtient des primeurs pour ses troupeaux. Quelle n'est donc pas l'importance de l'imitation de cette industrie dans tous les lieux qui en sont susceptibles ! Ajoutons encore une considération de la plus grande importance en faveur de cette amélioration ; c'est que c'est la plus durable qu'on puisse faire. Le temps la rend de plus en plus efficace, & un fermier négligent ne sauroit en altérer sensiblement les bons effets.

Avant de parler de l'agriculture du district du Nord, indiquons quelques-unes des fautes

que l'on commet dans la pratique du canton dont nous venons de nous occuper : il peut n'être pas inutile de les rappeler pour l'instruction de ceux dont les circonstances locales ont quelque rapport avec celles des fermiers de Wiltshire.

Relativement aux animaux, & surtout aux moutons, le tort de quelques cultivateurs, c'est de s'attacher à se procurer de belles races sans consulter assez les convenances de sol & de climat. L'abri, les foin, la chaleur, sont absolument nécessaires pour le développement complet des belles formes des animaux. On peut sans doute obtenir ces conditions en dépit du climat ; mais alors il faut abandonner la ressource fondamentale du parc, & principalement sur les terres qu'on prépare pour l'orge, comme nous l'avons vu. Aussi long-temps que la province de Wilts sera un pays de grains, il importera essentiellement aux fermiers de s'attacher au parc comme au procédé le plus important de l'économie rustique.

La fantaisie des chevaux massifs & de grande taille a presque chassé du pays la petite race active & vigoureuse qui appartenait à la province. Ces grands & beaux chevaux emploient un capital considérable ; les accidens sont ruineux, & l'entretien en est très-cher : car les domestiques ont ordinairement, pour les maintenir gras, la même ambition que les fermiers pour les avoir beaux. On ne calcule pas ce que

ses chevaux content, parce que les valets prennent l'orge (la principale nourriture de ces chevaux) dans le tas; sans le mesurer. Mais il arrive quelquefois que l'entretien d'un bel attelage équivaut à la rente de la ferme.

Le prétexte de préférence pour ces chevaux étoit autrefois de gagner dessus en les revendant faits pour les chars de Londres, après les avoir achetés poulains. Mais c'est un mauvais calcul que celui-là. On achète cent poulains à trente guinées la piece, & l'on en revend un ou deux peut-être à quarante-cinq guinées, deux ou trois ans après, en comptant comme pur gain le travail fait dans l'intervalle. Mais un cheval de grande taille n'est fait qu'à six ans. Jusqu'à ce moment là, il faut le ménager & le bien nourrir, sans quoi il n'obtient jamais tout son développement. La nourriture d'extra est aux dépens du fermier, & les ménagemens dans le travail sont aux dépens des autres chevaux; enforte que les poulains ne gagnent pas ce qu'ils mangent.

L'argument auroit moins de force si les fermiers pouvoient entretenir des jumens pouliaires de cette race, & élever eux-mêmes; mais le pays ne le comporte pas. Remarquons encore que cette race lourde est trop lente dans son allure pour les principaux objets de l'économie agricole en Wiltshire, & peut-être dans tous les pays. La force de ces énormes chevaux est surabondante dans les terres légères.

(172) AGRICULTURE, &c.

& leur poids nuit essentiellement aux terres argileuses. Il faut laisser cette race aux charretiers ; elle n'est d'usage profitable que sur les grandes routes. Le fermier a besoin de chevaux plus actifs , plus légers , d'un entretien moins coûteux & moins difficile.

On peut encore reprocher aux cultivateurs de Wiltshire d'avoir diminué le nombre de leurs vaches pour les avoir plus belles. Au lieu de se tenir à une petite race , abondante en lait , facile à nourrir , & qui soutenoit l'hiver dans les enclos en ne mangeant que de la paille , ils ont des grosses vaches qui ne rendent pas plus , & qu'il faut hiverner au foin dans l'écurie pour qu'elles ne perdent pas leur chair.

Enfin il ne faut pas oublier une erreur des fermiers qui est d'une conséquence bien plus grave , & qui est aussi infiniment plus commune ailleurs : c'est de semer annuellement plus de grains , & surtout plus de blé qu'il ne faudroit. Les deux principales causes de cet abus , sont la non clôture des champs , & le peu de foin que l'on met à obliger les fermiers , par les conditions de leur bail , à ménager les terres. Il en résulte que n'ayant point assez de fourrages secs , ils sont obligés de diminuer beaucoup leurs troupeaux l'hiver ; que leurs terres arables sont dans un état de rapport forcé , & qu'ils font moins de fumier qu'ils n'en feroient en semant moins.

G^e l'Observatoire de Paris.

Evaporation au niveau du Sol.		Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.			OBSERVATIONS
2 h.	C. du S.	L. du S.	2 h.	C. du S.	Diverses.
Li. Dou.	Li. Dou.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	
0. 2	0. 3	+5. 5	+7. 0	+7. 5	Les terres ont été sèches, & toutes les sources très-basses pendant la première partie du mois. Les blés sont généralement beaux en terres légères, surtout ceux qui succèdent au trèfle. Ils sont également beaux dans les terrains en pente & bien égouttés, dans les terres fortes qui ont été bien fumées; mais dans les terres pesantes & froides qui ont des eaux sous la couche végétale, ou qui sont suettes à se soulever & s'émietter l'hiver, ils sont clairs, & l'on y remarque de grandes places vides. En général les blés auroient eu besoin de taller, & les pluies ont un peu trop tardé. — Les prés sont clairs & peu avancés. Les pêcheurs, abricotiers & en général les fruits à noyaux ont beaucoup fleuri; mais les brouillards froids paroissent leur avoir nuï. La vigne est peu avancée.
0. 2	0. 0	5. 5	7. 0	7. 3	
0. 0	0. 0	6. 0	7. 0	7. 0	
0. 0	0. 0	5. 3	5. 5	5. 9	
0. 1	0. 1	4. 0	5. 3	5. 5	
0. 0	0. 1	4. 9	5. 9	6. 3	
0. 2	0. 3	4. 3	5. 9	6. 9	
0. 3	0. 4	5. 9	7. 9	8. 3	
0. 4	0. 6	6. 0	10. 0	10. 5	
0. 3	0. 3	9. 3	10. 3	10. 5	
0. 2	0. 4	8. 5	10. 3	11. 0	
0. 2	0. 5	10. 0	11. 3	12. 0	
0. 3	0. 8	10. 5	11. 9	12. 3	
0. 3	0. 5	10. 3	11. 5	12. 0	
0. 2	0. 5	11. 0	12. 0	12. 3	
0. 2	0. 4	10. 0	11. 3	12. 0	
0. 3	0. 6	9. 5	10. 9	11. 5	
0. 2	0. 3	10. 5	11. 5	11. 9	
0. 3	0. 5	10. 5	12. 0	12. 9	
0. 2	0. 4	11. 3	12. 5	12. 5	
0. 3	0. 5	11. 0	11. 5	12. 0	
0. 3	0. 0	10. 5	12. 3	12. 0	
0. 5	0. 8	10. 5	12. 0	12. 5	
0. 5	0. 8	10. 5	12. 0	12. 3	
0. 4	0. 8	10. 9	11. 0	11. 0	
0. 0	0. 0	10. 3	10. 9	11. 0	
0. 0	0. 0	10. 0	9. 9	9. 9	
0. 2	0. 5	9. 0	9. 3	9. 3	
0. 3	0. 5	8. 3	9. 0	9. 0	
0. 3	0. 6	8. 0	8. 9	9. 0	
Total.	Moy.	+8.59	+9.79	+10.14	

4-1
le 15e. 20°

A G R I C U L T U R E.

ON THE IMPROVEMENTS IN AGRICULTURE, &c. Des perfectionnemens de l'Agriculture dans le Royaume depuis cinquante ans. Par Mr. WIMPEY. (Tiré des Mémoires de la société de Bath).

J'ENTENDS par perfectionnement, toute disposition dans la culture qui augmente la valeur des produits de la terre dans une proportion plus forte que les frais nécessaires pour cet accroissement : ou, en d'autres termes, les perfectionnemens de l'agriculture sont des moyens nouveaux de donner des profits nets plus considérables.

Ces moyens peuvent se rapporter aux chefs suivans :

- 1°. Le labourage.
- 2°. L'invention d'instrumens nouveaux, ou la meilleure exécution des anciens.
- 3°. La distribution exacte d'une quantité convenable de semence.
- 4°. L'application des plantes aux terrains qui leur sont propres.
- 5°. Les assolemens.

(174) AGRICULTURE.

6°. Les engrais naturels & artificiels.

7°. L'introduction de nouveaux objets de culture.

8°. L'éducation, & l'engrais des bestiaux, au moyen de ces nouvelles productions.

Labourage.

Les labours sont destinés à rompre, émietter & pulvériser la terre. Autrefois cette opération s'exécutoit d'une manière très-imparfaite ; mais l'expérience a montré que plus ce résultat étoit exact, plus le sol se maintenoit propre, & plus le produit avoit de valeur.

Le perfectionnement du labourage avoit marché à pas lents jusqu'au moment où Tull, de respectable mémoire, démontra l'avantage, la nécessité même, de mieux labourer la terre.

Les procédés du labourage se sont beaucoup perfectionnés dès lors ; & c'est la base de tous les succès que nous avons éprouvés dans l'adoption des nouveaux objets de culture. Une terre bien labourée est dans la meilleure situation pour recevoir les principes fertilisans de l'atmosphère. La pluie, la neige, les rosées, le gel, font pénétrer l'aliment de la végétation aussi bas que la terre est remuée, & bien pulvérisée. Les labours sont le seul moyen de détruire les mauvaises herbes ; & ils doivent être répétés jusqu'à ce que ce but soit atteint.

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (175)

Les racines déliées des plantes enveloppent , faififfent la terre , & la retiennent par petites maſſes juſqu'à ce que l'action de l'air & des météores décompoſe ces radicules , & faiſſe tomber en poudre les petites maſſes qui tenoient enſemble (1).

La destruction des mauvaiſes plantes n'eſt pas néanmoins le ſeul bénéfice immédiat qui réſulte des labours ; les larves , les nymphes , les vers nuifibles de différentes eſpeces , qui abondent dans certaines terres , & dans certaines années , ſont fort réduits en nombre , ſi ce n'eſt même entièrement détruits , par les labours fréquens , faits à propos , & la pulvériſation exacte de la terre. J'ai eu dans mes champs de fèves de grands eſpaces entièrement ravagés par la larve du hanneton , & j'ai perdu pluſieurs centaines de choux par un ver gris plus petit ; mais j'ai toujours éprouvé que des labours faits à propos , & ſuffiſamment répétés détruiſent ces infectés.

La bonification qui réſulte pour le terrain des labours fréquens , & faits à propos , n'eſt que graduelle ; & plus long-temps la terre eſt

(1) Ce n'eſt pas ſeulement en faiſant pourrir au fond de la raie , ou deſſécher ſur la ſurface du champ , les mauvaiſes herbes , que les labours les détruiſent ; c'eſt encore en faiſant végéter ſuccéſſivement les ſemences enterrées à diverſes profondeurs , & en enterrant enſuite les plantes qui en proviennent. (R)

soumise à cette pratique , plus elle en retire d'avantages.

Un labour avant l'hiver , & un autre pendant l'hiver ou à l'entrée du printemps , ont plus d'effet pour pulvériser le sol & le rendre fertile , que six labours donnés dans le reste de l'année. J'ai , dans ce moment , une piece de huit acres qui étoit en blé l'année dernière. Je fis retourner le chaume en octobre , puis j'ai fait donner un labour croisé en février. Le laboureur qui la cultive depuis plusieurs années n'a jamais vu le terrain si bien préparé. C'est une terre argileuse & un peu humide. Auprès de ce champ , j'en ai un autre de six acres , exactement du même terrain , & dans la même situation. Les fortes gelées d'automne ont empêché de le labourer avant l'hiver. Ce n'est qu'en février qu'on l'a rompu. Il est maintenant si raboteux , si plein de grosses mottes , que je doute de pouvoir réussir à force de labours , & de herfages , à le mettre en état de recevoir le grain ce printemps ; tant est grande la différence entre les effets des labours qui précèdent l'hiver & de ceux qui le suivent.

Le bénéfice des labours est si évident qu'on doit s'étonner de ne pas voir tirer plus de parti de ce moyen. Mais dans ce pays-ci , & dans d'autres , je pense , les fermiers se laissent détourner de la bonne route par un béné-

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (177)
fice présent. Ils prennent à la St. Michel des moutons à hiverner, à 4 shellings 6 deniers par tête, jusqu'à la première semaine d'avril. Ils sont obligés, en conséquence, de garder leurs chaumes pour pâturages; & au moment où leurs champs devoient être prêts à recevoir la semence, ils sont à peine rompus. Ils perdent ainsi trois ou quatre fois plus sur la récolte des grains de printemps qu'ils ne gagnent sur les moutons. Cela leur donne à la vérité un peu d'argent comptant dans un moment où ils en ont besoin; mais c'est un mauvais calcul que de prendre quatre ou cinq shellings, pour en rendre dix, quinze, ou vingt, huit mois après, ou pour les perdre sur la récolte, ce qui est exactement la même chose. Il faut au moins compter deux acres par bête à laine. Le fermier ne reçoit donc, au plus, que 2 shellings 3 deniers par acre; au lieu qu'une jachère d'hiver vaut mieux que 20 shellings d'engrais par acre. J'en tire la conséquence qu'un terrain quelconque, destiné à une récolte de graine de printemps, ne fauroit être employé plus utilement que par une jachère d'hiver (1).

(1) Cette proposition peut être vraie, en général, pour les terres argileuses; mais nous doutons qu'elle puisse s'appliquer également aux terres légères. Diverses observations, faites sur ces terres, & une

*Invention d'instrumens de culture , ou meilleure
exécution d'anciens instrumens..*

Je comprends ici les charrues de toute espee, les herfes , les houes , & en général tous les outils de labourage.

Autrefois les charrues étoient très-mal construites. Les unes ne faisoient qu'égratigner la terre , d'autres étoient si lourdes & si mal façonnées qu'elles demandoient une force énor.

expérience directe , que nous avons faite , justifient ce doute. Au mois de décembre 1794 , nous rompîmes le tiers d'un champ de trois arpens , qui avoit rapporté du blé , & qui étoit destiné à être semé au printemps suivant. Le tiers rompu avant l'hiver , & les deux autres tiers , furent labourés en mars 1795 , & le champ fut successivement semé en orge mêlé de vesces , en avoine , en pommes de terre , en maïs , & en turneps. Les espaces semés de chacune de ces productions étoient disposés parallèlement les uns aux autres , & à angles droits avec la direction du labour d'automne ; en sorte que le tiers de chacun de ces espaces avoit reçu deux labours. On s'attendoit que , dans chaque production , la partie labourée une fois seulement auroit une infériorité marquée ; mais il ne fut pas possible de découvrir la moindre différence , ni pour la force de la végétation , ni pour la quantité de mauvaise herbe , ni à aucun autre égard , dans les cinq divisions du champ. Il demeura évident que le labour d'automne avoit été perdu. La terre du champ est graveleuse ; & sensiblement homogène. (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (179)

me : il ne leur falloit pas moins de quatre chevaux. Nous en avons plusieurs maintenant qui font l'ouvrage beaucoup mieux , & plus aisément ; telles que la charrue de *Rotheram* ou *patent plough* ; la charrue à une roue , la charrue de Norfolk , &c. — Il paroît que celle-ci est la meilleure de toutes celles dont on se sert dans le Royaume : elle laboure une terre forte avec deux chevaux & sans aide , & elle y fait autant d'ouvrage qu'une charrue pesante avec quatre chevaux & un conducteur : quel avantage !

Mais il y a une autre charrue qui , dit-on , fait le double d'ouvrage dans un temps donné , avec une dépense qui n'est pas beaucoup plus considérable. C'est la charrue double (*double plough*) qui laboure deux raies à la fois. Elle demande trois chevaux , mais n'exige point de conducteur. Je l'ai vu travailler dans un grand champ , & tracer ses sillons parfaitement droits d'un bout à l'autre , sans que le laboureur mît la main au manche de la charrue. Je crois que ces deux derniers instrumens de labourage sont les plus perfectionnés que l'on ait , pour l'usage général (1).

Il y a d'autres charrues d'invention moderne pour de certains objets déterminés. La char-

(1) Il ne paroît pas que la *double plough* tienne tout ce que l'auteur en espéroit lorsqu'il a écrit. (R)

rue à deux oreilles est du nombre , & a bien son mérite. Avec cette charrue je trace les sillons pour planter les pommes de terre ; puis je recouvre celles-ci en refendant l'intervalle qui sépare deux raies. Après l'opération de la houe , je me fers de la même charrue pour buter mes pommes de terre , en donnant un trait entre les lignes. On peut s'en servir de même dans toutes les récoltes semées ou plantées en ligne à des distances suffisantes , & l'on fait le double d'ouvrage que l'on ne pourroit faire avec la charrue ordinaire (1).

Quelques autres charrues encore sont d'un usage moins commun ; telle est la *trenching plough* qui laboure quelquefois jusqu'à 18 pouces de profondeur ; les charrues à dessécher les terres ; & enfin la petite charrue à labourer

(1) Bien entendu qu'il ne peut être question ici que des plantes qui demandent à être terrées ou butées. Or il n'y a gueres que les pommes de terre & le maïs qui soient dans ce cas ; & le maïs se trouve beaucoup mieux de l'ouvrage fait à la main. Cette plante , pour bien réussir , demande d'être butée lorsqu'elle est encore très-faible , & la charrue ne pousse point la terre avec assez de précaution & de précision. Les plantes sont souvent cassées ou endommagées par l'accumulation trop brusque de la terre d'un côté de la ligne. Nous en parlons par expérience , ainsi que de l'opération de terrer les patates à la charrue , opération infiniment économique , & que nous ne saurions trop recommander. (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (181)
entre les rangées des plantes semées au semoir.
Elle peut avoir la forme de la *Rotheram plough*,
ou de la charrue à une roue. Chacune des
deux fait aussi bien cet ouvrage qu'une houe-à-
cheval quelconque.

*Distribution exacte d'une quantité convenable de
semence,*

L'épargne qu'on obtient sur la semence, dans la pratique moderne, est très-considérable. L'expérience a prouvé qu'environ un tiers de la graine qu'on employoit autrefois à semer, & qu'on employe encore dans quelques endroits, suffit pleinement. En général cette petite quantité donne plus que ne fait une quantité plus considérable. Dans l'ancienne agriculture, en semant à la volée, on met ordinairement de deux à trois bushels de froment par acre; & lorsqu'on sème au semoir, ou qu'on plante, à l'imitation de la pratique de l'Orient, la quantité de trois à cinq pecks, est suffisante (1). Il y a donc une épargne d'un bushel & demi par acre; & si la nouvelle méthode étoit généralement adoptée, il en résulteroit, je pense, un dixième ou un douzième de plus sur la quantité totale du froment recueilli annuellement.

(1) Voyez la table comparative des poids & mesures annexée au premier volume.

C'est un objet aussi intéressant pour les individus , que sous le point de vue politique. Il y auroit un véritable patriotisme à s'occuper fortement des moyens d'étendre cet usage.

Le plantage du blé est en opposition directe avec les préjugés du cultivateur. Il a semé , pendant cinquante ans peut-être , deux bushels & demi par acre ; & il a souvent observé , à la moisson , que ses blés étoient trop clairs de moitié. Il en conclut que s'il n'avoit semé que la moitié de ce qu'il a mis en terre , la récolte auroit été de moitié moindre encore : ses champs , au moment des femailles , sont souvent très-mal préparés , & remplis de grosses mottes. La herse enterre trop bas une partie de la semence , qui ne leve point (1) ; une autre partie reste sur la terre , & est mangée des oiseaux : il n'y a peut-être pas un tiers du grain semé qui végete & arrive à maturité (2).

(1) Cette assertion paroît hasardée , quand l'on réfléchit que le froment semé *sous raies* , à quatre ou cinq pouces de profondeur , leve très-bien. Il arrive quelquefois , à la vérité , que des grains germés sous de grosses mottes de terre , périssent sans pouvoir les percer ; mais cette perte est très-peu considérable , parce qu'ordinairement le germe , en se développant , fuit horizontalement la ligne de moindre résistance , pour parvenir à la lumière , & s'élever ensuite verticalement. (R)

(2) Si tous les grains de froment germoient & produisoient seulement un épi qui parvint à maturité , &

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (183)

Mais en plantant à la main , chaque grain est placé à la profondeur & à la distance convenables ; de maniere que sur mille grains il n'y en a pas un qui manque (1). Cette maniere de semer est d'usage depuis plusieurs années en Norfolk , Suffolk , &c. ; elle s'étend & continuera sans doute à s'étendre ; parce qu'elle produit de plus belles récoltes , outre l'épargne de la semence. La seule objection qu'on puisse proposer à cette méthode c'est la dépense , & le nombre de bras qu'elle requiert. On répond à la premiere objection que le prix du plantage ne revient maintenant qu'à 5 shellings par acre, prix très-bas relativement au profit de la méthode. La seconde objection tombe également , à cause des instrumens inventés pour semer régulièrement , soit à lignes rapprochées pour houer à la main , soit en lignes éloignées pour houer avec des

ne portât que vingt-cinq grains , il en résulteroit une récolte de vingt-cinq pour un ; & cependant c'est une supposition forcée que de ne supposer aucun tallement ; il y en a toujours plus ou moins. Mais comme une récolte , dans une terre & une année qui ne tallent pas , ne produit que quatre ou cinq pour un , il est clair que les quatre cinquiemes , au moins , de la semence n'ont pas germé ou ont péri. Qu'est-ce donc dans les terres & les années où le tallement est considérable , & où l'on ne recueille pourtant que sept à huit pour un ? (R)

(1) La note précédente prouve combien cela est exagéré. (R)

(184) . AGRICULTURE.

chevaux. Il est vrai que l'usage de ces instrumens n'est pas encore aussi étendu qu'il le faudroit ; mais cela est surtout dû au prix élevé que les inventeurs y mettent. Les fermiers , en général , sont fort opposés à ces nouveaux moyens , & *a priori* ils se persuadent que les anciennes méthodes valent mieux , soit pour la force des récoltes , soit sur le profit qu'elles donnent. En conséquence , ils sont fort peu disposés à dépenser 16 ou 18 guinées à acheter des instrumens qu'ils jugent inutiles. Si l'usage du semoir devient jamais général , ce sera par l'exemple des gens aisés qui ne craignent pas de dépenser quelque argent à une expérience qui promet d'heureux résultats pour eux & pour le public.

Application des plantes aux terrains qui leur sont propres.

Autrefois les fermiers ne songeoient qu'à la facilité de l'écoulement de leurs denrées , dans le choix des récoltes , & ne consultoient pas la qualité & les convenances du sol. Mais aujourd'hui l'introduction d'un grand nombre d'objets nouveaux dans la culture des champs étend les ressources des fermiers intelligens. Ceux-ci préfèrent la culture des productions que leur terrain peut donner avec abondance & avec le moins de frais. Ainsi , par exemple , le froment est le principal article que le fer-

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (185)

mier cultive ; c'est le premier objet de son attention ; mais il destine une grande partie de ses terres , qui produiroient peu de blé , à cultiver d'autres plantes dont il tire de grands avantages. Il en est ainsi de toute autre production. Le perfectionnement obtenu sur ce point , c'est que l'on consulte la nature , au lieu de la contrarier à grands frais.

Les assolemens.

Cet article comprend des perfectionnemens très-étendus & très-importans. On distingue , parmi les productions des champs , les récoltes épuisantes , & les récoltes améliorantes : ce qui doit s'entendre d'une manière comparative ; car , à proprement parler ; il n'y a peut-être aucune plante qui , si l'on l'emporte du champ pour la consommer ailleurs , n'épuise la terre plus ou moins.

La première classe de productions comprend les plantes à racines fibreuses , telles que le blé , l'orge , le seigle , l'avoine ; la seconde classe comprend les plantes à racines pivotantes , telles que les fèves , pois , vesces , turneps , carottes , trèfles &c. — Une succession judicieuse de ces diverses récoltes a beaucoup contribué à perfectionner l'agriculture. Au moyen du remplacement d'une récolte épuisante par une améliorante , on peut soutenir pendant un grand

nombre d'années la fertilité de la terre , sans faire intervenir de trois en trois ans , ou de quatre en quatre ans , une jachère , comme c'étoit autrefois l'usage.

Engrais naturels & artificiels.

Par engrais j'entends toute substance qui répandue sur le sol , ou mêlée à la terre , en accroît la fertilité. Ces substances peuvent agir mécaniquement ; ou chimiquement.

Les premières sont celles qui perfectionnent la texture ou la consistance du sol. Ainsi , le sable ou le gravier fin rendent la glaise plus légère & plus fertile ; & les terres graveleuses , pénétrables à l'eau , incohérentes , sont sensiblement bonifiées par l'addition de la glaise. Les marnes de toute espèce , la craie , les coquilles , enfin toutes les substances qui tendent à donner de la consistance & la faculté de retenir l'eau , aux terres trop légères , ou qui rendent les terres fortes plus pénétrables aux influences de l'atmosphère , sont des engrais qui agissent mécaniquement. Mais les marnes , la craie , les coquilles , améliorent le terrain , non-seulement par cette influence mécanique , mais encore par leur action chimique , dont il résulte une augmentation des sucs de la végétation. Ce sont donc des substances qui agissent sous la double capacité d'engrais mécaniques & d'engrais chimiques.

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (187)

Il est peut-être inutile de rechercher si ces substances contiennent un aliment végétal, ou si elles en favorisent seulement la distribution. Toutes les substances absorbantes attirent fortement l'eau, les huiles &c. leur vertu améliorante est peut-être uniquement due à cette faculté d'attraction. Les exhalaisons putrides sont attirées par ces terres absorbantes, & passent ensuite dans les plantes.

L'atmosphère est le grand magasin des vapeurs putrides qui sortent continuellement de la terre, des animaux, & des végétaux. Ces exhalaisons sont le vrai *pabulum* des plantes; donc toutes les substances d'une nature absorbante qui attirent ces exhalaisons plus fortement que le sol ne le faisoit auparavant, améliorent ce même sol (1).

Celles d'entre ces substances qui sont de nature calcaire, & que l'on peut calciner avant de les employer, acquièrent une beaucoup plus grande activité comme engrais, pourvu qu'on les emploie avant que le contact de l'air ait

(1) Nous ne nous chargerions pas de défendre cette théorie, non plus que toute autre qui porte sur des suppositions de substances que personne n'a vues, ni soumises à l'analyse. Ces théories accoutument à se payer de mots; elles détournent de l'examen des faits, & rendent l'observateur incapable de voir la vérité toutes les fois que celle-ci contredit un préjugé raisonné. (R)

(188) AGRICULTURE.

éteint ou amorti cette faculté. On fait que la chaux, par le contact prolongé de l'air, redevient une substance semblable à la terre calcaire non calcinée. On peut donc compter parmi les découvertes importantes de l'agriculture pratique la manière d'employer la chaux vive pour communiquer au sol sa qualité absorbante ; car auparavant l'on étendoit la chaux sur le terrain , où elle perdoit bientôt sa faculté & redevenoit de la terre calcaire simple, enforte que la dépense de la fabrication en chaux étoit perdue.

Introduction de nouveaux objets de culture.

Le nombre des plantes dont la culture a passé du jardin aux champs est assez considérable. Les turneps, les pommes de terre ; les choux, les carottes, les panais, se cultivoient fort anciennement dans notre isle ; mais l'adoption de ces plantes pour l'usage des bestiaux est une pratique nouvelle. L'importance de cette culture est incontestablement établie par l'expérience ; mais malheureusement l'usage n'en est pas encore aussi étendu qu'il le faudroit.

On a beaucoup vanté diverses plantes pour foins artificiels. Quelques personnes ont réussi à en vendre les graines à un prix très-haut ; & le succès n'a pas toujours répondu aux promesses des vendeurs. Il y a deux plantes cependant qui méritent d'être exceptées & qui ont droit à des soins particuliers, c'est la luzerne

&

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. 189

& le sain-foin. Ces deux productions payeront avec usure les frais que les fermiers feront pour les cultiver. (1)

Le sain-foin, quoiqu'employé dans plusieurs provinces, ne l'est pas, à beaucoup près autant, qu'il le faudroit. Comme il réussit très-bien sur la craie, on en a faussement conclu qu'il ne réussiroit pas dans les terres profondes. On observe que la couche de craie arrête le puyotement des racines, qui, dans la disposition naturelle de la plante descendroient à une profondeur extrêmement considérable si rien ne s'y oppoisoit. On prétend que la plante perd de sa vigueur par l'excès de ses racines, & qu'elle produit moins en herbe, en raison de ce que celles-là sont plus considérables. Cette idée, toute contraire qu'elle est au sens commun, à la raison, à l'expérience, & à l'observation, est soutenue par des gens habiles en agriculture; tant les préjugés ont d'empire quand ils sont généralement établis dans un canton.

(1) L'auteur ne parle pas des trefles, dont l'importance est bien plus générale que celle de la luzerne & des sain-foins en Angleterre. C'est apparemment parce qu'il ne range pas leur culture parmi les découvertes modernes; mais il est cependant certain que l'art d'en tirer parti, dans les assolemens, de la manière la plus avantageuse, n'est pas très-ancien. (R)

Agriculture. Vol. 2. N°. 5. Mai 1797. Q

Je pense qu'il y a dans le Royaume très-peu de fermes arables qui ne soient susceptibles d'amélioration par les fain-foins : celles-là, surtout, qui sont mal pourvues de prés naturels, & de pâturages. Les plus mauvaises terres de ces fermes donneraient de bonnes récoltes de fain-foin ; & ce qui rend aujourd'hui de 2 à 5 shellings de rente, par acre, en rendroit aisément de 20 à 40. L'avantage ne seroit pas moins grand pour le fermier, qui pourroit ainsi nourrir un plus grand nombre de vaches & de cochons, & augmenter ses fumiers.

Le grand ennemi du fain-foin c'est l'herbe. Dans les bonnes terres, les gramens prennent le dessus, & l'étouffent, à moins que le fermier n'ait le plus grand soin de maintenir son pré net. Mais ce n'est point là une entreprise si effrayante qu'on l'a représentée, pourvu qu'on ait l'attention de ne semer qu'en terrain bien préparé, & de mettre les lignes de quinze à dix-huit pouces, ce qui est la vraie distance pour une prairie durable. Avec un tel intervalle entre les lignes, on peut tenir le fain-foin parfaitement net, au moyen d'une petite charrue & d'un rateau de fer de douze pouces. Ces instrumens font beaucoup d'ouvrage, & l'on peut nettoyer ainsi plusieurs acres dans une journée. En répétant l'opération trois fois dans l'été, les frais ne sont qu'une bagatelle.

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (191)

Je me fers d'un rateau de douze pouces , & il m'est extrêmement utile pour toutes les récoltes semées en ligne. (1)

La luzerne , traitée de même , feroit un moyen d'amélioration très-efficace dans les fer-

(1) Cet appareil de précautions pour semer & cultiver les sain-foins , (ou esparcettes) doit effrayer ceux qui ont une idée des difficultés de l'adoption du semoir avec tout son attirail. Il y a un secret plus simple pour avoir de beau sain-foin ; c'est de semer fort épais , à la volée , de la graine bien choisie , & en bon temps. Avec ces précautions on a la certitude de réussir ; mais il est rare qu'on les prenne. Il faut , pour semer un espace donné , trois fois plus de graine (à la mesure & non au poids) qu'on ne mettroit de froment dans la même étendue ; mais cette graine est fort chère : il faudroit la prodiguer & on l'épargne. Quant au choix , qui est également important , il faut s'assurer que la graine n'est pas vieille , & qu'elle est pleine ou nourrie. Pour l'éprouver , à ce dernier égard , on en prend une poignée dans la main , & en tenant la main fermée , on la remue auprès de l'oreille. Si la graine est bonne on l'entend bruire dans les coques. Enfin , pour assurer la levée , il ne faut pas semer en terre sèche ; il faut , s'il est possible , que la terre soit fraîche , & le temps chaud , pour que la germination soit prompte ; car si le grain est exposé à une chaleur sèche , il s'éclate & ne leve point. Nous en parlons par expérience. Le gypse , répandu à la seconde année , donne une grande vigueur au sain-foin , hâte la réussite de la graine , & augmente beaucoup le produit. (R)

mes arables. On est persuadé, en général, qu'elle demande des terres beaucoup plus riches qu'on ne les trouve communément. Sans doute que les sols riches donnent des récoltes plus fortes, lorsqu'on a soin de maintenir la luzernière bien nette; mais c'est une grande erreur de croire que la luzerne ne puisse réussir que dans des terres très-riches. Elle réussit très-bien dans des terres médiocres, lorsque l'on emploie les mêmes moyens que ci-dessus. J'ai fait moi-même cinq belles coupes dans un été sur une luzernière de cinq ans, qui n'avoit reçu aucun engrais qu'un peu de cendres de tourbe, l'année qui suivit la semaille (1). Quelques acres de l'une de ces plantes, ou de toutes deux; quelques acres de pommes de terre, choux, ou turneps, mettroient les fermiers en état de tenir un grand nombre de vaches

(1) Nous avons l'expérience d'une luzernière de trois arpens, semée à la volée, dans un terrain graveleux & médiocre, au mois de mai 1794, & qui a parfaitement réussi. Le champ avoit été labouré très-profond en novembre, il fut recroisé en avril, sans fumer. La graine fut semée avec de l'orge, à treize livres poids de marc sur vingt-cinq mille pieds de surface. Le pré fut couvert de *compost* en décembre, & gypsé en mai 1795. — En 1796 la luzerne fut encore gypsée une fois, & donna quatre belles coupes. Elle est très-belle dans ce moment. (15 mai 1797.) (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (193)
à lait, sans avoir un seul acre de prés naturels, ou de pâturages.

Le chou-rave ou chou navet (*turnep-rooted cabbage*) connu depuis environ vingt-ans, a été cultivé avec succès par quelques personnes, & est fort recommandé. Sa racine & ses feuilles sont également bonnes pour le bétail; mais ce qui fait son principal mérite, c'est qu'il résiste aux hivers les plus rigoureux. Les choux & les turneps ont succombé quelquefois à des gélées qui laissoient le chou-rave intact; & il donne de la nourriture aux bétiaux jusqu'au milieu de mai.

On a beaucoup parlé, en dernier lieu, de la racine de disette. Les succès de quelques personnes semblent faire espérer qu'on pourra en tirer un grand parti pour nourrir les bétiaux; mais jusqu'ici il n'y a peut-être pas un fermier sur mille qui en connoisse seulement le nom. C'est une espèce de bette. Les deux graines se ressemblent parfaitement; & les feuilles ainsi que les racines des deux plantes ne diffèrent que dans leurs dimensions & leur couleur.

J'ai fait un essai sur cette plante. J'en ai semé, ou plutôt planté, à diverses distances, en avril dernier. Au commencement de juillet les feuilles extérieures avoient acquis toute leur croissance. J'essayai d'en donner aux chevaux & aux vaches, qui les mangèrent fort bien; mais

(194) AGRICULTURE.

les cochons les dévorèrent plutôt qu'ils ne les mangèrent. Ils en mangent encore journellement, & les préfèrent à tout autre plante ou racine qu'on puisse leur donner. L'effeuillement de la plante est une opération lente, & ennuyeuse. Je préfère de tondre les feuilles lorsque celles du dehors ont acquis tout leur développement : elles repoussent alors très-vite. Mon expérience est trop en petit pour être concluante, mais il me paroît qu'un acre de cette plante, bien réussie, doit entretenir vingt cochons depuis juillet en décembre.

On a vanté dernièrement une herbe comme la meilleure nourriture de la terre pour les vaches ; c'est l'herbe de la Caroline (*Carolina grass*). J'en ai semé une petite quantité dans mon jardin, au mois d'avril dernier ; elle est maintenant fort belle : le temps nous apprendra si cette plante est préférable à un grand nombre de celles que nous avons. On n'en a pas eu, je crois, jusqu'à présent en quantité suffisante pour faire l'essai en grand ; mais je pense, d'après la petite épreuve que j'ai faite, qu'il est fort aisé de la propager, en ayant soin de nettoyer bien le sol qu'on lui destine.

Education & engrais des bestiaux au moyen des nouvelles productions.

Les avantages de la culture des turneps pour les moutons & l'engrais des bestiaux, sont si

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (195)
généralement connus par l'usage, qu'il paroît superflu d'en parler. J'observerai cependant que le reproche qu'on a fait à cette racine d'altérer la qualité du lait des vaches, ne me paroît pas fondé. Pendant les deux derniers hivers, & les deux printemps, mes vaches ont principalement vécu de turneps, & leur beurre a paru préférable à celui d'autres vaches nourries au foin. Peut-être la différence entre mon expérience & celle des cultivateurs qui se plaignent de cet effet, vient-elle de ce que je fais voiturier & donner mes turneps dans les cours de la ferme, au lieu que mes voisins mettent leurs vaches dans les champs, où elles mangent de toutes fortes de mauvaises herbes qui y abondent faute de soins. Je suis porté à croire que la saveur désagréable du lait est due à ces herbes, & non à l'usage des turneps. Il faut aussi, sans doute, avoir soin de donner les turneps sains ; car des racines pourries, ou simplement altérées, peuvent en effet influer sur le goût du lait des vaches qui s'en nourrissent.

De toutes les productions connues, aucune, peut-être, n'égale la pomme de terre en utilité. On ne peut en quelque sorte exagérer les avantages de cette plante. Elle n'est pas seulement une ressource constante dans les familles aisées ; mais dans les temps de disette les pauvres s'en nourrissent presque uniquement. Je connois plusieurs familles pauvres de mon

voisinage qui pendant l'hiver dernier en mangeoient trois fois le jour avec un peu de sel, & sans un seul morceau de pain ni de viande. Ce n'est que depuis peu qu'on les cultive en grand pour l'usage des bestiaux; & je suis persuadé qu'il y auroit de l'avantage à en planter plus encore qu'on ne le fait, parce que nous manquons d'une nourriture de printemps suffisante pour le bétail.

Les cochons aiment beaucoup les pommes de terre. Ils peuvent s'en nourrir uniquement jusqu'au moment où ils sont prêts à engraisser; & alors, en leur continuant cette nourriture, on a soin de faire bouillir les patates, & de les mêler de farine de pois, ou d'orge. Un autre usage de cette racine dont on ne s'est, je crois, gueres avisé, & qui m'a très-bien réussi, c'est d'en nourrir les vaches à lait: cette nourriture conserve au lait, pendant la mauvaise saison, toute la qualité qu'il a pendant l'été. Rien ne convient mieux que les pommes de terre aux vaches dont on engraisse le veau pour le boucher. J'en ai engraisé quatre de cette manière, au printemps dernier, & je les ai vendus de 35 shellings à deux livres sterlings la piece, ce qui est le double de ce que j'avois jamais tiré d'un veau auparavant. L'année dernière, après avoir arraché mes pommes de terre, je mis, dans le champ, des veaux de six ou sept mois, qui s'accou-

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DÉP. 50 ANS. (197)

commodoient de celles qui restoient sur le terrain , aussi bien que les cochons , qui y étoient en même temps.

Je ne les ai pas éprouvées pour la nourriture des chevaux ; mais un particulier qui demeure en Irlande m'a assuré qu'elles lui remplacent l'avoine pour nourrir son cheval de chasse. Ce cheval se maintient gras , vigoureux , & plein d'ardeur , tout comme s'il mangeoit son faoul d'avoine.

*De la culture des pommes de terre , par la méthode la plus facile & la plus économique.
(Par le même).*

Depuis qu'il y a une demande générale des pommes de terre , soit pour la nourriture de l'homme soit pour l'entretien des animaux , elles sont devenues un objet d'attention & de soins pour tous les cultivateurs. Chacun s'est appliqué à en augmenter le produit , & en améliorer la qualité. Quant au produit , quelques personnes ont réussi au-delà même de leur attente.

En examinant les détails qu'on a publié sur cette culture , j'ai été frappé des frais énormes de quelques faiseurs d'expériences , & j'ai tenté une méthode moins dispendieuse , qui sans doute devoit produire des récoltes moins considérables , mais dont le profit , tout calcul fait , seroit plus grand. Voici le détail de cette

expérience faite dans le courant de l'année 1788.

Au mois de décembre 1787, je fis labourer un champ de deux acres qui passa l'hiver en jachère. En février je le fis herfer, puis couvrir de 40 charretées de fumier qui fut enterré tout de suite après. Au commencement d'avril je fis ouvrir des sillons à deux pieds huit pouces de distance, & dans la longueur du champ. J'y fis déposer les pommes de terre à la main, à la distance de 12 à 14 pouces. On les couvrit en refendant les intervalles avec une forte charrue. Les lignes plantées demeurèrent ainsi séparées par un sillon ouvert & profond. Le champ resta disposé de cette manière jusqu'à ce que les plantes eussent cinq à six pouces de haut.

Les mauvaises herbes commencèrent alors à se montrer en grand nombre. Je fis passer une petite charrue à une roue, aussi près des rangées qu'il étoit possible sans endommager les plantes. Cette opération laissa une arrête élevée dans le milieu des intervalles.

Le champ demeura dans cet état jusqu'à ce que les mauvaises herbes se fussent de nouveau extrêmement multipliées. Alors je fis passer la forte charrue entre les lignes pour refendre l'arrête, & jeter la terre à droite & à gauche. Cette opération butta mes pommes de terre fort exactement; & avant que les mauvaises herbes pussent se remonter, la fanne des

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (199)

pommes de terre avoit pris un tel accroissement que les lignes se touchoient, & que la totalité du champ offroit un coup-d'œil uniforme.

Le 20 octobre, lorsque les tiges furent flétries, je choisis un beau temps pour arracher les pommes de terre, de la manière suivante : une forte charrue, qui piquoit fort bas, descendoit par une ligne de la plantation & remontoit par une autre, ramenant à la surface la presque totalité des pommes de terre. Des femmes & des enfans suivoient avec des paniers, & ramassoient à mesure. Deux herbes à longues dents passoient ensuite sur le champ & découvroient celles qui pouvoient avoir échappé. Après cela je fis labourer & herfer, en sorte qu'il ne resta qu'un très-petit nombre de patates en terre.

Voici le détail exact des frais, du produit, & du profit net de ces deux acres.

La récolte fut de 750 bushels. La dixme payée en nature il reste 675 bushels qui, à un shelling par bushel, ou trois shillings par sac, font Liv. sterl. 33. 15.

F R A I S.

	Liv.	st.	Sch.
Labour d'automne	—	12.	—
Herfage en février	—	3.	—
40 charretées de fumier	4.	—	—
Frais pour l'étendre	—	2.	—
Labour pour enterrer le fumier	—	12.	—
Ouverture des sillons	—	6.	—

(200) AGRICULTURE.

Plantage des pommes de terre . —	6. —
Opération de les enterrer à la charrue	6. —
Achat des semences , 15 sacs à 3 shellings	2. 5. —
Opération de la petite charrue. —	6. —
Buttage des plantes	6. —
Arrachement , charriage , emma- gazinement ; trois chevaux , un homme & un petit garçon pen- dant 5 jours	1. 10. —
Un homme & une femme 5 jours —	7. 6.
Enfans	5. 9.
Rente d'une année.	2. 10. —

13. 7. 3.

Profit net sur deux acres Liv. st. 20. 7. 9.

Mais, pour tout compter , il faudroit charger la récolte de blé qui suit de 4 liv. sterl. au moins ; & cette somme ajoutée au profit net donneroit alors 12 liv. sterl. 3 shel. 10 d. par acre ; car il n'est pas douteux qu'il n'en eût coûté autant pour préparer un chaume d'orge aussi parfaitement pour le blé que la culture des pommes de terre le fait. (1).

(1) On peut nier cet avantage de la culture des pommes de terre , relativement au blé qui succède , depuis que les belles expériences d'Arthur Young ont mis hors de doute ce que beaucoup de gens soupçonnoient déjà , c'est que les pommes de terre sont une récolte épuisante. (Voyez le vol. I. d'Agriculture , pag. 429.) Il ne faut pas néanmoins se hâter de se prévenir contre une production qui a des avantages si grands & si évidens. (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (201)

Il faut observer cependant que la culture de cette racine ne pourroit pas être poussée beaucoup plus loin dans le but de vendre. La plupart des marchés en sont surchargés; & le prix en est tombé plus bas que cela ne sembloit devoir résulter de l'augmentation de la quantité. Depuis trois ou quatre ans le prix courant dans ce canton étoit de six shellings par sac (1), quelquefois plus; & je l'ai vu jusqu'à douze shellings. L'année dernière je n'en ai pas vendu un sac au-dessus de 3 shellings, & aujourd'hui je n'en trouverois pas même 2 shellings 6 d.

Il est donc d'une extrême importance d'examiner quelle est la valeur intrinsèque & réelle de cette racine pour le fermier qui la destine à nourrir son bétail depuis le moment de la récolte jusqu'en mai suivant, c'est-à-dire pendant sept mois de l'année. S'il se trouvoit que ce fût-là une méthode avantageuse, le fermier ne dépendroit pas de la ressource du marché qui est devenue très-précaire; car il ne faut point oublier que la pomme de terre est une denrée dont il faut nécessairement disposer dans les huit mois qui suivent sa récolte.

Mais la solution de cette question demande beaucoup de connoissances pratiques qu'on ne peut acquérir que par des expériences soignées. J'en suis maintenant occupé; & je nourris

(1) De 210 à 225 livres poids de marc. (R).

diverses especes de bestiaux avec des pommes de terre. J'espere donc pouvoir publier quelque chose d'exact là dessus.

En revenant sur l'expérience dont j'ai rendu compte ci-dessus, je ne vois pas qu'il y ait rien d'essentiel à y changer. Cependant je pense que si le labour d'automne étoit immédiatement suivi d'un second en croisant, & qui disposât le terrain en billons étroits, cela seroit avantageux, parce que la terre offre ainsi plus de surface, & par conséquent plus de prise aux influences fertilisantes de l'hiver. Je dois observer qu'en arrachant les pommes de terre à la charrue j'ai soin de faire ôter le coulter qui en endommageroit un grand nombre. Avec cette précaution l'on réussit si bien que je n'ai pas vu une seule pomme de terre gâtée par la charrue.

Mon principal objet dans cette méthode n'étoit pas d'obtenir le plus grand produit possible, mais la récolte la plus considérable qu'on pût atteindre, en nettoyant & améliorant le sol. Ceci étoit mon premier objet; & il n'est pas facile de trouver des procédés qui y aillent plus directement. Si je n'avois visé qu'à une forte récolte, j'aurois doublé le nombre des lignes, en ne laissant entr'elles que 16 pouces d'intervalle au lieu de 32. Le produit auroit été, sans doute, plus considérable; mais la

terre auroit perdu le bénéfice de l'opération de la houe à cheval. (1)

Depuis que j'ai écrit ceci, j'ai eu le plaisir de lire l'important Traité du Dr. Anderson sur cet objet. Ses procédés sont ingénieux, ses expériences exactes, & ses conclusions sont très-intéressantes. Ce fait, que le produit est en quelque sorte proportionné au poids de la semence, est une des découvertes les plus importantes de ce siècle (2), & je dois ajouter que

(1) Nous avons cultivé trois années de suite les pommes de terre, en les plantant & les terrant à la charrue. La distance qui nous paroît concilier le mieux la convenance de ne pas perdre du terrain, avec le très-grand avantage de la culture à la petite charrue, est de vingt-un pouces à 2 pieds, d'une ligne à l'autre. On obtient cette distance en plantant derrière la charrue, de trois raies l'une. Nous avons éprouvé que cet espace est très-suffisant pour le cheval. Celui-ci écrase, à la vérité quelques feuilles ou quelques tiges, mais il ne nous a pas paru que les plantes en souffrissent sensiblement. A cette distance, un seul trait de charrue, avec les oreilles égales, suffit à butter les plantes à droite & à gauche; & lorsqu'on a soin d'attendre que les tiges aient sept à huit pouces de haut, une seule culture est suffisante: le progrès des plantes est si rapide, après cette opération, qu'il devient bientôt impossible de la renouveler; les lignes se réunissent par les jets latéraux, & lorsque les plantes sont en pleine fleur, on diroit que la plantation s'est faite sans intervalles. (R)

(2) Il y a de l'exagération ici. Nous avons connois-

j'ai le plaisir de voir ces observations, en grande partie, confirmées par mon expérience.

J'ai planté quinze sacs dans une étendue de deux acres ; c'est environ un tiers de plus qu'on ne met d'ordinaire , & que je n'ai moi-même employé jamais. L'augmentation de produit fut non-seulement en raison de cette augmentation de semence, mais la grosseur des pommes de terre recueillies parut aussi proportionnée au volume des pommes de terre plantées. Elles étoient si belles, qu'on pendant quelque temps j'imaginai que l'on avoit fait une méprise dans le choix des semences.

Deux, d'entre les fortes que j'ai plantées, me venoient d'un ami de Londres, qui me les avoit recommandées comme les plus recherchées dans les marchés. L'une étoit les *kidney-potatoes* décrites par le Dr. Anderson : elles sont excellentes pour la table. L'autre sorte, dont j'ignore le nom, est ronde, blanche ou blonde : elle est également très-bonne. A la première année que je les plantai, je les recueillis exactement semblables aux semences ; mais à la seconde année elles furent, comme je viens de le dire, si améliorées que je ne savois comment m'en rendre compte. Il faut sans doute attribuer

sance d'une suite d'expériences dont les résultats contrariaient ceux du Dr. Anderson. Nous en parlerons. (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (205)

attribuer cet amendement au poids des semences. J'y avois fait une grande attention. Je n'en laissai planter aucune qui fût au-dessous du volume d'un gros œuf de poule. Celles qui étoient plus grosses se coupoient en deux, & les très-grosses en quatre.

Depuis trois ou quatre ans j'ai fait aussi quelques expériences pour cultiver les pommes de terre de graine. Mes résultats different beaucoup de ceux du Docteur. La première année j'ai eu quelques patates de la grosseur d'un œuf de poule, & je ne remarquai aucune variété de sortes. Je conservai les plus grosses pour les planter en avril suivant. En octobre on arracha leur produit avec soin. Elles étoient en général aussi grosses que celles qui étoient le résultat de la méthode ordinaire : plusieurs pesoient d'une demi livre à une livre, & au-dessus. Elles offroient cinq ou six variétés très-distinctes, non-seulement de la sorte primitive que j'avois semée, mais de toute autre sorte de pommes de terre à moi connues. Leur couleur, leur forme, leur consistance étoient différentes. Les unes étoient blanches, un peu jaunâtres, & d'une peau lisse ; d'autres d'un brun foncé ; d'autres rougeâtres. Quelques-unes avoient la peau rude, d'autres la peau unie. Il y avoit des plantes dans lesquelles les tubercules étoient isolés les uns des autres. Dans d'autres plantes ils étoient agglomérés au nom-

bre de dix ou douze , & réunis par une espèce de collet en une masse qui auroit rempli un demi-peck. Mais il y avoit une sorte qui l'emportoit sur toutes les autres en beauté ; elles étoient pour la plupart aussi grosses qu'un œuf d'oie , d'une peau fine , unie , jaunâtre , tachetée de cramoisi , d'une bonne consistance & d'un goût délicieux.

Les pommes de terre qui avoient produit les plantes dont j'avois pris la graine pour ces expériences , étoient de deux sortes distinctes , mais de deux sortes seulement. L'une étoit oblongue , blanche , & d'une forme peu commune , c'est-à-dire , renflée aux deux bouts , & mince dans le milieu , elle est bonne pour la table. L'autre sorte étoit d'un brun-rougeâtre , marbrée dans l'intérieur d'une couleur pourpre : c'est une sorte dont on fait usage pour nourrir les cochons , mais qui a peu de valeur pour l'usage de la table. Je n'en avois pas d'autre sorte dans le temps où je recueillis la graine dans un champ où elles avoient été plantées pêle-mêle (1).

(1) La culture des pommes de terre , de graine , est encore peu connue. Ceux qui l'ont essayée ont eu des résultats très-différens ; & c'est un objet intéressant à suivre. Voici ce que nous avons éprouvé. De la graine recueillie en Angleterre , en octobre 1793 , fut semée le 25 mars 1794 , en terre de jardin. Lorsque les plantes eurent cinq à six pouces de haut ;

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (207)

Le Dr. Anderson paroît douter que les variétés se produisent selon le système sexuel de Linnœus; mais il paroît certain, par le détail

c'est-à-dire le 2 juin, elles furent transplantées à un pied de distance en tout sens. Leurs racines chevelues portoient déjà des petits tubercules blancs comme de gros pois. Le 6 juillet elles furent buttées. Les plantes avoient alors un pied à quinze pouces de hauteur moyenné, & beaucoup de jets latéraux. Le 15 septembre, nous déterrâmes quelques-unes des pommes de terre, sans arracher les plantes. Leur grosseur moyenne étoit celle d'un œuf de pigeon. Les plantes avoient prodigieusement donné en herbe, elles traînoient dans tous les sens, & étoient extrêmement fleuries. Les fleurs étoient en général blanches, mais il y en avoit de violettes. Le 20 octobre, lorsque nous fîmes la récolte, il y avoit encore un grand nombre de fleurs. La récolte fut médiocre en quantité. Les pommes de terre étoient fort inégales en grosseur, mais très-semblables en forme, dans chacune des deux sortes : car il y avoit deux sortes bien distinctes. L'une, étoit en forme d'ellipsoïde régulier, d'un jaune pâle, d'une peau très-fine, pourvue d'un petit nombre d'yeux nullement enfoncés. L'autre sorte étoit d'un gris brun, d'une peau moins fine, d'une forme plus quarrée aux deux extrémités, & les yeux, plus nombreux, étoient aussi plus enfoncés. Les deux sortes varioient en grosseur depuis le volume d'une noisette jusqu'à la grosseur du poing. Les grises étoient veinées de rouge dans l'intérieur, d'une consistance visqueuse, & d'un goût médiocre. Les jaunes, qui étoient en beaucoup plus grand nombre, étoient d'un blanc de lait dans l'in-

(208) AGRICULTURE.

ci-dessus , qu'on peut obtenir des variétés par la graine , & probablement cela arrive par l'action de la poussière des étamines sur les fleurs

térieur , d'un grain fin , mais leur substance étoit compacte ; elles n'avoient ni le farineux , ni le visqueux de certaines patates. Leur goût étoit assez agréable ; un peu sucré ; mais suivi ordinairement d'une saveur légèrement acre qui prenoit à la gorge. — L'année suivante nous plantâmes les jaunes en plein champ , en écartant les petites & les moyennes. Elles furent semées à la charrue ; les lignes étoient contigues à une plantation considérable de grosses jaunes , traitées de même à tous égards. — Elles furent cultivées à la petite charrue. Elles s'élevèrent plus que les autres ; fleurirent en blanc & en violet ; (quoiqu'il n'y eût qu'une sorte) mais elles poussèrent moins en jets latéraux que le reste du champ. Les fleurs durèrent beaucoup plus long-temps ; car lorsque nous fîmes la récolte des jaunes ordinaires , le 30 septembre , les anglaises étoient encore en pleine fleur. — Nous les recueillîmes le 28. Elles étoient en général médiocres en grosseur ; & la récolte totale étoit à-peu-près de moitié plus faible que dans le même espace du reste du champ. Quelques-unes étoient très-grosses , d'autres , en grand nombre , n'étoient pas plus grosses que des noisettes. Elles avoient la même forme , la même couleur , la même finesse de peau que l'année précédente ; mais la consistance & le goût de toutes celles qui avoient acquis au moins la grosseur d'un œuf de pigeon , paroissent sensiblement améliorées. Elles étoient farineuses , d'une blancheur éclatante , d'un goût fin & agréable ; mais elles avoient retenu un peu de cette âcreté d'arrière-goût que nous leur avons remarquée. — Nous

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (209)

qui se trouvent à portée , comme on l'éprouve pour les choux , les carottes , les bettes , &c. (1)

observâmes en les arrachant , que les racines fibreuses étoient beaucoup plus longues & plus multipliées que dans les autres plantes qui donnoient plus en tubercules. — En 1796 nous plantâmes en plein champ , dans les mêmes circonstances , & avec les mêmes précautions , les plus belles de ces pommes de terre anglaises. Nous espérons qu'elles acquerroient leur pleine maturité , ou la perfection dont elles sont susceptibles , à la troisième année. Nous observâmes précisément les mêmes phénomènes que l'année précédente. Les plantes qui fleurissoient en violet , donnèrent des pommes de terre exactement semblables à celles des plantes qui fleurissoient en blanc. La floraison se prolongea aussi jusqu'au moment de la récolte qui fut médiocre en quantité , & de patates très-inégaies. La qualité des moyennes & des grosses étoit bonne ; les petites étoient visqueuses & acres. Il y a donc dans cette culture des mystères piquans à éclaircir. Il paroîtroit que c'est un moyen de se procurer des variétés nouvelles de cette production ; & qu'il faut plusieurs années avant que les patates aient acquis la qualité dont elles sont susceptibles ; mais le peu d'accord de certaines circonstances observées dans des expériences différentes , montre qu'il y a beaucoup à travailler sur cette matière. (R)

(1) Il demeure inexplicable , dans l'expérience de Mr. Wimpey , que des pommes de terre *toutes d'une même sorte* , aient donné cinq à six variétés distinctes ; à moins qu'on n'admette que les variétés peuvent ne se développer qu'à la seconde génération. Nous n'avons rien éprouvé de semblable. (R).

(210) AGRICULTURE.

Si l'on n'admet pas cette solution , il faut avoir recours aux *variations séminales* dans le sens primitif du mot , ce qui ne sauroit s'accorder avec les principes de la saine philosophie. Toute variation , même la plus légère , doit avoir une cause compétente.

Que les pois de toute espèce conservent leurs caractères distinctifs , quoique semés pêle-mêle , je le crois avec le Dr. Anderson ; mais que , comme il le dit , toutes les fèves soient dans le même cas , je ne le pense pas , & voici sur quoi je me fonde. En 1787 je semai un champ de la plupart des fèves de jardin connues. Elles furent disposées en lignes , à trois pieds de distance , dans l'ordre suivant : les *magazan* , les *white-blossom* , (à fleurs blanches) les *longpodded* , (à longues gouffes) les *sandwich* , les *roker* & les *windsor*. Après la récolte je fis battre d'abord les *magazan* & les *white-blossom* , & je trouvai , à ma grande surprise , que j'avois des espèces toutes nouvelles. Les *magazan* , au lieu d'être de leur couleur naturelle , étoient tachetées de noir & de blanc. Les *white-blossom* , au lieu d'être d'un noir brillant comme à l'ordinaire , étoient brunes , jaunes & noires ; & les unes & les autres étoient beaucoup plus grosses qu'à l'ordinaire. Les *long-podded* étoient d'une couleur assez semblable à ces dernières. — Voilà donc une preuve sans réplique que les fèves , certaines

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (211)
espèces du moins , sont sujettes aux variations féminales comme toute autre classe de plantes. J'affirme ici avec confiance , car l'expérience n'a pas été faite en petit. J'avois huit à dix sacs de ces fèves , & j'avois fait prix à l'avance avec un marchand de graines , à 5 shellings le bushel. Quand je vis cet accident je l'en prévins , & je fis manger mes fèves aux chevaux & aux cochons.

Il peut être utile d'observer ici que je n'éprouvai aucune perte par cet accident imprévu. Je m'assurai , par des expériences répétées , que les fèves nourrissent beaucoup mieux les chevaux que l'avoine , & à plus bas prix. Dans les deux dernières années , je me suis trouvé court d'avoine au printemps. Je l'ai remplacée par les féverolles. Un bushel de celles-ci , mêlées de paille hachée , équivaut pour l'usage à un sac d'avoine également mêlée de paille. J'ai même trouvé que donnée à cette proportion , les chevaux avoient plus d'ardeur , plus de force , & le poil plus beau que lorsqu'ils mangeoient de l'avoine. Si l'on estime les fèves à 40 shellings le quarter & l'avoine à 20 , l'entretien des chevaux coûte précisément le double en employant l'avoine ; & ils ne sont pas si bien tenus.

Je crois le Dr. Anderson très-fondé dans ce qu'il dit sur la maladie des pommes de terre ,

nommée *the curl* (1) : je ne doute pas que la maladie ne se communique ordinairement par les semences. Quant à la manière dont les semences se vicient, c'est une autre question, & l'on ne sauroit peut-être en donner de solution satisfaisante. Les individus du règne végétal, comme ceux du règne animal, peuvent encore s'altérer de plusieurs autres manières, après avoir été sains pendant une partie de leur existence ; sans parler de la communication des maladies par juxtaposition.

J'ai crû long-temps que la maladie du blé, nommée la nielle, ou le charbon, étoit occasionnée par les pluies longues dans le temps de la floraison. Je crois encore que c'est là la cause primitive de la maladie ; mais je suis bien convaincu que la maladie peut se propager, & se propage souvent par les semences. Je fis l'année dernière quelques expériences sur le blé niellé, espérant obtenir des résultats sur lesquels je pusse compter. Je semai partie d'un sillon au semoir, les lignes à un pied de distance, avec du blé sain. Je semai une seconde partie contigue avec du blé extrêmement attaqué de la

(1) La *frisolée* ou le *pivre* est une maladie dans laquelle la tige est d'un vert brun, les feuilles plissées, maigres, frisées, d'une texture irrégulière, & marquées de points jaunâtres près de la tige. On dit que les pommes de terre de plaine sont plus sujettes à cette maladie que celles des montagnes. (Voyez le Dict. de l'Abbé Rozier.) (R)

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (213)

nielle. Je l'avois lavé soigneusement auparavant, & j'avois écarté tous les grains qui surnageoient : le blé n'étoit plus noir du tout lorsqu'on le mit en terre. Enfin je semai le reste du sillon avec du blé niellé, sans préparation. Voici le résultat.

La récolte du blé sain fut belle & propre. La récolte du blé niellé, mais lavé, tenoit de la maladie : il y avoit environ un épi sur vingt qui étoit charbonné. La récolte de la troisième partie étoit extrêmement infectée de nielle : il y avoit à-peu-près autant de mauvais épis que de bons.

Comme les trois portions étoient dans le même terrain, semées le même jour, de la même manière, & soignées les unes comme les autres pendant la végétation, il paroît clair que du blé sain, produit du blé sain, dans une année favorable ; que du blé niellé, quoique lavé avec soin, retient une partie du principe de la maladie, & la communique à la récolte jusqu'à un certain point ; enfin que la semence niellée, & non lavée, produit du blé tellement niellé qu'il a très-peu de valeur.

Je pense qu'il peut en être ainsi des pommes de terre, & des autres végétaux. L'individu d'une race parfaitement saine peut se vicier par les influences de l'atmosphère, & communiquer sa foiblesse & ses maladies à toutes les générations suivantes.

Le moyen le plus sûr de se garantir de ce mal, c'est de suivre l'avis du Dr. Anderson, c'est-à-dire, de choisir, pour planter, les patates les plus belles, les plus saines & les mieux constituées. Il est probable qu'avec cette précaution on se garantiroit du *curl*. Le Docteur observe que les pommes de terre provenant des plantes qui avoient cette maladie sont toujours petites; j'ajoute qu'elles n'ont pas l'air sain, & un œil exercé ne sauroit s'y tromper

QUERIES OF MR. LEBLANC, &c. Questions de Mr. LEBLANC sur la culture des *Turnep-rooted-cabbages*, (choux-raves) avec les réponses de Sir THOMAS BREYER. (Mémoires de la Société de Bath.)

Q. Les choux-raves ne demandent-ils pas beaucoup plus de temps que les turneps avant d'être prêts à recevoir la culture à la houe?

R. Oui, environ trois semaines ou un mois.

Q. La culture à la houe n'est-elle pas conséquemment plus difficile & plus chère, parce que les mauvaises plantes ont pris le dessus?

R. Dans les années pluvieuses cette culture est certainement plus difficile. Lorsque la terre est préparée par une jachère, lorsque l'année est sèche, il y a peu de différence: je n'ai

PERFECTIONNEM. DE L'AGR. DEP. 50 ANS. (215)

Jamais payé plus cher pour cette culture que pour celle des turneps.

Q. La couleur de la plante étant plus foncée que celle du turnep, & plus difficile à distinguer de la moutarde (charlock) qui abonde d'ordinaire dans les champs préparés aux turneps & semés de bonne heure, n'est-ce pas là encore une circonstance qui rend le farclage plus difficile & plus cher ?

R. Mes ouvriers disent qu'ils les distinguent très-bien de la moutarde, & n'ont jamais rien demandé de plus pour cela.

Q. Combien de fois les farcle-t-on, & à quel prix ?

R. Ceci doit dépendre, jusqu'à un certain point, de l'année : on les farcle d'ordinaire deux fois, & il en coûte quatre shellings par acre pour la première culture, deux shellings pour la seconde.

Q. Les bergers ont objecté que la dureté de la racine pouvoit affecter les dents des moutons : est-ce une chose qui ait été observée ?

R. Comme je ne tiens pas des brebis pour élever, mais seulement des agneaux (que je vends gras, après qu'ils se sont nourris de choux-raves jusqu'à la fin du printemps, & que je n'ai jamais de bêtes à laine de plus de deux ans, je n'ai pas observé cette circonstance.

Q. Est-il difficile de faire manger les choux-raves sans que les moutons les salissent ?

(216) AGRICULTURE, &c.

R. Il n'y a aucune difficulté , en faisant suivre par des bêtes maigres les moutons qui sont à l'engrais ; mais s'il y en avoit , on les feroit suivre par des cochons , qui dévorent cette racine & s'en engraisent promptement.

CORRESPONDANCE.

Nous avons reçu la notice qu'on a bien voulu nous adresser , en date du 16 avril , concernant les expériences de Mr. de Palluel sur la chicorée sauvage en prairies. Il ne paroît pas que la culture de cette plante ait donné les avantages qu'on en espéroit : l'Abbé Rozier n'en fait aucune mention , & nous ne connoissons pas d'autres expériences directes qui tendent à en constater la valeur que celles qui sont consignées dans les Mémoires de la Société Royale d'Agriculture. Mais nous savons qu'on s'est occupé de cette plante , comme fourrage , en Angleterre , & nous aurons soin de rassembler ce qui s'est publié sur cette culture. Nous remercions de l'avis qui y est relatif , & nous prenons cette occasion pour prier nos abonnés de nous faire parvenir leurs idées , & de nous communiquer leurs doutes , toutes les fois qu'il s'en présentera l'occasion. On ne peut espérer l'avancement de la science que de la réunion des lumières.

Evaporation l'eau au niveau du Sol.			Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.			OBSERVATIONS Diverses.
C.	S.	2 h.	C. du S.	L. du S.	2 h.	
	Li. Dou.	Li. Dou.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	
N.	ou					
5	0. 0	0. 0	+ 8. 9	+ 8. 5	+ 8. 0	La sortie des raifins a été médiocre , mais ils ont beaucoup profité dans le courant du mois, & les vignes font, en général , belles; les provins de l'année surtout : il y a beaucoup de râme. On a commencé à donner la seconde façon dès le 15. On a fauché des luzernes dès le 20. Elles font fort belles , ainsi que les sain - foins & les trèfles. Les blés en terres fortes qui avoient souffert de l'hiver , ont prodigieusement tallé & profité par les playes. Ceux qui étoient beaux au mois d'avril font extrêmement versés. Les orges ont souffert dans quelques endroits des vers de hannetons. Les fruits à noyaux qui avoient foiblement noué, tombent en grande partie.
5	0. 2	0. 6	7. 3	8. 0	8. 5	
5	0. 2	0. 0	7. 5	8. 9	8. 9	
5	0. 3	0. 9	8. 3	9. 3	9. 5	
5	0. 3	0. 6	9. 0	9. 9	10. 3	
2	0. 3	0. 6	10. 3	9. 9	9. 3	
10	0. 0	0. 0	8. 0	8. 0	8. 0	
0	0. 0	0. 0	8. 0	7. 9	9. 0	
0	0. 0	0. 0	8. 3	9. 3	9. 9	
0	0. 2	0. 3	8. 9	9. 3	9. 5	
0	0. 3	0. 0	8. 5	9. 5	9. 3	
2	0. 3	0. 0	7. 9	9. 3	9. 5	
0	0. 2	0. 5	8. 9	10. 3	10. 3	
5	0. 2	0. 0	9. 3	10. 3	10. 3	
0	0. 2	0. 0	9. 5	10. 3	10. 5	
1	0. 3	0. 6	10. 5	11. 3	11. 5	
9	0. 4	0. 7	10. 5	11. 5	12. 0	
0	0. 3	0. 7	11. 3	12. 0	12. 5	
2	0. 5	1. 0	12. 0	12. 5	13. 0	
6	0. 6	1. 1	12. 5	13. 0	13. 3	
7	0. 8	1. 5	12. 9	13. 3	13. 5	
0	0. 7	1. 5	13. 9	13. 9	14. 0	
0	0. 9	1. 0	13. 5	13. 5	13. 5	
5	0. 6	1. 2	13. 0	13. 5	13. 9	
11	0. 7	1. 1	13. 3	13. 9	14. 3	
7	0. 8	1. 3	14. 0	14. 3	14. 5	
11	0. 5	1. 0	14. 0	14. 5	14. 9	
7	0. 6	0. 2	14. 3	14. 5	14. 9	
7	0. 6	1. 0	14. 5	14. 9	13. 0	
7	0. 11	0. 9	13. 9	13. 0	13. 0	
0	0. 2	0. 6	12. 0	13. 0	13. 0	
9	0. 6	1. 2				
Total. Moy.			+10.80	+11.32	+11.53	
5.5	10.6	18.1				

tude 46°. 15'. Longitude 15° 13". (de Tems) à l'Orient

OBSERVATIONS TERRESTRES.

n. re.	Therm. à 3 pouces en terre.				Ther. à 4 pieds en terr.	Ther. dans l'eau qui s'évapore au ni- veau du Sol.				d.
	L. du S.	2 h.	C. du S.	2 heu.	L. du S.	2 h.	C. du S.			
1. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	Li.	
6. 9	+ 9. 3	+ 9. 5	+ 9. 3	+ 9. 9	+ 9. 0	+ 9. 3	+ 9. 0		0	
9. 0	7. 3	18. 0	14. 5	9. 5	7. 3	17. 0	13. 5		0	
9. 5	7. 9	14. 0	12. 5	9. 5	7. 0	14. 5	12. 0		1	
9. 5	8. 9	17. 0	14. 3	9. 5	8. 5	16. 9	13. 5		0	
11. 3	10. 0	14. 0	13. 5	9. 5	10. 0	14. 9	13. 5		1	
7. 5	10. 3	11. 5	10. 0	9. 5	10. 3	11. 0	9. 5		0	
8. 5	8. 0	10. 9	10. 3	9. 5	8. 0	10. 9	10. 0		0	
11. 5	9. 3	13. 9	13. 0	9. 5	9. 5	13. 5	13. 0		0	
10. 9	8. 9	15. 5	14. 3	9. 5	8. 9	15. 3	13. 0		0	
10. 5	10. 0	19. 0	15. 3	9. 5	9. 5	18. 5	14. 0		0	
7. 3	9. 9	14. 5	11. 5	9. 5	9. 5	9. 5	10. 5		9	
9. 5	7. 3	15. 3	13. 9	9. 9	6. 9	15. 0	13. 3		9	
10. 5	9. 9	18. 3	14. 5	9. 9	9. 5	18. 0	14. 0		9	
10. 0	11. 0	19. 5	15. 0	10. 0	10. 5	19. 5	14. 0		9	
13. 5	10. 5	19. 9	17. 0	10. 3	10. 5	19. 9	16. 5		9	
14. 0	12. 5	21. 5	17. 9	10. 5	12. 3	20. 0	17. 0		9	
15. 9	11. 9	23. 5	20. 5	10. 9	11. 3	21. 0	18. 3		1	
16. 5	13. 0	25. 3	21. 5	11. 0	12. 0	22. 5	19. 0		1	
18. 3	14. 3	26. 0	23. 0	11. 0	13. 3	23. 5	20. 3		1	
16. 5	15. 3	26. 5	22. 5	11. 5	14. 0	23. 0	19. 5		1	
19. 0	15. 0	27. 0	23. 3	12. 3	13. 5	23. 9	19. 9		2	
19. 5	17. 9	28. 5	24. 5	12. 5	16. 3	25. 0	21. 5		2	
15. 0	17. 3	26. 9	22. 0	13. 0	16. 3	24. 0	19. 3		1	
16. 3	15. 5	26. 5	23. 0	13. 3	14. 0	23. 5	20. 3		1	
20. 5	16. 3	27. 3	25. 3	13. 9	15. 0	25. 0	22. 5			
18. 0	17. 9	27. 5	23. 0	14. 0	16. 0	25. 0	21. 5			
16. 5	17. 0	26. 3	21. 5	14. 3	15. 5	24. 5	20. 5			
18. 5	15. 0	27. 0	23. 5	14. 5	15. 0	25. 5	20. 5			
14. 5	17. 0	26. 3	19. 9	14. 5	15. 5	23. 5	18. 0			
10. 5	14. 5	19. 5	16. 5	14. 5	14. 0	19. 0	15. 3			
11. 9	12. 9	22. 5	19. 3	14. 5	12. 3	21. 5	17. 0			
13, 14	+12, 32	+20, 61	+17, 62	+11, 33	+11, 65	+19, 16	+16, 12			

9. le 15e. + 7, 5.

liser 19°. 40' & 19°. 35'.

M A I 1797.

Etat du Ciel.		Evaporation de la Terre.				Ther
		Le signe — indique que l'appareil a reçu de la pluie ou de la neige. Les deux zéros qu'il n'y a point eu d'évaporation.				du fol
C. du S.		Jours du Mois.	L. du S.	2 h.	C. du S.	L. du S.
			Li. Dou.	Li. Dou.	Li. Dou.	D. dix.
NO	Plu., id., couv.	1	—	—	0. 3	+ 7. 9
NO	Pl., nu., fol., cl.	2	0. 0	0. 3	0. 4	5. 5
SO	Sol., nu., pl.	3	0. 2	0. 7	—	3. 0
SO	Pl., nu., fol., nu.	4	—	1. 1	0. 6	6. 5
SO	Né., id., id.	5	0. 2	0. 8	0. 3	8. 3
SO	Nu., pl. id.	6	0. 2	—	—	10. 0
NO	Pl., id., id.	7	—	0. 5	—	7. 0
calme	Pl., couv., id.	8	—	0. 10	0. 4	10. 0
SO	Nu., fol., couv., pl.	9	0. 4	0. 6	0. 2	7. 3
SO	Nu., fol., pl.	10	—	1. 0	—	8. 3
SO	Sol., nu., pl.	11	0. 2	0. 8	—	6. 9
SO	Nu., fol., cl.	12	0. 6	0. 10	0. 5	4. 0
SO	Nu., id., pl.	13	—	0. 9	—	8. 3
NE	Pl., nu., fol., cl.	14	—	1. 5	0. 2	8. 5
NE	Nu., fol., nu.	15	0. 2	0. 11	0. 3	9. 0
NE	Nu., pl., nu.	16	0. 2	0. 10	0. 1	10. 3
SO	Sol., id., cl.	17	0. 2	0. 8	0. 2	7. 5
SO	Sol., id., cl.	18	0. 1	0. 6	0. 2	9. 0
SO	Sol., id., cl.	19	0. 1	0. 5	0. 2	10. 0
SO	Sol., id., cl.	20	0. 1	0. 5	0. 2	10. 3
SO	Sol., id., cl.	21	0. 1	0. 5	0. 3	11. 0
NE	Sol., id., nu.	22	0. 1	0. 4	0. 1	14. 3
calme	Plu., fol., id., id.	23	—	0. 8	0. 1	12. 5
calme	Sol., id., id.	24	0. 1	0. 4	0. 1	9. 3
SO	Sol., id., id.	25	0. 1	0. 3	0. 1	11. 0
SO	Sol., nu., tonn., nu.	26	0. 1	0. 4	0. 1	12. 5
SO	Sol., nu., tonn., pl., nu.	27	0. 1	0. 3	—	12. 3
SO	Sol., id., id.	28	0. 1	0. 8	0. 1	12. 0
SO	Sol., nu., pl. id.	29	0. 1	0. 4	—	12. 0
SO	Plu., id., fol. clair.	30	—	1. 0	0. 5	11. 0
SO	Sol., id., id.	31	0. 2	1. 4	0. 3	8. 9
		Total. Moy.				+ 9. 17
		3. 1 18. 8 4. 10				

o'. Ouest.

Température d'un Puits de 30 Pi

10°. Ouest.

Température d'un Puits de 30 Pi

Pour la déclinaison de la Bouffolle, au lieu

Observations Météorologiques faites à GENTHON, près de

IONS ATMOSPHERIQUES.

À l'ombre de terre en 80-pars.		Hygromètre. à cheveu.			Elec- tromè- tre.	Pluye ou neige en 24 heu.	Gelée blanche ou Roſe.		
h.	C. du S.	L. du S	2 h.	C. du S				L. S.	
dix.	D. dix.	Deg.	Deg.	Deg.	2 h.	li. Dou.			
1. 0	6. 0	75	83	87	—	2. 10	—	SO	SO
1. 3	9. 9	90	45	45	—	0. 7	—	NO	NO
1. 5	9. 0	82	48	88	—	1. 0	R.	SO	SO
1. 0	10. 3	84	50	52	—	1. 6	—	SO	SO
1. 9	13. 9	64	51	57	—	—	—	SO	SO
1. 9	5. 9	69	92	92	—	2. 6	—	SO	SO
1. 5	7. 0	96	90	96	—	8. 4	—	NO	NO
1. 3	11. 5	97	82	87	—	4. 2	—	SO	SO
1. 0	10. 3	96	66	68	—	0. 8	R.	SO	SO
1. 5	8. 3	93	53	78	3 1	2. 8	—	SO	SO
1. 5	6. 5	79	65	85	—	1. 11	—	SO	SO
1. 9	9. 9	93	52	63	—	—	R.	SO	SO
1. 5	8. 9	88	51	94	—	2. 4	—	SO	SO
1. 5	11. 3	98	67	67	—	3. 2	—	NE	NE
1. 5	13. 3	90	62	67	—	—	R.	NE	NE
1. 9	13. 9	95	62	71	3	0. 4	R.	NE	SO
1. 9	15. 0	96	50	58	—	—	R.	SO	SO
1. 0	16. 9	92	51	58	—	—	R.	SO	SO
1. 5	18. 0	86	52	61	—	—	R.	SO	SO
1. 0	18. 0	89	45	53	—	—	R.	SO	SO
1. 9	18. 5	85	51	58	—	—	R.	SO	SO
1. 5	17. 5	72	55	57	—	—	—	SO	calm
1. 9	14. 0	91	59	61	—	1. 0	—	NE	NE
1. 9	16. 3	89	59	63	—	—	R.	calme	calm
1. 0	19. 0	92	51	55	—	—	R.	calme	calm
1. 3	17. 5	86	51	75	—	—	R.	SO	SO
1. 3	16. 5	90	52	72	4	0. 9	R.	SO	SO
1. 5	18. 5	86	47	51	—	—	R.	SO	SO
1. 5	13. 0	72	51	80	—	1. 4	—	SO	SO
1. 3	11. 5	92	63	58	—	3. 2	—	SO	SO
1. 5	10. 5	73	50	60	—	—	R.	SO	SO
1999	+12,79	86,45	58,19	68,29	—	Total 38,3	—		

, à l'Observatoire de Genève, le 1er. 19°. 35'. le 15e. 19°.

ERRATA au Tableau d'AVRIL.

OBS

Jours du Mois.	Gelée blanche ou Noct.	Vent.	
		L. S.	2 h.
10	SO	SO	
7	NO	NO	
0	R. SO	SO	
6	SO	SO	
	SO	SO	
6	SO	SO	
4	NO	NO	
2	SO	SO	
8	R. SO	SO	
8	SO	SO	
	SO	SO	
	R. SO	SO	
	SO	SO	
	NE	NE	
	R. NE	NE	
	R. NE	SO	
	R. SO	SO	
	R. SO	SO	
	R. SO	SO	
	R. SO	SO	
	SO	calm	
	NE	NE	
	R. calme	calm	
	R. calme	calm	
	R. SO	SO	
	R. SO	SO	
	R. SO	SO	
	SO	SO	
	SO	SO	
	SO	SO	

Déclinaison de l'aiguille

15e. 19°.



A G R I C U L T U R E.

AGRICULTURE DE WILTSHIRE. District du Nord. (1)

LE sol inférieur, dans la plus grande partie de ce district, est composé d'une sorte de schistes, qu'on nomme dans le pays *Corn-grate*, & dont on se sert dans quelques endroits pour couvrir les maisons. La couche végétale qui repose sur cette masse de schistes est une terre calcaire, rougeâtre, mêlée de pierres irrégulières. Cette terre végétale est coupée par des veines de glaise bleuâtre, assez semblable à de la marne, mais qui n'est point suffisamment calcaire pour avoir un effet sensible comme engrais. Cette terre produit naturellement le thène, & la terre rougeâtre, l'orme. Celle-ci varie en fertilité, selon sa profondeur. Dans quelques endroits la terre est très-légère, dans d'autres elle a plus de consistance.

Il y a aussi une partie du district dont le sol inférieur est un gravier mêlé de coquilles : c'est la portion la plus productive du pays.

(1) Voyez le vol. II. d'Agriculture, pag. 149. (R)
Agriculture, Vol. 2. N°. 6. Juin 1797. R

Ce gravier réchauffe & dessèche la couche végétale, & donne de l'activité à la croissance des plantes. On trouve aussi quelques veines de sable.

Le canton est, en général froid, & peu propre aux productions hâtives du printemps. Les possessions sont plus divisées que dans la partie du Sud ; & cela est particulièrement vrai dans le voisinage des villes de fabriques.

Le district est presque tout enclos. Il n'y a plus qu'un petit nombre de champs communs, & quelques communaux. La partie la plus légère est destinée au labourage, mais tout ce qui est un peu argileux est en prairies closes. Parmi celles-ci, les pâturages du bord de l'Avon tiennent le premier rang. Les fromages de cette partie sont connus. Autrefois ils passaient pour des fromages de Gloucester-shire, mais aujourd'hui, ils ont plutôt une qualité supérieure. Il y a une émulation admirable dans leur fabrication ; & la réussite, presque égale, dans des terrains absolument différens, indique que les soins bien entendus ont encore plus d'influence sur la qualité des fromages que la nature de l'herbe dont les vaches se nourrissent.

Les neuf-dixièmes des fermes à laiterie sont pourvus de vaches à longues cornes, d'une grosse espèce, qui donne, dit-on, une plus grande quantité de fromage, qu'aucune autre race, & qui a l'avantage de s'engraïsser très-bien pour le bou-

cher. La quantité moyenne de fromage produite dans l'année , par une vache qui fait son veau en bonne saison, est de trois quintaux & demi ; & il y a des vaches qui en donnent jusqu'à cinq quintaux.

Les partisans des petites races objectent que trois de ces grosses vaches mangent autant que quatre petites, sans rendre plus , & qu'en conséquence l'avantage est pour les petites : 1^o. parce que les chances de mortalité ne sont pas si graves ; 2^o. parce que le poids des grosses vaches est nuisible aux terres humides & froides ; 3^o. parce qu'il leur faut deux ans de plus pour arriver à leur perfection. Enfin on objecte, encore contre cette race à longues cornes, que les bœufs sont mal faits , & de peu de valeur.

L'objection de la lenteur de l'accroissement a bien de la force , parce qu'elle détourne le fermier d'élever dans ses propres pâturages les bêtes qu'il destine à sa laiterie ; & cependant c'est une chose reconnue , que les bêtes élevées dans le pâturage où elles doivent rester , y réussissent mieux.

On a fait dernièrement plusieurs tentatives pour introduire dans le canton la race de Devonshire qui est plus petite , & qui , outre les avantages propres aux petites especes , a celui de s'engraïsser aisément , & d'avoir une viande excellente. Le grand objet , dans un canton

où l'industrie des fromages est si profitable ; c'est la quantité de lait que donnent les vaches. Les partisans de celles de Devonshire affirment , que trois de ces petites vaches donnant chacune autant de lait qu'une grosse , ne coûtent pas plus à nourrir que deux vaches à longues cornes : si cela étoit prouvé , la question seroit résolue.

Les cochons sont regardés comme une dépendance nécessaire d'une laiterie. On élève & on engraisse un grand nombre de ces animaux avec le petit lait mêlé de farine d'orge. Les pois ne sont plus autant employés à cet usage qu'ils l'étoient autrefois. La race que l'on préfère est croisée des blancs à longues oreilles avec les cochons d'Afrique ou cochons Negres.

On engraisse beaucoup de bêtes à cornes & de moutons dans ce district. Le gros bétail que l'on met à l'engrais n'est gueres que de vieilles vaches à longues cornes , & des bœufs du Devonshire. On les commence de bonne heure au printemps pour pouvoir , s'il est possible , les achever à l'herbe ; mais les plus grosses bêtes s'achèvent ordinairement dans l'étable avec du foin. On ne leur donne gueres du grain. On a introduit dernièrement , pour l'engrais , l'usage des pommes de terre cuites à la vapeur , & mêlées avec de la paille hachée. Bath compose une partie des bestiaux gras du canton , mais le plus grand nombre va à Smithfield.

Les moutons qu'on engraisse s'achètent aux foires d'octobre, & on les met sur des terres qui ne peuvent pas porter du gros bétail. Quelquefois on achète les brebis & les agneaux pour les engraisser ensemble l'été suivant. Les fermiers à laiteries qui engraissent des moutons s'en trouvent mal quelquefois ; parce que si au printemps les moutons ne sont pas gras, on les met à l'herbe au détriment des vaches ou de la récolte de foin.

On tient des brebis pour le parc, & pour élever. Le nombre des troupeaux destinés au parc est moins considérable qu'il ne l'étoit autrefois avant l'industrie des fromages.

Il y a beaucoup d'autres endroits dans le Royaume où le nombre des troupeaux a diminué, & cependant c'est un fait que la consommation du mouton a beaucoup augmenté en Angleterre. On ne peut guères expliquer ce fait qu'en admettant qu'on tue les moutons beaucoup plus jeunes qu'on ne faisoit autrefois, & cela est indubitable. Ce n'étoit qu'à quatre, cinq, & même six ans qu'on vendoit les moutons au boucher : aujourd'hui l'on tue les trois-quarts des moutons à deux ans. Les races qu'on avoit autrefois n'arrivoient pas assez promptement à leur grosseur pour qu'on pût tuer à cet âge ; mais le perfectionnement des races a été depuis quelque temps un objet particulier d'émulation, surtout en Leicester-shire, & les

(222) AGRICULTURE

succès qu'on a obtenus ont fourni de nouveaux moyens de subsistance au Royaume (1).

Deux races de brebis, très-différentes, conviennent selon l'objet qu'on se propose. Il faut, pour pâturer & parquer, une race légère & qui aime à marcher; pour engraisser il faut une race tranquille. Dans le district du Nord de Wiltshire on commence à adopter la race de Leicester-shire, qui est particulièrement propre à prendre la graisse de bonne heure.

Il n'y a gueres de grands communaux dans le district, mais on y trouve beaucoup de petits pâturages communs qui sont dans un état d'abandon absolu. L'agriculture des champs communs est très-défectueuse, comme elle l'est partout ailleurs; & il arrive souvent que des terrains qui font partie des plaines de champs communs s'afferment à un prix de moitié moindre que les champs enclos du voisinage. Le droit de parcours dans les communaux se compte en général pour rien dans l'estimation des propriétés territoriales.

Le district a éprouvé long-temps le très-grand inconvénient des mauvaises routes. Les chemins publics étoient impraticables; les traverses plus mauvaises encore, & les frais des chemins à

(1) L'auteur ne dit rien de l'augmentation du poids des individus, augmentation qui est jugée d'un quart depuis 1732, & qui sert aussi à expliquer le fait dont il s'occupe. (Voy. le vol. I. d'Agriculture, p. 322. (R)

faire pour la dépouille des champs décourageoient d'entreprendre des clôtures ; mais depuis quelques années il s'est fait plusieurs routes à Turnpikes (1) qui coupent le district, & l'on s'est piqué d'émulation pour améliorer les chemins qui tendent des villages à ces routes nouvelles ; on doit s'attendre maintenant à voir les clôtures se multiplier, car on sent généralement la nécessité de cette amélioration.

Celle des dessèchemens est fort pratiquée dans le district. Les aqueducs couverts se font en pierre ou en gravier. Les schistes qu'on trouve en abondance, sont extrêmement commodes pour les aqueducs. On fait ceux-ci ordinairement de dix pouces de large ; quelquefois en prismes, quelquefois en parallélepèdes : ceux-ci valent mieux.

Il y a une sorte de dessèchemens peu coûteux, & qui remplissent dit-on très-bien leur objet : voici comment ils se font.

On enlève un gazon. On perce ensuite verticalement avec une tarière de trois pouces de diamètre, à la profondeur requise. Si le sol est léger, ou que la terre s'éboule, on met des petites branches dans le trou pour empêcher qu'il ne se remplisse ; puis on remet le

(1) Les *turn pike - roads* sont des routes entreprises sous l'autorisation du Parlement, par des particuliers qui ont, en dédommagement de leurs frais, le droit de percevoir un impôt sur les voyageurs. (R)

gazon enlevé , mais en retournant l'herbe en-dessous. On multiplie ces trous autant que cela est nécessaire. — On les fait aussi quelquefois en cônes renversés , de trois pieds de profondeur & de neuf pouces d'ouverture , que l'on remplit de petites pierres.

Dans un terrain mouilleux & froid , la première de toutes les réparations doit être de dessécher. Les eaux stagnantes sont un poison pour la végétation ; & pour que le fumier puisse faire son effet , il faut commencer par débarrasser des eaux qui refroidissent le sol : les méthodes qui facilitent les desséchemens sont donc de la plus grande importance en agriculture.

Il y a deux grands obstacles aux améliorations de ce district. Le premier est la difficulté & les frais qu'entraînent les actes de clôture. Cet obstacle sera probablement bientôt levé pour tout le Royaume (1). Le second obstacle aux améliorations , c'est le grand nombre des moulins qui empêchent de disposer des eaux pour arroser les prés. Autrefois chaque manoir avoit son moulin pour la commodité des tenanciers d'alentour ; & on les a maintenant quoiqu'ils soyent peu occupés , & qu'avec les perfectionnemens modernes un tiers des moulins existans pût suffire au canton.

(1) Voy. le vol. I. d'Agriculture , pag. 313. (R)

ON PLOUGHS; AND PARTICULARLY
THE REV. MR. COOKE'S SWING PLOUGH.
Des charrues, & en particulier de la nou-
velle charrue sans roues de Mr. Cooke. Par
Mr. JAMES ADAM. (Mémoires de la Société
de Bath).

DANS la première section de mon troisième
essai, j'ai dit que le plus commun des instru-
mens d'agriculture, étoit aussi le plus impar-
fait; & que la charrue ne me paroïssoit bien
entendue ni dans son mécanisme, ni dans sa
construction. J'ai observé aussi, que la grande
diversité des charrues dans les trois Royaumes
démontroit l'imperfection de chacune d'elles;
car si l'une de ces charrues avoit un avantage
décidé sur toutes les autres, elle seroit deve-
nue d'un usage général dans toutes les terres
semblables (1).

(1) Ce raisonnement seroit bon si ce n'étoit pas la
routine qui conduit les laboureurs. Rien n'est mieux
démontré que la supériorité de la charrue de Norfolk;
& cependant l'on n'en adapte pas l'usage dans les au-
tres Provinces qui ont des terres parfaitement sem-
blables à celles où cette charrue fait des merveilles.
Pour propager les pratiques agricoles utiles, il fau-
droit commencer par donner aux paysans une éduca-
tion qui étendit leurs idées, ou il faudroit que les
observateurs maniaissent la charrue. (R).

Je disois souvent cela à mon ami Mr. Cooke , l'inventeur de l'admirable charrue à semer , & du cultivateur. Je le priai de s'occuper de cet objet ; & quelque temps après notre conversation , il me montra un modele , qui est celui dont j'ai parlé dans mon livre , & qui me parut promettre beaucoup. Je l'engageai à réfléchir aux moyens de le perfectionner ; & il l'a fait , à ce qu'il me paroît , avec beaucoup de succès. Il a fait couler en fer *des corps de charrues* qui consistent en une oreille régulièrement contournée , avec la partie qui doit garnir le sep du côté non labouré , & une cheville de fer pour unir le tout au soc. Ces pieces n'en forment qu'une. Cette combinaison de ces parties qui influent si essentiellement sur l'opération de la charrue , prévient la possibilité de l'altération des formes ou des proportions par les charrons de village. La grandeur du sep se trouve déterminée : il n'y a qu'à le garnir avec les pieces coulées (1).

Mr. Cooke fit adapter un de ces corps de

(1) Il semble d'abord que le poids de ces pieces en gueuse doit être un grand inconvénient ; mais il faut se rappeler que la résistance qu'éprouvent les charrues par la construction vicieuse & les frottemens superflus ; est plus fatigante pour les animaux que celle qui dépend du poids. Elle est d'ailleurs inutile , au lieu que , dans ce cas le poids produit au moins la solidité. (R)

charrue à une charrue simple (*swing-plough*) (1). Il y fit mettre un soc forgé, un coulter, & les pieces nécessaires en bois. Il essaya cette charrue dans une terre qui n'étoit ni forte ni légère : elle réussit fort bien ; mais cela ne me satisfaisoit pas, je voulois l'essayer dans les terres les plus pesantes & les plus tenaces que nous ayons en Angleterre, & qui sont en même temps mêlées de cailloux ; je priai donc Mr. Cooke de prendre deux ou trois de ces corps de charrues, & de venir passer quelques jours avec moi à la campagne. Notre premier essai réussit admirablement. Je fus si enchanté de la maniere dont mes deux *swing-ploughs* opéroient, que dès lors je n'en ai point employé d'autres dans mes fortes terres, & je puis dire que jamais plus

(1) La *swing-plough* est une charrue sans avant-train ou sans roues. Il y a des gens qui préfèrent encore la *swing-plough* à la charrue de Norfolk pour des terrains semblables ; & la *swing-plough* paroît avoir l'avantage dans les terres fortes. C'est une grande question, que nous discuterons une fois avec étendue, que la préférence à donner à la charrue simple sur la charrue à avant-train, en supposant les circonstances semblables, & la construction également parfaite. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour faire de l'ouvrage également bon avec la charrue simple, il faut un degré d'adresse supérieur dans le laboureur ; mais, cette adresse étant supposée, on peut atteindre avec la charrue simple à une perfection plus grande dans l'exécution des labours. (R)

parfait labour n'a été exécuté dans des terres aussi fortes.

Je pense que votre Société conviendra des qualités de cette charrue , quand j'observerai qu'elle n'exige que trois chevaux au lieu de quatre. J'avois constamment employé ce nombre dans mes champs , qui , non-seulement sont argileux & pierreux , mais en pente ; & je suis convaincu que dans les terres de force médiocre , & en plaine , deux chevaux suffiroient avec cette charrue pour tracer un sillon de sept à huit pouces de profondeur , (1) très-quarré , très-net , en retournant parfaitement la terre , & en la pulvérisant autant qu'une charrue puisse le faire.

Lorsqu'on trouve tant de qualités réunies dans une charrue simple , d'une construction extrêmement facile , ne seroit-il pas absurde de s'obstiner à employer la charrue à roues , avec quatre chevaux , pour faire ce que la *swing-plough* fait avec deux , ou tout au plus avec trois ? & cependant tel est l'empire de la coutume , ou du préjugé , que je vois autour de

(1) Cela peut paroître incroyable à ceux qui voyent la peine que six bœufs ont quelquefois , avec nos charrues imparfaites , à ouvrir un sillon de cette profondeur dans des terres de médiocre force ; mais il est certain que la perfection dans la construction d'une charrue produit des différences qui semblent miraculeuses. (R)

DES CHARRUES. (229)

moi tous les laboureurs qui traînent ces lourdes charrues à avant-train, du Herefordshire, & ne font souvent qu'égratigner la terre. Je n'exagère pas en affirmant qu'un grand nombre d'entr'eux ne laboure pas à trois pouces de profondeur (1). Il faut observer d'ailleurs que nos lourdes charrues ont des oreilles plates qui ne retournent pas le gazon, à moins que le laboureur ne penche sa charrue du côté de la terre non labourée. Dans cette position, la partie postérieure & inférieure de l'oreille glisse sous la bande déjà soulevée, & aide à la retourner complètement. Mais il y a un grand inconvénient à cette position de la charrue; c'est que les ailes (2) du soc ne sont plus de niveau. Le fond de la raie est coupé obliquement; la bande enlevée, au lieu d'être un parallépipède, devient un prisme, & le sol est labouré à des profondeurs inégales.

(1) Cela est très-croyable. Nous voyons (p. 85 du vol. II. d'Agriculture) que la moyenne de la profondeur des labours observés par A. Young sur une grande partie de l'Angleterre, est de quatre pouces anglais seulement. (R)

(2) Dans les focs plats, figurés en fer de lance, on nomme *les ailes* les deux parties latérales tranchantes qui ressemblent plutôt à des nageoires, & qui doivent être dans une position horizontale pour remplir l'office auquel on les destine : savoir de trancher le sol au fond de la raie. (R)

C'est assurément un grand défaut de nos charrues à roues ; mais ce n'est pas le seul ; car le plus habile laboureur , en entamant son sillon est obligé de parcourir un certain espace de terrain avant de pouvoir prendre assez de terre ; quand il approche du bout du champ le soc se relève peu-à-peu ; & enfin les deux extrémités de la piece se trouvent labourées moins profondément que le reste : ce qui est un inconvénient sensible de cette charrue (1). Mais ce

(1) Il y a ici une explication à donner pour faire bien comprendre la différence dont parle ici l'auteur dans l'opération des deux charrues , & relever en même temps ce qui n'est pas exact dans le texte. Pour qu'une charrue à avant-train *pique* ce qu'il faut , avec l'*entrure* qu'on lui a donnée , il faut qu'il y ait une roue dans la raie ouverte , & l'autre sur la terre non-labourée. Lorsqu'il n'y a point encore de raie ouverte , on est obligé d'augmenter l'entrure à la charrue : c'est-à-dire de diminuer l'angle que l'age fait avec l'horison. Malgré cette précaution , la première raie que l'on ouvre ainsi n'est jamais profonde ni quarrée : le soc pique trop brusquement , & le sep n'est pas dans une position horizontale. A la raie suivante , on diminue l'entrure , mais non pas tout-à-fait autant qu'on doit le faire à la troisième raie , parce que la première n'ayant pas toute la profondeur requise , n'abaisse pas suffisamment la roue qui s'y meut. Mais lorsqu'on laboure à *sillons relevés* (Voy. la note p. 161 du vol. I. d'Agriculture) il faut à chaque nouveau *sillon* qu'on entame , c'est-à-dire , lorsqu'on *enraie* , faire l'opération dont nous venons de parler. A la

qu'il y a de pis, c'est que dans les terres mouilleuses & poisseuses les roues se chargent tellement qu'elles ne peuvent plus tourner, & qu'il faut suspendre le labourage, lors même que la saison presse (1).

troisième raie il faut recommencer à donner toute l'entrure, parce que la première, qui devrait loger la roue, est presque comblée; & l'on conçoit combien ces variations continuelles, dans l'entrure à donner, sont fatigantes & retardent l'ouvrage: cependant elles sont indispensables, si l'on veut labourer à une profondeur uniforme. Mais il n'y a aucune raison pour que la charrue à roues entre moins lorsqu'on commence une raie ou qu'on approche du bout du champ, comme le dit l'auteur; à moins que l'on n'ait enlevé de la terre des bordures pour la charrier au milieu du champ, depuis assez peu de temps pour que les labours ne l'aient pas encore ramenée vers les bords, comme cela arrive toujours à la longue. Dans cette supposition, le soc a en effet plus de peine à entrer, parce que, pour maintenir la profondeur, il faut entamer de la terre plus dure, ce qui ne se fait que par un effort du laboureur; mais cet effort, dans ce cas, seroit également nécessaire pour la charrue simple, & avec un désavantage que l'on va sentir tout à-l'heure en suivant le texte. Il faudroit que ceux qui écrivent sur les charrues eussent beaucoup labouré eux-mêmes; car il y a mille petits détails qui échappent nécessairement à celui qui n'a pas tenu le manche de la charrue en observateur. (R)

(1) S'il s'agit de l'état des terres tenaces après les pluies, l'objection n'a pas de force, parce que, lorsqu'elles sont pleines d'eau on ne doit pas y mettre la

N'est-il pas étonnant , qu'avec ces défauts capitaux , la charrue à avant-train soit encore préférée dans cette province , & dans bien d'autres encore , où l'agriculture est cependant bonne , & qu'un instrument si léger & si utile que la *swing-plough* soit aussi négligé ? J'oserois affirmer que partout où l'on comparera , avec exactitude , le travail de la meilleure charrue à roues avec le travail de la charrue simple de Mr. Cooke , on donnera de beaucoup l'avantage à celle-ci.

Je ne prétends pas néanmoins que la *swing-plough* soit sans défauts. Je ne connois point de charrue qui n'en ait. Son défaut c'est d'être aisément jetée hors de la ligne par une pierre , ou par un faux pas du laboureur ; parce que celui-ci devant faire une pression uniforme sur les manches , force le soc à sortir si cette pression augmente tout-à-coup. Mais on remédie aisément à cette faute en arrêtant la charrue , & en reculant ensuite pour reprendre à la profondeur requise depuis l'endroit où le soc est sorti (1). Mais

charrue. S'il s'agit de terres fortes , habituellement mouilleuses , ces terres ne peuvent devenir arables qu'après avoir été desséchées. Il faut avouer cependant qu'on peut entrer un peu plutôt dans les terres fortes , après les pluies , avec la charrue simple. (R)

(1) Il faudroit s'étendre beaucoup plus que nous ne le pouvons dans une note pour faire bien comprendre le grand désavantage que la facilité de porter de

DES CHARRUES. (233)

Mais ce défaut n'est-il pas plus que compensé par la légèreté de l'attelage, la simplicité de l'attirail, la profondeur immédiate de la raie, le renversement complet de la terre, & enfin par l'avantage de tracer un fillon (1) net & quarré, de sept à huit pouces de profondeur, en terre forte, ce que je n'ai jamais vu exécuter par aucune de nos charrues à roues.

Je ne fais comment expliquer la prédilection ridicule que nos fermiers conservent pour ces charrues. J'ai employé les unes & les autres, en observant impartialement les résultats, & je donne, sans hésiter, la préférence à la charrue simple, excepté dans certains cas rares, comme lorsqu'il s'agit de rompre des prés ou des terrains très-durs, après de longues sécheresses, ou lorsqu'on veut labourer à une profondeur extraordinaire, comme Mr. Artbuthnot, qui labouroit à 18 pouces avec la char-

de la ligne, donne à la charrue simple : nous traiterons ce sujet là plus au long ; mais on conçoit que la ressource de faire retrograder la charrue toutes les fois qu'une pierre a fait sortir le soc, ne seroit pas admissible dans un terrain pierreux. (R)

(1) Il faut se rappeler que le mot *fillon* signifie également une raie ou trait de charrue, & une planche ou ~~billon~~ convexe, composé de 4, 6, 8 traits & davantage, selon les terres, ou la fantaisie des laboureurs. (R)

rue à roues de son invention que j'ai décrite dans mon premier volume.

Avant de quitter ce sujet, je dois observer que les ailes du soc de la *swing-plough* de Mr. Cook sont à-peu-près aussi larges que le talon du sep, enforte que le fond de la raie est complètement tranché, comme le côté l'est par le coultre, & qu'il ne reste qu'à soulever la bande de terre, & la renverser dans la raie ouverte.

Quelques vieux fermiers du canton, qui n'aiment pas les nouveautés, avouent qu'ils n'ont jamais vu faire autant d'ouvrage par un instrument si petit & si léger. Mon laboureur l'avoue de même.

Je me suis étendu un peu sur cet objet, parce que je vois que votre société s'est occupée du perfectionnement des charrues. Je ne prétends pas juger des charrues qui vous ont été présentées, parce que je ne les ai pas vues, non plus que l'ouvrage qu'elles ont fait; mais je vous demande la permission de faire quelques remarques sur l'expérience (1) telle que vous la rapportez dans vos mémoires.

D'abord, je pense que les épreuves comparatives devroient se faire entre les charrues de même genre, parce que les charrues à avant-

(1) Nous donnerons le détail de l'expérience à la fin de cet article. (R)

DES CHARRUES. (135)

train ne sont point destinées aux mêmes ouvrages que les charrues simples, & que chacune des deux charrues peut exécuter très-bien une tâche différente de l'autre. — En second lieu, j'observe que votre comité n'exigeoit qu'un sillon de quatre pouces de profondeur, ce qui ne me paroît pas une épreuve suffisante d'une charrue armée de deux coulteres & attelée de six bœufs. J'avoue que je n'aurois pas crû qu'avec un appareil si formidable, on dût exiger moins de huit pouces de profondeur, quelle que fût la qualité du sol. L'exécution est à la vérité très-rapide; & je ne doute pas que l'ouvrage ne fût bien fait, puisqu'il eut l'approbation du comité; mais je répète que la tâche n'étoit pas proportionnée à l'instrument, ou, en d'autres termes, que cette charrue n'étoit pas faite pour un sillon de quatre pouces.

Quant à la petite charrue simple de Mr. Thomas, il me paroît extrêmement singulier, qu'attelée de quatre petits bœufs, elle ne pût pas faire un ouvrage aussi facile que l'est un sillon de quatre pouces, & qu'on fût obligé d'ajouter un cheval à l'attelage. Cela me fait soupçonner quelque vice dans la construction de la charrue.

La petite roue, sous l'âge de la charrue du fermier Sully, ôteroit à cet instrument de labourage les qualités de la charrue simple (1),

(1) La simple addition d'une roue sous la perche ou

fans en faire une bonne charrue à avant-train. La roue doit rendre , ainsi que je l'ai déjà dit , cette charrue inutile , dans les terrains mouilleux & tenaces.

(La société remercie Mr. Adams de la description de la charrue nouvelle, qui semble pouvoir être utile. Quant aux observations qu'il fait sur l'épreuve publique des charrues pour les prix proposés , la société présume que s'il eût été présent à l'expérience , & eût pu juger de la dureté d'un vieux pâturage de terre argileuse qu'il s'agissoit de rompre , après une gelée , il n'auroit pas trouvé qu'un sillon de quatre pouces ne fût pas assez pour une charrue à deux coulteres attelée de six bœufs. L'obligation d'ajouter un cheval à quatre bœufs pour une charrue légère & simple , prouve beaucoup en faveur de la charrue à roues. (Note de la société de Bath.)

l'âge de la charrue , change les qualités essentielles de l'instrument. Le laboureur manioit un levier du premier genre , dont le talon du sep étoit le point d'appui , maintenant il manie un levier du second genre dont le point d'appui est sur la roue. Il levoit les manches pour faire *piquer* le soc , & les baissoit pour le faire sortir : maintenant c'est le contraire. Mais pour un autre emploi que pour l'office de houe , ou pour rompre un terrain uni , la charrue à une roue est essentiellement défectueuse : nous en dirons les raisons en traitant de la charrue en général. (R)

REPORT RESPECTING THE TRIALS
OF PLOUGHS. &c. Rapport sur les expériences
des charrues faites au mois de Mars 1788.
(Société de Bath.)

EN conséquence de la proposition des prix pour déterminer quelle est la charrue la plus économique & la meilleure pour la pratique ordinaire du labourage, dans cette partie du Royaume, le Comité a choisi, dans le voisinage de Bath, un vieux pâturage de forte terre, comme une pièce propre à cette expérience.

Les candidats qui se présenterent pour concourir aux prix furent les suivans :

1°. JOHN BELLINGSLEY Esq. d'*Ashwick Grove*, avec une charrue à deux coulteres, attelée de six bœufs portant des jougs.

2°. Mr. HENRY WAGG, de *Chilcompton*, avec la charrue à roue de Norfolk, à un seul manche, attelée de deux chevaux de front, & sans aide.

3°. Mr. JOHN THOMAS, de *Keynsham*, avec une *swing-plough* légère, perfectionnée par lui-même, & attelée de quatre petits bœufs de Galles portant des jougs.

4°. Mr. SULLY, fermier de *Midford*, avec

une charrue simple de sa province, mais modifiée par une petite roue placée sous l'age, & sur la même ligne que le coulter. Cette charrue est attelée de trois chevaux de file.

5. M. GEORGE FLOWER, de *Midford*, avec une charrue simple dont on se sert communément dans sa province, & attelée de trois chevaux de file.

6. Lord WEYMOUTH, avec une charrue simple, qu'on emploie en Wiltshire, attelée de trois chevaux, dont un en flèche.

Six espaces, d'un acre chacun, situés parallèlement les uns aux autres, furent destinés aux six candidats. Tous devoient commencer ensemble, & travailler comme ils l'entendroient; mais ils devoient s'astreindre à piquer de quatre pouces, autant qu'il seroit possible, & à prendre une bande de huit pouces de large.

Mr. Wagg ayant essayé d'ouvrir un sillon ne jugea pas pouvoir entrer en lice avec la charrue de Norfolk, soit parce qu'elle n'avoit qu'un manche, soit parce que son laboureur n'étoit pas accoutumé à rompre des prés de terre forte.

Mr. Fowler, trouvant sa charrue mal construite, refusa également de concourir à l'épreuve; ainsi il ne resta que quatre concurrents qui commencèrent ensemble. Avant que l'on pût former un jugement sur le résultat probable de l'expérience, la charrue de Lord Weymouth se rompit contre un fragment de roc;

enforte que le nombre des prétendants fut réduit à trois.

Au bout de trois heures , quatre minutes , la charrue de Mr. Billingley avoit achevé son lot. Au bout de cinq heures , cinq minutes , Mr. Sully avoit fini ; & Mr. Thomas mit cinq heures & demi à labourer son espace. Celui-ci en laboura à-peu-près la moitié avec ses quatre petits bœufs ; mais comme ceux-ci se fatiguoient trop , il y ajouta un cheval pour faire le reste. Le Comité des juges étoit formé de cinq cultivateurs-pratiques , dont trois de Wilts , un de Sommerfet , & un de Gloucestershire.

Après un examen exact & comparatif de la bonté du travail , la majorité des juges donna la préférence à la charrue à deux coulteres , pour l'usage ordinaire des labours ; parce qu'elle renversoit plus complètement le gazon , & prévenoit ainsi plus efficacement la végétation de l'herbe dans l'intervalle des bandes retournées. La charrue simple de Mr. John Thomas n'avoit pas fait un ouvrage si égal. Le défaut d'une roue avoit empêché que les sillons ne fussent réguliers en profondeur & en largeur (1). Le labour avoit donc quelque infé-

(1) C'étoit plutôt le défaut d'adresse dans le laboureur , parce que cette charrue en demande beaucoup ; & c'étoit aussi parce qu'une telle charrue n'est pas faite pour rompre de vieux pâturages sur la glaise :

(240) A G R I C U L T U R E .

riorité sur celui de la charrue à cheval ; mais il auroit probablement été très-bon , si la profondeur eût été réglée par une roue , car l'oreille tournoit & renversoit admirablement la terre. M. Thomas fut donc encouragé à suivre au perfectionnement d'une charrue qui promettoit une grande utilité pour les terres en plaine , & des attelages de bœufs. Il assura le Comité que le même laboureur avoit fait , avec cette charrue , & les mêmes bœufs , un acre dans trois heures & quarante minutes , sur une jachère d'été.

Les prix furent distribués comme suit :

Le premier prix de six guinées à Mr. Dillingsley , avec une guinée pour son laboureur.

Le second prix de quatre guinées à Mr. Sully , avec une demi-guinée pour son laboureur.

Le troisième prix de deux guinées à Mr. Thomas , avec une redingotte pour son laboureur.

La supériorité de la charrue à deux coulteres fut si évidente pour les spectateurs , que plusieurs particuliers ont résolu , en conséquence de cette épreuve , d'adopter cet instrument , ainsi que l'usage des bœufs. Six ou sept charrues de cette espèce furent immédiatement

mais dire qu'il lui manquoit une roue , c'est à-peu-près comme si l'on disoit , en observant la marche d'une chaise de poste , qu'elle fatigue le porteur , parce qu'elle manque d'un avant-train : si elle en avoit un , elle ne seroit plus une chaise de poste. (R)

DES LAINES ET DES TROUPEAUX. (241)

commandées. Un des témoins de ce concours, qui occupe plusieurs fermes considérables, fut déterminé à échanger ses six chevaux & les deux charrues qu'il tenoit sur l'une de ces fermes, contre six bœufs & une charrue à double coulter; persuadé qu'il étoit que cet attelage suffiroit à tout l'ouvrage. Ainsi la société a le plaisir de penser, qu'en continuant des épreuves publiques de ce genre, elle réussira à introduire l'usage des meilleurs instrumens & à diminuer les frais d'exploitation.

ON WOOL, SHEEP, &c. Des laines, & des troupeaux. Par C. ONSLEY d'Essex. (Mémoires de la Société de Bath).

LA prime proposée par la Société de Bath dans le but de s'assurer, par voie d'expériences, quelle est la race de brebis la meilleure, à-la-fois, *pour la chair*. (1) & *pour la laine*, est parfaitement bien imaginée. Ces deux objets nous sont également importants : l'un comme augmentant la quantité de nourriture pour la subsis-

(1) Le mot *carcasse* signifie à la fois la grosseur, la qualité de la chair, la quantité de suif, enfin tout ce qui, indépendamment de la laine, donne du prix aux moutons. (R)

tance du peuple , l'autre comme fournissant les moyens de l'accroître par l'industrie. Lorsqu'on ne songe qu'à l'un des deux objets , on recherche les énormes moutons à laine grossière , & alors ces laines ne peuvent être employées qu'à des manufactures où la matière fait la moitié de la valeur de l'article ; ou bien l'on élève des petits moutons dont la laine sert à nos plus beaux draps. Cette belle laine vaut une demi-couronne lorsqu'elle est bien choisie. Ici ce sont les plus misérables moutons , ceux qui vivent sur les communaux les plus secs , qui la donnent. L'étendue de leur parcours , la rareté & qualité de leur nourriture , rendent leur laine plus belle , mais moins abondante.

Cependant , permettre (comme on le fait encore en dépit de nos progrès dans l'agriculture) que des communaux immenses fournissent à un petit nombre de brebis , une maigre nourriture à force de parcours , pour avoir des laines de première qualité , c'est soutenir la réputation de nos draps aux dépens de notre population. C'est à un prix semblable que l'Espagne achète la renommée de ses troupeaux : cette politique n'est pas à envier. Il est évident que nos draps larges ont perdu en qualité , & que nos draps étroits ont gagné dans la proportion. Cela est dû probablement à l'augmentation de ces pâturages qui nourrissent un beaucoup plus grand nombre de moutons d'une

DES LAINES ET DES TROUPEAUX. (243)

laine un peu inférieure. Pour remédier à cette baisse dans la qualité de nos draps , on mêle , dans leur fabrication , une trop grande quantité de laines Espagnoles : celles-ci soutiennent la finesse , mais le tissu est moins fort qu'il ne l'étoit avant cette addition.

Depuis les clôtures faites en Norfolk & Suffolk pour convertir les communaux incultes en champs de blé , d'orge , de turneps , &c. La qualité des laines a diminué dans ces provinces ; mais cette perte est amplement compensée par la plus grande quantité qu'elles en fournissent , & par les nombreux troupeaux qu'y entretient une agriculture excellente , soutenue à son tour par les troupeaux ; tandis que ceux-ci fournissent les marchés de viande pendant l'hiver. Les brebis de South-Down en Suffex , dont on a introduit dernièrement la race dans nos cantons , éprouveront les mêmes effets du changement de nourriture. Quelque avantageux que soit leur entretien pour le propriétaire & pour le public , comme l'on n'en sauroit douter d'après les expériences faites , cependant l'avantage des pâturages artificiels qui les nourrissent entraînera nécessairement une altération des laines , à moins qu'on ne tire annuellement un grand nombre d'individus des Downs même. Leur laine se vend dans ce canton , de 2 à 3 pence plus bas qu'en Suffex , & la même bête , à sa seconde année d'importation , ne

(244) AGRICULTURE.

donne pas une laine si fine qu'à la première.

J'ai appris d'un habile fabricant que l'on essaya, il y a quelques années, d'acclimater ici la race à longue laine de Lincolnshire, parce qu'on jugeoit les pâturages semblables. A la première tonte, les laines furent également belles ; à la seconde elles déclinerent : à la cinquième elles furent absolument dégénérées. On auroit pu entretenir la qualité des laines en tirant de nouveaux individus, & en croisant la race. On l'essaye maintenant avec les brebis de South-Down & de Norfolk. Le croisement promet une race qui donnera une assez belle laine, & beaucoup de viande d'excellente qualité. Cette race paroît aussi propre à soutenir le parc que la nourriture artificielle ; elle est plus grande que les South-Downs, & plus basse que les Norfolk ; elle a les os plus petits ; elle est d'une forme plus arondie, d'un caractère plus calme, & se nourrit mieux.

D'après les descriptions du *moniffon*, ou brebis sauvage de Tartarie (1) que quelques Naturalistes supposent la race primitive des brebis, celle de Norfolk paroît en approcher le plus. Une longue tête sèche, de grandes cornes recourbées, le dos arqué ; les jambes de devant droites ; celles de derrière pliées en dedans ; une

(1) Voyez l'histoire de l'*Argali*, ou brebis sauvage, par le Dr. Anderson, T. III de la Division Sciences & Arts, pag. 85. (R)

DES LAINES ET DES TROUPEAUX. (245)

construction forte & légère , un regard hardi & sauvage : tels sont ses caractéristiques. On n'avoit jamais essayé de perfectionner ni cette race , ni aucune autre , par le choix des individus , jusqu'au moment où la Société de Leicester étonna l'Angleterre , par son habileté dans une telle entreprise , & par le succès qu'elle obtint. Cet exemple a encouragé le public à des essais analogues ; & dans des cantons dont le sol & le climat seront mieux adaptés à la qualité des laines , on obtiendra celles-ci plus belles encore , avec les autres avantages qu'on peut attendre des bêtes à laine.

Il est certain que dans quelques climats on voit la finesse parfaite des laines réunie à la quantité. J'ai vu des toisons brutes apportées de Manille par un vaisseau de la Compagnie des Indes ; qui étoient dans ce genre. Un habile fabricant les acheta à huit shellings la livre ; & il reconnut si évidemment l'avantage de leur emploi , qu'il donna commission de lui procurer tout ce qu'on pourroit trouver de même qualité , à un prix plus haut encore.

Il vaut mieux mériter qu'obtenir les encouragemens du public. Le goût des recherches agricoles paroît s'être beaucoup propagé parmi les gentilshommes qui vivent à la campagne , & je pense qu'on le doit en grande partie aux écrits d'Arthur Young. On peut espérer que cet esprit de recherches produira des décou-

vertes avantageuses sur l'important objet des laines. L'industrie des pâturages est celle qui convient le mieux aux gentilshommes cultivateurs ; & les moutons sont préférables pour eux aux autres troupeaux. Le fermier le plus entendu dans les détails , est obligé , lorsqu'il a un troupeau de bêtes à laine , d'avoir un berger , & de s'en rapporter à lui sur plusieurs articles du profit de son troupeau. Le Gentilhomme est dans le même cas ; & s'il se borne à la culture des moutons , il a tout autant de moyens de se garantir des finesses , des fraudes , & d'éviter des non-valeurs , que peut en avoir le fermier lui-même. La partie de son domaine qu'il devra cultiver à la charrue pour avoir de la nourriture d'hiver , sera de peu d'étendue , & demandera peu d'avances. Les pâturages secs se gazonnent par le parcours & l'engrais des troupeaux ; on obtient de la laine de plus en plus fine ; & le sol sur lequel la race adoptée réussit le mieux , s'améliore par les bêtes à laine. On trouve ainsi le moyen le plus sûr de faire valoir avantageusement sa propriété ; & l'on est à portée de suivre des expériences très-intéressantes sur les races diverses d'un animal que le climat & la nourriture modifient prodigieusement.

C'est sans doute à l'accroissement de la population que l'on doit attribuer ce fait inquiétant qui a été constaté par les recherches récentes

DES LAINES ET DES TROUPEAUX. (247)

d'un comité du Parlement, savoir : que le Royaume ne fournit maintenant des grains que pour nourrir ses habitans. C'est donc une honte pour notre politique que de souffrir ces immenses communaux incultes, lors même que le pâturage y est passable, au lieu de les diviser, de les enclorre, de les soumettre à cette succession de récoltes qui entretiendrait des troupeaux tout aussi nombreux, & dont la laine, avec des soins, pourroit n'être pas inférieure. En même temps les terres, fumées au parc, donneroient plus de grains pour nourrir les individus occupés de la fabrication des laines.

Dans le Nord de l'Ecosse où le climat réduit la culture aux pâturages, nous pouvons espérer, des expériences bien entendues, de très-belles laines; mais on doit présumer en même temps que la chair des moutons & leur taille seront moins distinguées. En Angleterre, le climat & le sol nous permettent d'obtenir la perfection sous ces derniers rapports, & d'en approcher, relativement aux toisons. C'est donc là le but vers lequel doivent tendre les encouragemens & les efforts, parce que notre population, notre agriculture, & nos fabriques, y trouveront également leur avantage.

A N N O N C E S.

EXTRAIT d'une lettre de Mr. Thomas GOLDHAWK, sur un Blé nouveau, nommé *Hedge-wheat* (tirée des Annales D'ARTHUR YOUNG.)

.... J'AVOIS une raison particulière pour désirer de lire le rapport de Suffex. Je voulois voir s'il contenoit quelques observations sur une nouvelle sorte de blé découverte accidentellement dans une haie. Mr. Wood, de Suffex, a cultivé pendant quatre ans le blé provenant d'un seul épi, & y a mis tous les soins imaginables. Le produit a été étonnant. On connoît maintenant cette variété très-généralement en Surrey & en Suffex, & on la nomme *hedge-wheat* (blé de haie). Je doute qu'elle soit connue dans les autres Comtés. Je me suis informé avec soin de ce que l'on pense de sa valeur; & j'ai trouvé qu'on l'estime généralement autant, si ce n'est même plus, qu'aucune autre sorte de blé connu dans notre Isle: le temps confirmera ou détruira cette opinion. J'ai eu l'année dernière une forte preuve de sa supériorité. Mon beau-frère, Mr. J. Taylor, de Thorp en Surrey, en avoit semé un peu par voie d'essai. *Trente-sept gerbes* donnerent *vingt bushels & un peck* de très-beau grain. Dix javelles faisoient régulièrement un bushel. — Mr. Fladgate, de Crofslane, dans la paroisse de Woking, en avoit semé, la même année, quatre bushels, dans une terre fort médiocre. Ils lui rendirent douze *sacks* & un bushel, du plus beau grain que j'aie jamais vu.

TABLEAU des

OBSERVA

Jours du Mois.		Phases de la Lune.		BAROMÈTRE.						Th. à 4 div.		
				Lev. d Sol.		à heures.		Con. du Sol.		L. du S.		
				Pou.Li.Seiz.		Pou.Li.Seiz.		Pou.Li.Seiz.		D. dix.		
1	☾	27.	0.	8	26.10.	12	26.10.	12	+5.			
2		26.10.	11	—	10.	2	—	9.	6	13.	5	
3		—	8.	9	—	7.	13	—	8.	5	9.	5
4		—	9.	5	—	10.	4	—	10.	9	8.	5
5		—	8.	10	—	9.	0	—	10.	1	6.	5
6	☾	—	10.	10	—	10.	11	—	10.	15	6.	5
7		—	10.	9	—	9.	15	—	9.	15	7.	5
8		—	9.	4	—	8.	14	—	9.	0	7.	5
9		—	9.	2	—	8.	10	—	8.	7	6.	5
10		—	9.	2	—	9.	3	—	9.	4	5.	5
11	☾	—	9.	10	—	10.	7	—	11.	0	6.	5
12		—	10.	8	—	10.	3	—	9.	15	8.	5
13		—	9.	8	—	9.	1	—	9.	8	9.	5
14		—	9.	15	—	9.	15	—	10.	1	9.	5
15		—	10.	0	—	9.	14	—	9.	13	7.	5
16	☾	—	9.	15	—	10.	9	—	11.	7	10.	5
17		27.	0.	0	—	11.	5	—	11.	3	9.	5
18		26.11.	10	—	11.	6	—	11.	3	9.	5	
19		—	11.	2	—	10.	4	—	10.	5	9.	5
20		—	9.	13	—	8.	5	—	8.	4	9.	5
21	☾	—	8.	11	—	8.	10	—	8.	10	9.	5
22		—	8.	15	—	7.	6	—	8.	14	8.	5
23		—	9.	9	—	10.	1	—	11.	1	6.	5
24		27.	0.	2	—	11.	15	27.	0.	7	8.	5
25		—	0.	11	27.	0.	7	—	0.	3	11.	5
26	☾	—	0.	3	26.11.	3	26.11.	10	12.			
27		26.	9.	11	—	8.	8	—	7.	14	12.	
28		—	11.	7	27.	0.	7	27.	0.	3	9.	
29		—	11.	7	26.	9.	15	26.	9.	4	7.	
30		—	9.	3	—	10.	4	—	11.	5	9.	
Moyennes				26.10. 4,5	26. 9.15,6	26.10. 2,5	+ 8,					

Déclinaison de l'aiguille aim



A G R I C U L T U R E.

ON MANURES. DES ENGRAIS ; tiré du XV^{me} chapitre de l'esquisse du rapport général du Département d'Agriculture , sur l'état actuel de l'Agriculture de la Grande-Bretagne (1).

LE fumier des quadrupèdes est le plus commun , le plus utile des engrais , mais non pas , peut-être , celui dont la conduite est le mieux

(1) Voyez le vol. I. de l'Agriculture , pag. 35. — Les travaux du Département d'Agriculture , dont le Président avoit tracé le projet dès les premières Séances , sont maintenant assez avancés pour que nous puissions offrir à nos lecteurs des résultats précieux. Nous les tenons de la main même du Chevalier Sinclair, le Président & le Promoteur de cette belle institution , & si connu d'ailleurs par le génie & le patriotisme que décelent ses immenses recherches sur la statistique de l'Ecosse. Nous nous plaçons à annoncer à nos lecteurs qu'ils obtiendront aussi promptement qu'il est possible tout ce qui sera particulièrement intéressant & applicable , soit en faits , soit en principes , dans ce grand tableau de la culture Anglaise , & dans ce code des Agriculteurs dont la publication se prépare. Le célèbre Arthur Young, Secrétaire du Département , veut bien également favoriser notre impatience d'être instruits des détails. Le chapitre dont nous tirons cet article n'a point été publié : il

Agriculture. Vol. 2. N°. 7. Juillet 1797. M

entendue. Quelques réflexions sur les fautes que l'on fait le plus souvent, sur les principales propriétés du fumier, sur les moyens de le rassembler, de le conserver, de le faire fermenter, & d'en accroître la quantité, ne seront pas inutiles, avant que de nous occuper de l'emploi de cet engrais.

Lorsqu'on a rassemblé une certaine quantité de fumier d'étable ou de matières animales & végétales mêlées, & qu'il y a suffisamment de chaleur, d'humidité & d'air, la fermentation commence, & passe par tous les degrés d'une manière plus ou moins sensible, jusqu'à ce que cette opération de la nature soit terminée. Si, après cela, nous examinons la

fait partie de l'*Esquisse du Rapport général* projeté par le Département. Cette esquisse, ainsi qu'on en jugera par le soin avec lequel les articles sont traités, est déjà extrêmement étendue : c'est l'essence des faits & des principes contenus dans tous les rapports des Commissaires particuliers qui ont examiné de près la culture de chaque Canton, puis soumis leur travail aux observations des Membres du Département, & à tous les Agriculteurs du Royaume. Ce projet ou esquisse du Rapport général, n'est point encore arrêté : quelques parties sont plus avancées que d'autres : il circule encore pour des additions, des éclaircissements ou des corrections ; mais nous nous hâtons de faire partager à nos lecteurs l'avantage que nous devons à la bonne volonté des deux principaux Soutiens de cet admirable Etablissement. (R.)

DES ENGRAIS. (251)

masse, nous trouvons que les végétaux qui sont entrés dans la formation du fumier, sont décomposés, & réduits à leurs premiers principes. Ils sont alors prêts à rentrer dans la composition d'autres plantes. Ainsi se soutient la succession des individus; & la mort des uns fournit à la vie des autres.

Cela une fois entendu, l'on doit comprendre que plus la fermentation est complète, plus l'effet du fumier converti par elle en terreau doit être sensible sur le sol. C'est donc un objet de la première importance pour les cultivateurs que de disposer & conduire leurs fumiers de manière qu'ils fermentent complètement, & que les matières produites dans le tas par cette opération naturelle, y soient conservées dans l'état où elle les laisse. Cette attention améliore singulièrement les fumiers, & en augmente la quantité plus qu'on ne pourroit le croire.

Lorsque la fermentation a commencé dans un tas de fumier de matières animales, végétales ou mêlées de tous deux, la première altération sensible est un changement dans la couleur, & une diminution de volume. Le volume continue à décroître tant que la fermentation se prolonge, parce que les parties solides se rapprochent. L'acide aérien, & l'alkali volatil s'échappent en vapeurs; l'humidité descend au fond, & y séjourne si le tas est situé dans une cavité qui tiennent l'eau, ou s'écoule

si le tas est sur une pente. Cette eau qui s'échappe du fumier est imprégnée de sels fertilisants , & son effet est sensible sur les terres où on la répand.

Dans la manière dont l'on rassemble & prépare les fumiers , il est rare que l'on fasse attention à la position du tas , aux circonstances qui facilitent la fermentation , & à la conservation des sels lorsque la fermentation est achevée. Dans presque toute l'Angleterre , il est pénible d'observer combien l'on néglige cet objet important ; surtout dans les lieux qui , par leur situation , sont presque entièrement privés des autres moyens d'amendement. Cette négligence est évidente dans toute la partie Septentrionale du pays de Galles , dans les provinces de Cornouailles , de Westmoreland , de Cumberland , dans toutes les parties montueuses de l'Angleterre & de l'Ecosse. On établit le tas de fumier dans l'enclos de la ferme , sans examiner si la terre sur laquelle il repose retient l'eau , ou si les sucs ne s'écoulent point en pure perte.

Nous voyons les tas de fumier placés dans des creux , & noyés dans une eau qui ralentit la fermentation , ou exposés sur une pente , à un soleil qui les brûle , & les prive de l'humidité nécessaire pour que la fermentation ait lieu. Dans les deux cas , le fumier est rassemblé sans soin. Les chevaux , le bétail , les cochons , les

poules, passent dessus, le grattent, le dissipent, & les chars même le foulent souvent.

Ces procédés font que le fumier se ferre en une masse trop compacte pour que l'air puisse y pénétrer. Les bords s'étendent, se dessèchent; le vent en emporte une partie, & une autre redevient à-peu-près de la paille sèche. Enfin, lorsque le moment est venu de répandre le fumier sur les terres, on le conduit, sans examiner s'il a subi ou non la fermentation. Le centre du tas, qui étoit trop ferré n'a fermenté que d'une manière imparfaite, & les bords n'ont point fermenté du tout. Il est inutile d'ajouter que son effet est presque nul sur les terres.

Lorsque le tas est placé dans un creux & noyé, le fumier est tout aussi mauvais, si ce n'est plus mauvais encore. Les eaux des pluies qui séjournent à l'entour, le délavent & le refroidissent, de manière que la fermentation ne s'opère pas. Les sels fertilisans s'affoiblissent, & la masse soumise à l'analyse ne donne guères que de la terre végétale.

Lorsque le tas est placé sur une pente ou sur un terrain graveleux, la perte n'est pas moindre. Les sels qui s'échappent avec l'humidité produite par la fermentation, s'imbibent dans le sol, ou descendent sur le terrain que le fumier domine. Toutes les fois qu'il pleut, la masse est délavée, appauvrie de ses sels, &

demeure enfin dans un état assez semblable à celui du thé, après qu'il a servi à une infusion.

Enfin, lorsque le fumier est disposé sans soins, & que, comme nous l'avons dit ci-dessus, on le laisse fouler par les chars, par le bétail, & disperser par les poules, la fermentation est lente, seulement partielle, & le fumier, au lieu de contenir abondamment des substances riches, grasses & fécondantes, est, en grande partie, composé de substances dont l'action est très-foible sur la végétation. Ce sont cependant les fumiers situés sur un terrain de niveau, qui dans cette méthode défectueuse de les conduire, sont les moins mauvais.

Après avoir vu ce qu'on fait le plus souvent, voyons ce qu'il faudroit faire.

Deux choses sont essentiellement nécessaires à la fermentation du fumier d'étable, c'est l'air & l'humidité. Sans l'un & l'autre il n'y a point de fermentation; sans la juste proportion de tous deux, elle est incomplete.

Ceux qui sont accoutumés à préparer le fumier pour les couches, savent qu'il faut l'amonceler légèrement, & l'arroser un peu, pour le faire fermenter très-promptement. Ils savent aussi que quinze ou seize jours suffisent pour opérer dans ce fumier une fermentation aussi complete que six ou huit mois dans un fumier ordinaire de basse-cour.

Il convient donc d'imiter ce procédé d'aussi près que la situation de la ferme le permet ; & au lieu de placer le tas comme on le fait d'ordinaire , il faut choisir pour son emplacement un endroit suffisamment écarté , en ayant soin de rassembler les urines des écuries dans le voisinage du tas , afin qu'on puisse l'en arroser aisément , & faciliter ainsi la fermentation.

Lorsque la charrete amene le fumier au tas depuis l'écurie , il faut avoir soin que les pieds des chevaux & les roues ne passent point sur le tas , de peur de l'écraser trop , & d'empêcher que l'air n'y pénètre suffisamment. Cette opération se fait ordinairement d'une maniere absurde & cruelle. Le tas est disposé en pente , & l'on fait monter , à force de coups de fouet , les chevaux qui enfoncent jusqu'aux genoux & la charrete jusqu'aux essieux , usant ainsi les forces des animaux , & les harnois , dans l'espace de quelques toises , plus qu'on ne le feroit dans l'espace de plusieurs milles en trainant le même poids. Si l'on demande à quoi cela sert : le charretier vous répond que c'est pour mettre le fumier sur le haut du tas ; mais un homme le feroit en quelques minutes , & d'une maniere beaucoup plus avantageuse. Il faut décharger la charrete auprès du tas , & ensuite , avec une fourche de fer , jeter le fumier également & légèrement sur toute la surface : cette main-d'œuvre n'est rien , & l'avantage est très-grand.

Dans un tas formé de cette manière , s'il y a suffisamment d'humidité , la fermentation commence d'abord , & s'achève très-promp-
tement. Si le fumier est sec , il faut l'arroser. En
été , cela est fréquemment nécessaire dans les
grandes chaleurs. Avec ces procédés , six ou
sept semaines suffisent pour que la fermentation
soit complète (1) , & le fumier qui en résulte
se trouvera avoir un effet double de celui qui
a été fait avec la négligence ordinaire.

Pour faire de bon fumier & en quantité con-
sidérable , il faut placer le tas sur une base à-peu-
près de niveau , & qui retienne l'humidité. Il
faut l'entourer d'un mur de quatre à cinq pieds ,
en laissant une ouverture pour y entrer. Il
faut , s'il est possible , le couvrir ; & garnir le
fond de glaise , qu'on pave ensuite en pierres
plates. En dehors du mur , & du côté op-
posé à l'entrée , il faut pratiquer un réservoir
circulaire , pour recevoir par un trou l'humidité
qui découle du fumier , & qu'on retire ensuite
avec une pompe pour arroser le tas.

Le réservoir de l'eau de fumier doit être situé
à l'extrémité la plus basse. Le pavé doit avoir
un certain nombre de petits conduits dirigés

(1) Un Agriculteur très-intelligent , recommande
de ne mettre à un tas que ce qu'on peut rassembler
dans un mois. Au bout du mois , il faut retourner
& mêler le tas , puis le laisser un mois encore avant
de l'employer. (A)

& réunis du côté du réservoir ; & ces petits conduits doivent être garnis de branches avant qu'on entasse le fumier , afin qu'ils ne s'obstruent pas.

L'enclos destiné au fumier doit avoir ses plus longs côtés dans la direction de l'Est à l'Ouest. Le mur du côté du Sud doit s'élever jusqu'au toit , afin que les rayons du Soleil ne frappent jamais le fumier. La dépense d'un toit de chaume est peu considérable ; elle est bientôt retrouvée par la qualité supérieure de l'engrais ; & d'ailleurs, on peut faire servir ce toit à couvrir un colombier , ou une niche pour les outils légers de la campagne.

On doit sentir d'abord les avantages de cette disposition. Les murs empêchent que le fumier ne se disperse, & que les bords ne se dessèchent. Le couvert empêche qu'il ne soit délavé par les pluies. Le pavé sur la glaise empêche que les sucs ne se perdent dans la terre ; & les conduits rassemblent cette eau chargée de sels fécondans , au réservoir d'où on la puise à volonté pour la mettre dans des tonneaux & la transporter sur les terres , ou pour la rejeter sur le tas lui-même dont elle favorise singulièrement la fermentation.

On augmente la quantité du fumier produit , en profitant de cette eau qui s'en échappe pour en arroser le terrain , ou pour la répandre sur les tas de compost. On réussit également à

accroître la quantité des engrais en rassemblant les urines des écuries & des étables dans un tonneau , ou une citerne placée à une extrémité , & où elles découlent d'elles-mêmes par une rigole bien pavée.

Une autre maniere d'augmenter la quantité des fumiers c'est de ramasser les fientes des bestiaux dans les pâturages. Ces fientes , isolées comme elles le sont , n'ont aucun effet , & si l'on avoit soin de les recueillir en tas , le résultat , au bout de l'an , seroit très avantageux aux terres arables. Mais les substances que l'expérience a démontré augmenter le plus considérablement les fumiers sont les terres , les gazons , la tourbe , les raclures des chemins , & les dépôts des fossés. Cela se trouve dans toutes les fermes si l'on y fait l'attention convenable. Il y a deux manieres pour rendre ces substances utiles : la premiere est d'en former la base des fumiers , & de les laisser s'imprégner des fucs qui découlent du tas ; la seconde est d'en former des monceaux réguliers que l'on arrose de l'urine des animaux , & de l'eau des fumiers. Avec les soins nécessaires , ces substances deviennent égales en valeur aux fumiers les plus actifs & l'on peut doubler les engrais d'une ferme en donnant à cette partie l'attention convenable.

Si , de la maniere dont les fumiers se rassemblent & se préparent à la ferme , l'on passe à

examiner les procédés ordinairement suivis pour les répandre sur les champs , on les trouvera également absurdes & mal raisonnés. Il n'y a aucun engrais qui serve plus immédiatement d'aliment aux végétaux que le fumier d'étable ; & lorsqu'on l'applique aux plantes qui sont en pleine végétation , l'on voit prendre aussitôt à celle-ci une nouvelle activité qui se soutient pendant toute la saison. Mais si cela est ainsi , que doit-on penser de l'usage de répandre le meilleur fumier sur les terres en automne , pour y séjourner , mélangé avec le sol , jusqu'au moment où la végétation commencera , c'est-à-dire au printemps suivant. Si le champ est semé en blé ou en autres grains qui passent l'hiver en terre , la végétation sera stationnaire pendant toute la saison froide , & les plantes n'auront besoin d'aucune nourriture pendant tout ce temps-là : tout ce qu'on peut espérer c'est qu'elles prennent possession du sol , & affermissent leurs racines. Il vaut la peine d'examiner ce que devient le fumier , en attendant le moment où la végétation recommence. Les sels qui se sont formés dans la fermentation sont aisément dissolubles dans l'eau. Les pluies de l'automne & de l'hiver les dissolvent donc , & en emportent la plus grande partie. dans les couches inférieures , en sorte que , lorsqu'au printemps , les plantes auroient besoin des stimulans de l'engrais , ceux-ci ne sont plus

à leur portée, ou ont été très-affoiblis.

C'est là la première perte que l'on éprouve dans la pratique de fumer en automne, mais ce n'est pas le seul inconvénient. Dans les champs qui ont subi les labours des jachères, le terrain est ordinairement très-ameubli au moment où l'on sème. Le fumier contribue à le rendre plus meuble encore, en sorte que les racines des plantes ne sont pas suffisamment protégées contre les gelées, & qu'au printemps la terre est toute émiettée à la façon des taupinières. Ceux qui ont observé la culture du blé savent combien cet état du sol lui est défavorable. Si l'on gardoit, une partie du fumier pour le printemps, les racines seroient moins sujettes à être soulevées par les gelées. On étendrait le fumier sur le blé, dont la végétation prendroit immédiatement de l'activité, & seroit d'autant mieux entretenue que les pluies dissoudroient successivement, au profit des racines, les sels fécondant de l'engrais. Comme aucune de ces parties fertilisantes du fumier ne seroit perdue, une quantité beaucoup moindre suffiroit au même espace : le tiers, peut-être, de ce que l'on met ordinairement seroit assez; & il ne faudroit pas pour les charriages autant de temps & de peine qu'on pourroit d'abord le penser. Quand nous traiterons de la chaux, nous donnerons pour règle de mettre tout-à-la-fois la dose complete de cet engrais; mais pour le

fumier , il en est autrement. La chaux agit sur les molécules de la terre : il en faut une quantité notable pour que l'effet soit produit. Mais le fumier est une nourriture toute préparée pour les plantes ; si on l'applique dans la saison où les plantes ne végètent point , comme on le fait à l'ordinaire , pour le blé , ou que l'on en mette au printemps plus qu'il n'en faut pour nourrir les plantes , dans les deux cas il y en a une partie absolument perdue , parce qu'elle est délavée & entraînée par les pluies. Au contraire , lorsqu'on l'applique au printemps , il ne peut rien y avoir de perdu. A mesure que les pluies tombent , les sels fertilisans se communiquent aux racines , & l'aliment parvient à la plante par doses répétées , qui font sur elle le même effet que les repas sur les animaux.

On met souvent du fumier en automne sur les trefles. Cet usage est également absurde , soit que l'on se propose de laisser subsister le trefle l'année suivante , soit qu'on veuille le rompre pour semer du blé ou de l'avoine. Lorsqu'on veut laisser subsister le trefle , le fumier appliqué dans la saison où la plante ne végète pas , lui nuit essentiellement ; c'est une chose parfaitement reconnue , par expérience , quant au trefle. Il y a donc alors une double perte. Mais si l'on répand le fumier sur le trefle au printemps : une petite quantité est d'un grand

effet. Laissons expliquer aux théoristes comment la même substance qui nuit à la plante si on l'applique en automne, lui est fort utile si on l'applique au printemps. Le fait est certain (1).

Souvent l'on répand le fumier sur le trefle, & on l'enterre pour semer le blé après un seul labour. En parlant de l'usage de mettre la chaux sur les trefles pour semer de l'avoine, nous indiquerons la perte qu'on éprouve en l'enterrant à la charrue : il en est de même dans ce cas-ci. Si la récolte de trefle a été bonne, ou même passable, la bande prise par la charrue se souleve & se retourne tout-à-la-fois : le fumier est donc enterré à plat au-dessous, & il faut que les racines du blé percent cette croûte gazonnée pour parvenir à l'engrais, en supposant même que l'engrais reste dans son intégrité ; mais nous avons observé ci-dessus que les sels fertilisans sont emportés plus bas par les pluies d'hiver. Le mal est plus grand même, dans ce cas-ci, parce que du moins après la

(1) Dans tous les endroits où l'on peut se procurer du gypse à un prix modique, il n'est point douteux qu'on ne doive le préférer. Le fumier répandu au printemps sur le trefle a un grand inconvénient : c'est que, comme la pousse du trefle est très-rapide, après les premières pluies, on n'a pas le temps de rateler le fumier, qui, à la coupe de l'herbe, se trouve mêlé avec le foin, & rebute le bétail. (R)

lacher, le fumier est mélangé intimément avec la terre, & celle-ci en retient toujours quelques parties au profit des racines ; mais ici, les pluies le délavent avant que les racines du blé puissent l'atteindre. Si la bande de gazon que prend la charrue, se range sur le côté au lieu de se retourner, alors le fumier est tout rassemblé dans les intervalles des bandes où la pluie coule en plus grande abondance, parce que l'entremêlement des racines & le poli donné par l'oreille de la charrue l'empêchent de pénétrer aussi aisément dans le corps même de la bande prise par le soc. Pendant tout l'hiver, à chaque pluie, le fumier s'appauvrit de plus en plus, & au printemps, si on l'analysoit, on le trouveroit presque entièrement dépourvu de ses sels (1). Peut-être ne faudroit-il jamais

(1) Sans objecter au principe, observons ce qu'il peut y avoir d'exagéré dans le raisonnement. Ce qui seroit vrai, jusqu'à un certain point, pour une terre très-forte, qu'on auroit ainsi labourée en automne sans la semer ni la herse, n'est pas juste pour la très-grande pluralité des terrains, lors même qu'on ne les auroit pas hersés après la charrue ; parce que les gels & dégels détruisent bientôt cette adhérence occasionnée par les racines du trefle & la pression de l'oreille de la charrue, contre la bande appuyée, en sorte que la pluie pénètre dans cette bande tout aussi aisément que dans les intervalles. Mais lorsque l'on sème le blé sur un seul labour après le trefle, l'action de la herse, employée à recouvrir la semence, brise,

femer du blé après le tresse ; l'avoine seroit probablement une récolte plus profitable & qui laisseroit la terre en meilleur état ; mais si l'on sème du blé , il faut ne mettre le fumier qu'au printemps & par dessus. L'opération de la herse facilitera l'introduction des sels ; & il faut remarquer que les pluies , s'il en tombe , empêcheront moins cette opération sur les champs qui étoient en tresses l'année précédente que sur tout autre , parce que la terre , qui n'a reçu qu'un labour , a une consistance plus grande , & peut porter les charriots. Il n'y a que des pluies très-considérables qui puissent l'empêcher (1).

Les mêmes objections proposées contre l'usage d'enterrer le fumier en rompant le tresse pour femer du blé , sont applicables & avec plus de force encore , à cette même pratique , lorsqu'on fait succéder l'avoine au tresse ; car lorsque le tresse a été beau , on a la parfaite certitude d'avoir de très-belle avoine sans fumier (2). II

émiette , égalise la surface , & détruit cette adhérence de la terre dans les bandes appuyées ou retournées , avec d'autant plus de facilité , que les racines du tresse étant grosses , pivotantes & en petit nombre , lient très peu la terre. (R)

(1) Il y a beaucoup de terres qui ne pourroient supporter ce charriage du fumier dans le mois de Février ou Mars , lors même que la saison ne seroit point pluvieuse. (R)

(2) On peut en dire autant du blé : lorsque le tresse est beau , le blé qui lui succède l'est aussi , sans avoir été fumé. (R)

faut observer ici que l'avoine a moins besoin d'engrais que les autres grains. Nous voyons tous les jours des récoltes assez belles d'avoine, dans des terres sans engrais, & où aucun autre grain ne réussiroit. Mais si le terrain est appauvri, si l'on n'a pas d'usage plus utile à faire de son fumier, ce qu'on peut faire de mieux c'est de le répandre par-dessus le champ, après avoir semé l'avoine : la récolte alors en profite, & la terre en est améliorée ; au lieu que si on l'enterre il y a peu d'avantage.

L'application du fumier n'a jamais d'effet plus sensible que sur les turneps, & les pommes de terre ; & la principale raison de cette différence, c'est la saison où on l'employe. Le printemps est déjà avancé lorsqu'on plante les pommes de terre. Les pluies ne sont pas abondantes dans cette saison là, le fumier n'est donc pas délavé, & tous ses principes fertilisans sont employés au profit de la récolte. Pour les turneps, il en est à-peu-près de même ; & l'avantage est encore plus sensible, parce que ce n'est qu'en Juin que l'on répand le fumier, & que depuis ce moment là jusqu'en automne il ne tombe pas des pluies considérables.

Donnons maintenant quelques directions sur la séparation des fumiers d'une ferme, & quelques observations générales sur les diverses espèces de fumiers.

Il est important de ne point réunir en un
Agriculture. Vol. 2. N°. 7. Juillet 1797. N

seul tas tous les différens engrais d'une ferme ; parce que des substances de natures diverses , au lieu de former une agrégation utile , se nuisent réciproquement dans l'opération nécessaire de la fermentation. Nous conseillerions donc aux fermiers d'avoir au moins deux ou trois tas différens pour y disposer les matieres selon leur nature , la saison , & le temps où l'on se propose d'en faire usage.

Si l'on a de la terre , de la tourbe , ou des balayures de grands chemins , il faut en garnir la place destinée au fumier , dans une épaisseur de trois ou quatre pieds , avant de déposer le fumier d'étable. Cette méthode augmente considérablement les engrais. Pendant que la fermentation s'opere , les suc qui s'échappent pénètrent les substances qui servent de base au tas ; & lorsqu'ensuite le tas est retourné & brassé , ces matieres additionnelles se trouvent avoir acquis à-peu-près la même valeur que le fumier lui-même.

Il faut faire quelques distinctions entre les fumiers des animaux.

Le fumier de cheval est remarquable par la promptitude avec laquelle il fermente , & par sa force : avant sa fermentation , il peut être employé utilement pour les pommes de terre , parce qu'il maintient le sol dans un état qui permet aux racines de le pénétrer ; mais d'ailleurs , il ne faudroit jamais l'employer qu'a

DES ENGRAIS. (267)

près la fermentation, parce que, sans cela, il empoisonne le terrain par la quantité de mauvaises graines qui se sont trouvées dans le fourrage, & dont la digestion de l'animal n'a pas altéré le germe.

Le fumier des bêtes à cornes est le plus convenable pour les terrains maigres, légers & sablonneux. On le regarde comme plus utile pour les prés, où il porte une grande quantité de sucx animaux dont il se pénètre dans la longue mastication qu'il subit. Il seroit à désirer qu'on pût accélérer sa fermentation, qui est lente. La meilleure préparation pour ce fumier, c'est de le tenir arrosé jusqu'à ce qu'il soit bien pourri.

Le fumier de moutons est d'une excellente qualité. Nous en considérerons les effets en parlant du parc.

Le fumier de cochons est, si l'on en croit le Dr. Hunter, le plus riche de tous les engrais animaux. Il est d'une nature grasse & savonneuse, & lorsqu'on le mêle convenablement dans les composts, il est d'un grand effet sur les terres arables.

Le fumier de pigeons est riche; son effet est très-prompt, mais de courte durée, & il faut le renouveler souvent. Il est bon pour les terres fortes & froides. Il faut le menuiser, & le répandre en temps humide; si l'on peut herfer immédiatement après, ce n'en est que mieux.

Le fumier de volaille est de la même nature : Columelle le met au même rang pour l'effet.

Les excréments humains font un excellent fumier , & avec des soins convenables , on s'en procureroit une grande quantité. Il n'est pas douteux que les fermiers , s'ils apprécioient l'usage de cet engrais , ne cherchassent à l'employer. Il est si actif , qu'il ne doit pas être appliqué sans mélange , & en grande dose. Il conviendrait de jeter de temps en temps de la chaux dans les fosses d'aisance pour préparer cet engrais. La sciure de bois , la tourbe ou la terre , sont également utiles pour absorber les urines qui s'écouleraient inutilement. Lorsqu'on emploie la chaux en quantité suffisante , l'odeur des fosses d'aisance se dissipe tout-à-fait ; & le fumier qui en résulte est si sec , si friable , qu'on peut le répandre à la main sur les champs. On ne doit jamais employer ces excréments sans mélange , à cause de leur trop grande activité qui les rendrait nuisibles. Deux charretées de ce fumier , mêlé à dix charretées de terre & une de chaux , suffisent à couvrir suffisamment un acre de blé ou d'orge. Pour le blé , il faut répandre cet engrais au commencement du printemps ; & pour l'orge , il convient de le mettre en semant pour l'enterrer à la herse , ou lorsque la plante est encore très-jeune. Cet engrais est très-favorable aux récoltes semées au semoir.

L'urine de tous les animaux a beaucoup d'effet lorsqu'elle est répandue sur les prés , ou les jeunes plantes des champs , au printemps : elle ne manque jamais de produire alors une végétation hâtive & très-abondante. Il paroît cependant que la manière la plus convenable de l'employer est sous la forme de compost , avec la terre ou la tourbe & un peu de chaux. Ce mélange fait un bon engrais pour la plupart des terres , & surtout pour les terrains légers , sablonneux ou graveleux.

On pourroit employer une grande quantité des urines qui se perdent , & assurer une récolte ou deux à chaque fois qu'on appliqueroit cette substance comme nous venons de l'indiquer. Auprès des fermes , & dans les villes , on pourroit rassembler l'urine & les excréments dans des réservoirs , avec la plus grande facilité. C'est dans quelques pays un objet de police ; & on auroit peine à imaginer de quel avantage cela est pour le public. Les fermiers voisins emportent cette substance dans des tonneaux pour la répandre immédiatement sur les champs , ou pour en faire des mélanges avec de la terre & d'autres matières. Quel profit n'en résulteroit-il pas pour le Royaume si cet usage étoit généralement établi ?

Il y a plusieurs parties de l'Angleterre où l'on emploie les os comme engrais , soit seuls , soit avec d'autres substances. Le procédé ordi-

naire est de les passer sous la meule jusqu'à ce qu'ils soient réduits en petits fragmens , puis de les disposer dans les champs par petits montceaux recouverts de terre , jusqu'au moment de les répandre sur les jachères , sur les prés , ou dans les champs de turneps.

Les parties constituantes des os sont de l'huile , des sels alkalis , de la terre & de l'acide aérien. L'huile y est en beaucoup plus grande proportion que l'alkali. On s'inquiète peu du choix des terres sur lesquelles on les emploie , & souvent on applique cet engrais sans mélange. Les moindres notions de chimie démontrent l'imperfection de cette méthode ; car comme l'acide aérien est le lien de cette substance , il faut , ou que la terre sur laquelle on l'emploie ait un principe propre à dégager cet acide , ou que l'on mêle avec les os une substance qui ait ce principe , sans quoi ils restent en nature , & ne produisent que peu ou point d'effet.

Pour rendre les os utiles , comme engrais , il faut d'abord les piler ou les moudre très-menu : leur effet dépend beaucoup de cette première opération. Il faut ensuite employer une substance qui puisse déloger l'acide aérien , & désunir les parties constituantes des os. La chaux vive remplit très-bien l'objet , & les réduit en poudre. En traitant de la chaux , nous aurons occasion de remarquer la faculté qu'elle a d'absorber les huiles & les graisses :

cette faculté s'accroît par l'union de la chaux avec les alkalis, qu'elle rend caustiques en s'emparant de l'acide aérien.

Lorsqu'on employe les os sans préparation ni mélanges, on ne doit les mettre que sur les terres calcaires, crayeuses & graveleuses. La chaux qui se trouve dans ces terres, s'empare de l'acide aérien jusqu'à un certain point, & absorbe les huiles. Mais dans les glaises tenaces ou les luts gras, qui ne contiennent que peu ou point de substances calcaires, les os sont sans effet.

Lorsqu'on les emploie dans les composts, de la manière que nous l'avons indiqué, ils sont utiles pour tous les terrains; mais il faut observer dans l'application de ces composts la même règle prescrite pour l'emploi des fables d'écurie; c'est-à-dire, de ne les enterrer jamais à la charrue, mais de les répandre sur la surface, ou du moins de ne les recouvrir que très-légèrement; car l'effet des os, employés de cette manière, est beaucoup plus prompt que lorsqu'ils sont appliqués seuls, & la pluie leur ôte aussi beaucoup plus aisément leurs sels fertilisants que lorsqu'ils sont isolés. Il faut donc ne répandre cet engrais qu'en petite quantité, & seulement ce qui est nécessaire pour une récolte; il faut, enfin, ne jamais le répandre que sur la récolte même, un peu avant que la végétation commence, ou peu après qu'elle

a commencé. Pour le blé il vaut mieux ne pas herfer : pour l'orge on peut herfer sur l'engrais, immédiatement après avoir semé.

Quant aux récoltes semées au semoir, les os conviennent singulièrement, parce qu'on peut les répandre dans la raie même où l'on sème la graine plus aisément qu'aucun autre engrais. Nous avons déjà observé, en parlant du fumier d'étable, que moins l'on met d'engrais dans les intervalles des lignes semées, & mieux c'est, parce que ce fumier là ne sert qu'à nourrir les mauvaises herbes qu'on s'efforce de détruire.

Les substances animales en pourriture, lorsqu'on les applique seules, ne doivent être employées que sur les terrains les plus actifs & les plus chauds; mais sur les glaises froides il ne faut les appliquer que mêlées dans des composts.

La meilleure manière de préparer ces substances pour les convertir en engrais, est de les mêler avec de la chaux vive ou de la craie, par tas de trois ou quatre charretées, & de les recouvrir de terre. Après huit ou dix jours, le tas doit être retourné, & ensuite mêlé avec de la terre dans la proportion de dix charretées de celle-ci pour une du premier mélange. Ce compost doit rester un mois sans être touché, avant d'en faire usage. On ne doit jamais l'enterrer à la charrue, mais le répandre sur

la récolte au printemps, ou l'enterrer à la herse avec la semence. C'est un fort bon engrais pour le blé, & on peut également l'employer à la manière des os pour les récoltes au femoir. Dans toutes les grandes villes, on devroit mettre à profit, de cette manière, les restes des boucheries. En les réunissant en tas, & en les couvrant de chaux & de terre, on feroit une opération utile à l'agriculture, en même temps qu'à la salubrité de l'air.

Les débris, les coupons, les rognures de diverses fabriques peuvent s'employer pour engrais. Tous les débris de la laine, soit en poil soit en étoffes, sont utiles. Si ce sont des coupons ou des guenilles, il faut premièrement les hacher en petits morceaux d'un pouce ou deux en quarré, puis les répandre sur le sol & les enterrer à la charrue. Lorsqu'ils commencent à pourrir, ils retiennent la fraîcheur des pluies & des rosées dans les terres légères. Ces coupons coûtent, dans le voisinage de Londres, cinq à six shellings le quintal, qui suffit à un acre, en sorte que ce n'est pas un engrais cher, si l'on pouvoit aisément l'avoir en quantité suffisante. On s'en fert en Berkshire sur les blés & les trefles, & l'effet en est très-marqué dans les terres légères. On trouve le même avantage à employer les rognures de cuirs & de peaux, les cornes, &c, en général, tous les débris des substances animales.

Les gâteaux de colza ont été beaucoup employés comme engrais depuis quelques années , soit sur les jachères destinées au blé & à l'orge , soit pour les récoltes de turneps. La manière ordinaire de les préparer c'est de les briser au moulin , puis de les répandre à la main avant le dernier labour. Cette matière fait beaucoup d'effet ; mais il faut observer que comme le principe fertilisant de cet engrais est l'huile , il gagne beaucoup à être mélangé avec la chaux ou des sels alkalis. En mêlant six parties de gâteaux de colza sur une de chaux , on obtient un engrais très-actif & qui peut se semer à la main sur tous les terrains , avec avantage. Si on emploie ces gâteaux sans mélange , il ne faut les mettre que sur les terres légères & chaudes (1) ; dans les glaïfes froides , il faut

(1) Le célèbre Dr. Hunter , de York , dit que dans les environs d'Aberford , dans l'arrondissement de l'Ouest de Yorkshire , les fermiers emploient la poussière de Colza sur leurs blés & leurs orges , dans des terrains très-légers & de peu de fond , que l'on ne peut labourer que superficiellement. A la distance où ces fermiers sont des grandes villes , il leur seroit impossible de faire valoir leurs terres avec avantage , sans le secours de cette poussière de colza ; & le profit de cet engrais est si bien reconnu que , depuis vingt ans il a monté de dix shillings à dix-huit shillings le quarter , & qu'il monte encore. On en répand trois quarts par acre pour l'orge , & quatre pour le blé : on le sème à la main ; & on l'enterre avec la herse

l'addition de la chaux pour leur donner de l'activité. Les observations que nous avons faites ci-dessus relativement aux substances animales considérées comme engrais, s'appliquent également aux gâteaux de colza : il faut avoir soin de mêler la chaux avec cette matière huileuse, au moins dix jours avant que de s'en servir, & de remuer journellement le mélange. Il faut avoir grand soin de n'appliquer cette composition qu'à une récolte en végétation ; car à la première pluie les sels fertilisans se dissolvent, & sont absorbés par les plantes si elles végètent, ou entraînés inutilement dans les couches inférieures de la terre, s'il n'y a point de végétation, comme c'est le cas pendant l'hiver. C'est donc sur le blé du printemps qu'il faut le répandre. Pour les turneps & autres récoltes semées au semoir, on peut appliquer ce mê-

en semant le grain. S'il tombe de la pluie dans les huit ou dix jours qui suivent, la récolte est ordinairement bonne, mais s'il ne pleut pas dans cet intervalle, la récolte n'en est gueres meilleure, & la dépense de cet engrais ne profite pas même à la récolte suivante. On regarde l'emploi de cette poussière comme d'un effet sûr pour le blé, parce que la saison où l'on le sème est pluvieuse. Il semble que la forte pression exercée sur la graine pour en extraire l'huile devrait diminuer l'action de cette poussière ; mais les fermiers prétendent que cette action n'est pas moindre lorsque l'huile a été exactement exprimée. Cela mériterait d'être vérifié par des expériences soignées. (A)

lange avec une exactitude parfaite ; & il faut observer que quant aux terres chaudes & légères , on peut se dispenser de l'addition de la chaux ; aussi est-ce dans ces terres là que l'on a cité jusqu'ici les effets les plus marqués de cet engrais (1).

Les plantes marines , ou varechs , s'employent comme engrais dans presque tous les endroits où l'on peut s'en procurer une suffisante quantité. Ces plantes produisent des récoltes hâtives & abondantes. Dans quelques parties du Royaume , on estime que les terres dont les cultivateurs sont à portée d'employer cet engrais , ont une valeur six fois plus grande que les autres. Il y a , en particulier , dans le Comté de Haddington , des terres qui reposent sur un banc de pierre à chaux , qui autrefois s'affermoient pour 10 ou 15 shellings l'acre , & qui depuis l'emploi des varechs , se louent à raison de deux à trois guinées l'acre.

L'usage ordinaire est d'étendre ces plantes sur le chaume , ou les prés , immédiatement après les avoir amenées du rivage. Quand c'est sur les chaumes , on les enterre à la charrue le plutôt qu'il est possible. On observe que ces plantes marines perdent beaucoup de leur qualité par la fermentation ; en sorte qu'une

(1) Voyez la culture de Norfolk dans le vol. I de l'Agriculture. (R)

DES ENGRAIS. (277)

charretée de plantes fraîchement amenées de la mer & répandues sur le sol , fait plus d'effet que deux charretées qui ont fermenté en tas. Elles diffèrent à cet égard de tous les autres engrais animaux & végétaux.

Lorsqu'une ferme est soumise à un assolement convenable , il y a toujours du terrain prêt à recevoir à mesure les plantes marines que la vague a jetées sur le rivage. Pendant l'hiver on les répand sur les chaumes & les prés artificiels ; au printemps & en été on les étend sur les terres que l'on prépare pour les blés , ensuite les tressés en reçoivent après la première coupe , & enfin les chaumes après la moisson.

Lorsqu'il arrive que la mer jete plus de plantes sur le rivage que l'on n'en peut employer à mesure , il importe de les conserver autant que la nature de cet engrais le permet : on y réussit en y joignant un mélange de terre & de chaux : celle-ci doit être en quantité peu considérable , mais il doit y avoir assez de terre pour absorber & retenir les sucs & les sels de ces plantes. Ce compost doit être maintenu à l'abri des pluies jusqu'à ce qu'on en fasse usage. La meilleure méthode pour cela c'est de le disposer par tas terminés en dos-d'âne , battus à la pelle , & recouverts de chaume. Cet engrais doit ensuite être employé par dessus les récoltes en végétation , comme nous l'avons

dit ci-dessus , de quelques autres substances.

Si l'on met dans une bouteille une quantité égale d'huile & d'eau , avec une très-petite dose d'alkali fixe ou de potasse , on aura beau agiter la bouteille , l'huile & l'eau ne se mêleront point , & l'huile furnagera avec l'alkali dès que le mouvement cessera ; mais si l'on ajoute de l'alkali jusqu'à la proportion convenable , alors l'huile , l'eau , & l'alkali , se mêleront & formeront un liquide blanchâtre. Cette expérience donne une juste idée de ce qui arrive dans certaines terres riches & profondes qui contiennent beaucoup de principes végétatifs , mais où ces principes demeurent sans activité , parce qu'ils ne sont pas dans les proportions convenables : c'est donc une mauvaise spéculation que de mettre des substances grasses dans de tels terrains ; c'est la chaux , la craie , ou les coquilles qui leur conviennent le mieux. En revanche , s'il arrive qu'on ait mis une trop grande quantité de chaux dans un terrain , les fumiers gras deviennent alors le meilleur correctif.

Les herbes de rivières , de lacs , d'étangs , ou de fossés , ont été employées avec succès pour le blé , les turneps , les choux & d'autres récoltes vertes. Cet article mérite l'attention des fermiers. Il y a des endroits où l'on pourroit en recueillir une grande quantité pendant les mois d'été , & les basses eaux. L'effet

DES ENGRAIS. (279)

n'en est sensible que pour une année , lorsqu'on enterre ces herbes à la charrue telles qu'elles sortent de l'eau ; mais en les faisant entrer dans des mélanges , l'effet en est plus durable.

La meilleure maniere de préparer ces herbes , c'est de les disposer en petits tas , pendant un jour ou deux , après les avoir tirées de l'eau jusqu'à-ce qu'elles ayent perdu la surabondance d'humidité qui les empêcheroit de fermenter , car si elles ne fermentoient pas , la plus grande partie de leurs principes fertilifans seroit emportée par les pluies. Après ces deux jours , on les réunira par monceaux de trois ou quatre charretées , jusqu'à-ce que la fermentation soit passée. Il faut ensuite ajouter trois parties de terre pour une de plantes & les bien mêler , en les laissant séjourner ensemble environ huit jours. Enfin il faut retourner le tas , & y ajouter une certaine quantité de chaux éteinte. Un mois suffit ainsi pour faire un compost prêt à employer.

Cet engrais convient aux terrains légers & de peu de fond ; & il augmente leur consistance au moyen de la quantité de terre végétale qu'il contient. Il ne doit jamais être employé autrement que par dessus la récolte.

La vase , ou boue de la mer , des rivières , ou des étangs , est un excellent engrais , qu'on peut employer avantageusement , soit tel quel , soit mêlé de chaux. Elle est surtout bonne

(280) **À G R I C U L T U R E.**

aux terres légères dont elle augmente singulièrement la fertilité. On voit dans plusieurs des rapports agricoles adressés au Département, des exemples authentiques des bons effets de la vase de la mer comme engrais.

Cette vase doit toujours être employée en compost, soit avec de la chaux, de la craie & de la marne, soit avec du fumier d'étable. Ce mélange ne doit jamais être enterré lorsqu'on l'applique : il est très-avantageux aux blés, à l'orge, & aux mauvaises prairies.

En York-shire, & Lincolnshire, il y a des cantons que les débordemens des rivières enrichissent annuellement d'un dépôt gras, & très-fertile. On ne peut, dans ces parties là, semer des blés, parce que les eaux les ruineroient, mais les graines de printemps y réussissent admirablement.

Dans le Cheshire, le sol déposé à l'extrémité des marais salans, & que l'on nomme *sea sludge*, passe pour l'engrais le plus productif & le plus durable que l'on emploie dans le Royaume : il contient toute l'activité de la marne, & la graisse du fumier. On s'en sert beaucoup à Weston, village situé entre les rivières de Mersey & de Weaver.

Les ordures des rues sont un engrais bien connu des fermiers dans le voisinage des grandes villes, où il se vend fort cher. Cet engrais est un mélange des substances les plus
actives

DES ENGRAIS. (283)

actives pour favoriser la végétation : ce sont les rebuts des maisons , le fumier des animaux , les cendres , &c. Il exige moins la fermentation qu'aucun autre fumier , & peut être employé presque en le recueillant. Nous pensons qu'il ne doit jamais être enterré profondément ; mais , appliqué sur la surface du terrain , ses effets sont étonnans (1). On peut aussi le répandre dans le sillon lorsqu'on suit la culture au semoir.

Dans le voisinage des grandes villes , il y a des personnes qui font métier de ramasser sur les grands chemins le crotin de cheval : c'est une industrie louable. Si les officiers des paroisses étoient chargés de faire balayer les grandes routes pendant les temps secs , & vendroient aux fermiers voisins les tas qui proviendroient de cette opération , il en résulteroit deux avantages : le premier seroit la production d'un engrais que les vents auroient dissipé à

(1) Un fermier du Comté d'Haddington , qui avoit un grand champ en jachère , n'eut pas suffisamment de fumier pour la totalité du champ , qu'il sema néanmoins en blé. Au printemps , la partie non-fumée étoit foible & promettoit peu , quoique le nombre des plantes fût suffisant. Il s'étoit procuré des ordures des rues de la ville de Dembar qu'il répandit par-dessus son blé. L'effet en fut prodigieux. La végétation des plantes fut extrêmement rapide ; & à la récolte cette partie du champ fut très-supérieure à celle qui avoit été fumée lors de la semaille. (A)

Agriculture. Vol. 2. N°. 7. Juillet 1797.

O

(282) A G R I C U L T U R E :

pure perte , le second seroit l'augmentation *des* ressources pour l'entretien des chemins , par le produit de cette vente.

- La poussière des pierres à chaux employées dans les chemins ; forme , à elle seule , un engrais ; mais lorsque cette poussière calcaire est ajoutée à des substances animales & végétales , elle forme un compost de très-grande valeur. Il faut espérer que cet objet sera pris en considération à l'avenir , car il est évident que plusieurs milliers d'acres pourroient recevoir annuellement cet engrais. Il a l'avantage de pouvoir être répandu très-également sur la terre , parce qu'il est extrêmement divisé.

La terre qui a été en revers de fossés ou en murailles d'enclos , (comme c'est , dans quelques provinces , l'usage de la disposer autour des pieces) acquiert la qualité d'un excellent engrais. La terre vierge elle-même , & sans préparation , a un effet sensible sur les champs , pour une saison au moins : elle est singulièrement propre à faire la base d'un compost , où on la mélange avec du fumier.

La poussière de drèche , est regardée comme un engrais très-efficace : c'est la poussière qui résulte de la dessiccation de la drèche. On s'en sert en Berkshire pour la semer à la main par dessus l'orge en végétation ; & en Nottinghamshire , on l'emploie sur les trefles & sur les jachères. Lorsqu'on applique cet engrais aux

turneps, on en met six quaters par acre, à raison de cinq shellings par quarter.

Le tan, lorsqu'on a eu soin de le faire pourrir, & qu'on le répand assez épais sur les prés, y est d'un grand effet; mais la maniere la plus sûre & la plus prompte de le rendre utile, c'est de le mêler avec de la chaux, ou du sel.

La suie s'employe comme engrais partout où l'on peut l'avoir en quantité suffisante. On l'applique de toutes les manieres, & à toutes les productions. Lorsqu'on l'employe pure, elle fait plus d'effet sur les terrains graveleux, craieux, & calcaires; dans les composts sa proportion doit être deux parties sur deux de chaux & dix de terre. Il faut, avant d'appliquer la chaux, que la suie & la terre soyent bien incorporées par un repos de huit ou dix jours, après quoi on les retourne, & l'on y ajoute de la chaux, qu'on dispose couche par couche. Ce mélange doit demeurer en tas pendant un mois ou six semaines, puis être ensuite retourné, en ayant soin de le couper à la bêche aussi menu qu'il est possible.

Il est assez indifférent de herfer pour enterrer ce compost en même temps que la graine, ou de le répandre sur la récolte pour hâter la végétation, lorsqu'il s'agit de graines de printemps; mais pour le blé, il faut certainement ne le répandre que dans le moment où la végétation commence à prendre de l'activité: si

(284) AGRICULTURE.

on l'applique en automne, les sels productifs sont délavés & enterrés avant que la plante puisse en profiter.

Il y a cependant un danger dans l'emploi de ce compost au printemps. S'il survient une sécheresse, une partie de l'effet est perdu, & même les plantes foibles ont à souffrir de cet engrais, qui les brûle au lieu de les aider. Lorsqu'on sème la suie à la main, il faut la mêler en parties égales de chaux & de terre; en commençant toujours par mêler la suie & la terre, avant d'ajouter la chaux vive. Ce mélange est très-commode à employer pour la culture au semoir.

LETTRE de Mr. JOHN MIDDLETON
sur la culture des terrains argileux. (Tirée
des Mémoires de la Société des Arts de
Londres).

NB. Cette communication lui a valu la médaille
d'argent de la session de 1795.

C'EST une chose reconnue que l'on entend moins bien la culture des terrains argileux, en Angleterre, que l'on ne fait celle des terrains légers (1). Je me propose de donner ici des

(1) Ceci signifie que l'on n'est pas encore suffisamment éclairé par l'expérience pour déterminer les assolements les plus convenables aux terres pesantes, & que même

SUR LA CULT. DES TERRAINS ARGILEUX. (285)

directions au moyen desquelles on pourra cultiver les terres pesantes avec une facilité presque égale à celle de la culture des terrains à turneps, & avec un profit plus grand, en excluant absolument les jachères. L'affolement que je propose est le suivant.

1^{re}. année Vesces d'hiver.

2^{de}. . . . Avoine.

3^{me}. . . . Trefle.

4^{me}. . . . Blé.

Dans aucun des ouvrages qui sont parvenus à ma connoissance, on n'estime les vesces d'hiver tout ce qu'elles valent. Si on les considère

on n'est pas encore d'accord sur la convenance de semer ces terres toutes les années. Des cultivateurs très-judicieux soutiennent qu'il leur faut de temps en temps une jachère complète. La grande difficulté n'est pas tant de les maintenir nettes, que de les maintenir suffisamment ameublies. En semant tous les ans, il ne reste pas toujours assez de temps entre une récolte & l'autre pour donner le nombre de labours nécessaire ; parce que quelquefois les pluies ou les sécheresses empêchent de mettre la charrue dans les terres fortes, quand il le faudroit. Observons encore que le nombre des productions *améliorantes*, & d'une utilité générale, qui conviennent à ces terres, est moins grand que le nombre des productions qui, avec la faculté *améliorante* & l'utilité, se trouvent convenir aux terrains légers. Le choix est donc moins grand ; il est plus difficile d'éloigner convenablement les productions de même genre pour que la terre ne s'en lasse pas, & l'on est conduit à la méthode des jachères, tout en avouant son imperfection. (R)

comme fourrage vert , & qu'on les assimile aux turneps pour leur prix , c'est-à-dire qu'on les compte à trente , quarante ou cinquante shillings l'acre , on les estime trop bas. On peut les convertir en fourrage sec , qui , à poids égal , donne autant de nourriture que le foin des meilleures prairies , & d'une qualité supérieure.

Peu de gens sèment des vesces ; & ceux qui en ont , n'en cultivent gueres qu'un acre ou deux pour donner en vert aux chevaux , laissent une partie de la récolte sur pied pour en ramasser la graine : il est rare qu'on coupe la récolte en fourrage sec.

La méthode que je recommande ici , c'est de semer des vesces sur le quart de toutes les terres tenaces d'une ferme ; de les donner en vert pour toute nourriture du bétail à l'étable , aussi long-temps que les bêtes n'en gâtent point en les mangeant , c'est-à-dire , jusqu'à ce que les feuilles commencent à se flétrir près du sol ; de faucher le reste lorsque les gouffes se forment , & de le ferrer en foin. Une récolte ordinaire donnera trois tonnes par acre , d'un foin égal au sainfoin , supérieur à tout autre fourrage , & qui vaut vingt shillings par charette de plus que le meilleur foin de prairies.

J'avois , l'été dernier , environ dix-huit acres de vesces. J'en fis manger six en vert , j'en recueillis douze en foin , qui me donnerent 36 chars que j'estime cinq guinées chacun , c'est-à-

SUR LA CULT. DES TERRAINS ARGILEUX. (287)

dire 15 guinées par acre, à raison de la quantité de foin & d'avoine qu'ils me remplaceraient. Je pense que c'est la seule méthode correcte pour estimer la valeur des récoltes de trefle ou de vesces.

A mesure que le terrain est débarrassé, acre par acre, il faut le labourer. Lorsqu'il est labouré en totalité, il faut herfer, puis relabourer, & herfer encore, en ayant soin de recueillir le gramin en monceaux & de le brûler à chaque herfage. Ces opérations rendront la terre aussi propre qu'elle l'est après une jachère complète. Avant les pluies d'automne l'on aura soin de disposer le terrain en billons. Ceux qui empêchent le mieux la terre de se pénétrer d'eau l'hiver, sont les billons de quatre traits de charrue (1). Lorsqu'ils seront faits, on ouvrira les raies d'écoulement (2). On sèmera, au printemps, aussitôt qu'il sera possible, de l'avoine & de la graine de trefle.

Après la moisson de l'avoine dans la seconde année; après avoir coupé le trefle une fois ou

(1) Voyez la note pag. 161 du vol. I. d'Agriculture. Ces billons étroits ont l'avantage de mûrir la terre, en exposant plus de surface aux influences de l'hiver, en même temps qu'ils maintiennent la terre la plus forte, assez sèche pour y entrer dès le mois de mars avec la charrue. (R)

(2) Lorsque les billons sont dans le sens de la pente du terrain, les raies d'écoulement sont inutiles; mais on ne peut pas toujours leur donner cette direction. (R)

(288) AGRICULTURE; &c.

deux l'année suivante, semez du blé, sous-raies, en le recouvrant d'un trait mince & peu profond; & observez que des billons de trois pieds, faits de quatre traits de charrue, sont encore ici les plus convenables, parce qu'ils maintiennent le terrain très-sec. Ajoutez-y les raies d'écoulement nécessaires & vous aurez une belle récolte de blé.

Après la récolte, fumez sur le chaume. Semez les vesces sur le fumier en septembre; & enterrez le tout à la charrue, en labourant à petites raies.

De cette manière tous les labours se donnent en été, pendant que la terre est sèche, c'est-à-dire en temps convenable; car les labours d'hiver en terre humide, paitrissent & corroyent les terres tenaces.—Je n'ai pas besoin de remarquer que ce système est calculé pour maintenir les terres nettes, & pour assurer chaque année une belle récolte.

J'ai l'état des dépenses, du produit, & des profits probables, mais ces détails dépendent trop des localités pour être d'une instruction générale. Je dirai seulement en deux mots que mes frais sont de six guinées, & mon produit de douze : en sorte que j'ai six guinées par acre pour la rente, les impôts, les risques, l'intérêt, & le profit.

A G R I C U L T U R E.

ON MANURES. DES ENGRAIS; tiré du XV.^e chapitre de l'Esquisse du rapport général du Département d'Agriculture sur l'état actuel de l'agriculture de la Grande Bretagne.

(*Second Extrait* , v. p. 249.)

LA tourbe étant une production végétale , il est naturel de supposer qu'elle peut être convertie en engrais. On a fait, dans cette supposition, un grand nombre d'essais qui n'ont point réussi, à cause de la difficulté de soumettre cette substance à la fermentation. Ensorte qu'une matière qui contient environ une moitié de son poids du terreau le plus fertile, & beaucoup d'huile, est demeurée non-seulement inutile jusqu'à présent, mais a paru embarrassante dans les procédés de la végétation.

Nous savons que les substances animales & végétales sont plus ou moins sujettes à la putréfaction selon qu'elles contiennent plus ou moins d'acides & d'alkalis. Si l'acide y prévaut, la putréfaction est lente & difficile : si c'est l'alkali, elle est très-prompte. L'analyse de la tourbe démontre qu'elle contient un acide, en quantité si considérable, qu'il monte quelquefois

au quart du poids total de cette substance. Les autres parties constituantes sont de l'huile , de l'alkali , & de la terre végétale. Ces trois derniers composans sont extrêmement utiles dans la végétation , mais leur union avec l'acide paralyse leur effet , & la tourbe ne sauroit être soumise à la fermentation putride.

La premiere question qui se présente, c'est de savoir si cette qualité acide peut se corriger ; la seconde , si la tourbe deviendrait alors susceptible de fermentation ; la troisieme question , & la plus importante, c'est de déterminer si la tourbe seroit ensuite un bon fumier , & si ce fumier ne coûteroit pas trop cher. Nous pouvons répondre à ces trois questions. L'acide peut être corrigé à peu de frais. La tourbe se trouve alors une substance végétale semblable à une autre , susceptible d'être mise en fermentation par les mêmes procédés. Tout cela se fait avec une facilité , & à un prix , qui ne sont en aucune proportion avec les avantages à retirer de l'excellent engrais qui en provient.

Tout le monde sait que les acides s'unissent aux sels alkalis , & aux terres absorbantes , de préférence à tout autre corps ; qu'ils abandonnent même les substances auxquelles ils sont liés , pour s'unir aux terres & aux alkalis avec lesquels ils ont plus d'affinité. Les sels alkalis & la terre calcaire doivent donc être employés à neutraliser l'acide qui empêche la

DES ENGRAIS. (291)

tourbe d'être susceptible de fermentation : voici les différentes manières d'y procéder.

La première précaution à prendre, c'est de briser & de pulvériser la tourbe dans un état de sécheresse parfaite : cela est indispensable pour corriger son acidité. On la dispose, dans cet état de sécheresse, & de pulvérisation, en une couche de trois ou quatre pieds d'épaisseur, qui sert de base au tas du fumier d'étables. Pendant le procédé de la fermentation, l'humidité qui s'échappe du tas, pénètre la tourbe, corrige son acidité, & lui communique les principes fertilisans du fumier. Elle devient alors susceptible de fermentation. Cette manière de préparer la tourbe est préférable à toute autre, à cause de sa facilité. Non-seulement les sels alkalis du fumier s'emparent de l'acide, mais la tourbe se charge comme une éponge des parties grasses, & le fumier lui aide à fermenter. Cependant tant que le tas repose dessus, la fermentation ne se fait point, parce que la tourbe est trop pressée. Il faut auparavant retourner le tout, bien mélanger les deux substances dans l'opération, & avoir soin de ne point ferrer le tas en le reformant. C'est alors que la fermentation s'opérera. Après quelques semaines de repos, il faudra encore retourner le tas & y ajouter de la chaux dans la proportion d'un char sur cinq de tourbe. Le tout doit être bien exactement mêlé. L'addition de la chaux accé-

lérera la putréfaction de la tourbe , & donnera au tout plus d'activité comme engrais.

Si l'on préfère de mettre la tourbe à part , il faut avoir soin de l'arroser de toutes les urines des étables, des eaux grasses des offices , des lessives , &c. Alors l'effet est à-peu-près le même que si l'on avoit mis la tourbe sous le fumier. L'acidité dispaeroit , & cette substance mélangée ensuite avec du fumier d'étable , ou de la chaux , fait un admirable engrais.

La dernière méthode pour rendre la tourbe utile comme engrais , c'est de la mêler avec de la potasse , de la soude , de la chaux , ou de la craie.

Dans certaines provinces éloignées où la tourbe est en abondance , & où il est difficile d'obtenir des engrais , cette maniere est peut-être la meilleure. Lorsqu'on emploie la potasse , la quantité requise est si peu considérable , qu'il est facile de se la procurer ; 80 ou 100 livres de potasse sont très-suffisantes pour saturer l'acide d'une quantité de tourbe proportionnée à l'engrais d'un acre ; & plus la tourbe est sèche , plus on peut épargner sur la quantité de potasse à employer.

Pour assurer l'effet de la potasse sur la tourbe , il faut la dissoudre dans de l'eau bouillante. Après avoir bien séché & brisé la tourbe , on la dispose donc en une couche d'un pied d'épaisseur , sur un espace carré. On allume da

feu tout auprès. On établit sur le feu une grande chaudiere dans laquelle on met une demi-livre de potasse pour chaque gallon d'eau. On a soin de remuer jusqu'à ce que l'eau soit bouillante. Cette dissolution est ensuite jetée également sur toutes les parties du tas, jusqu'à ce qu'il en soit suffisamment humecté. On met ensuite une couche nouvelle de tourbe sèche, & on recommence l'opération jusqu'à ce que la totalité du tas soit saturée par la lessive. On peut ainsi élever le tas jusqu'à une assez grande hauteur.

Lorsqu'on a préparé de cette maniere une quantité suffisante de tourbe, il faut la laisser reposer pendant quelques semaines, puis retourner le tas. Dans cette dernière opération, il faut ajouter de la chaux vive de la meilleure qualité qu'on puisse se procurer, & avoir soin de la bien retourner & mêler avec la bêche. Après quelques semaines de repos, le tas, ainsi mélangé, doit être de nouveau retourné, en le hachant menu. La fermentation succede à ce remuement, & l'engrais est prêt à être employé.

Les points les plus importans dans la préparation de ces divers composts, sont :

- 1°. De sécher complètement la tourbe,
- 2°. De la briser autant qu'il est possible,
- 3°. D'incorporer intimément les autres substances avec la tourbe.

(294) A G R I C U L T U R E .

4°. De laisser le tas reposer un temps suffisant après chaque opération.

Quant à l'emploi, comme engrais de la tourbe ainsi préparée, voici les directions générales.

L'effet de cette substance sera très-avantageux sur les terres légères, graveleuses, calcaires ou craieuses, non-seulement comme engrais, mais pour donner au sol plus de consistance. La tourbe préparée n'est pas sans effet sur les glaises de peu de fond, mais elle n'opère pas sensiblement sur les glaises profondes, parce qu'elles contiennent déjà abondamment les deux principes que la tourbe apporte au sol, savoir : l'huile & la terre végétale.

Si la tourbe est bien brisée & émiettée, elle fait un très-bon engrais à répandre par dessus les récoltes lorsque les plantes sont jeunes, ou sur les mauvais prés. Quand on l'emploie sur les blés, ce doit être au printemps; mais lorsqu'on l'applique à l'orge, il faut l'enterrer à la herse, avec la graine.

Il est digne de remarque que dans les parties qui sont à-la-fois, montueuses & tourbeuses, les terrains arables sont graveleux, ou sont des argiles sans profondeur. C'est sur ces terres sans fond que l'on éprouve les mauvais effets de l'usage de la chaux. Comme ils ne contiennent que peu d'huile sur laquelle la chaux puisse agir, celle-là est bientôt épuisée, & ils se trouvent alors plus appauvris qu'auparavant. Il n'y

Il y a de remède à ce mal que l'application d'un engrais riche & gras, mais la quantité que l'on peut faire de ces engrais est bornée, & à une grande distance des villes, on ne sauroit en acheter. La tourbe, judicieusement employée, acquiert donc un prix plus grand dans de telles situations. Cet engrais rend à ces terrains ce qu'ils possédoient auparavant, car la tourbe est presque entièrement composée des parties les plus tenues des terres, qui ont été entraînées & déposées dans les situations basses.

Tout fermier dans les montagnes à portée des tourbieres, devrait avoir trois tas de tourbe en préparation : savoir, un au-dessous de son fumier d'étable ; un sur lequel on verseroit les urines, les lessives, les graisses de rebut ; & un troisième mêlé de potasse & de chaux. De cette manière, on se feroit à très-peu de frais cinq ou six fois plus d'engrais qu'on n'en fait communément. Les produits en grains & en pailles qui en résulteroient, auroient bientôt porté ces cantons au plus haut degré de prospérité agricole.

Il y a des gens qui imagineront que la peine, le temps, les frais, ne se trouveroient pas compensés par les avantages ; mais les agriculteurs intelligens sentiront d'abord tout ce qu'il y auroit à gagner. A ne considérer que la perte des substances qui se fait journellement dans toutes les fermes du Royaume, des urines,

des eaux de lavage, des eaux de lessive, il est évident qu'il y auroit un prodigieux avantage à les fixer & à les retenir en en saturant de la tourbe ou de la terre.

Ce détail sur les propriétés de la tourbe n'est point fondé sur des conjectures & sur de la théorie. L'analyse exacte des parties constituantes de cette matière a conduit aux expériences. Elles ont été répétées, avec le fumier, l'urine, la potasse, & la chaux; & toutes ont parfaitement réussi. Leur résultat, enfin, est confirmé par le rapport transmis au Département, sur la province de Bedfordshire; nous en parlerons en traitant de la cendre de tourbe.

L'usage du parc des bêtes à laine, pour engrais, est commun à plusieurs parties de l'Angleterre, & extrêmement avantageux. On emploie le parc sur les terres arables, & sur les prés. On fait quelquefois parquer sur les jachères avant le dernier labour, quelquefois sur la plante en végétation. Cette dernière méthode est la meilleure, parce que l'urine & le crottin ne pénètrent que peu-à-peu jusqu'aux racines, au lieu que si on laboure après le parc, l'engrais enterré est en grande partie entraîné par les pluies & perdu pour la plante. Le parc du printemps & de l'été est le meilleur, parce que la nourriture de l'animal est plus succulente. Le parc d'hiver a peu d'effet, à moins que les moutons ne foyent nourris aux turneps & au foin.

Il est évident que l'on ne peut pas parquer avec avantage , en temps sec , & sur des terres sèches , lorsque c'est sur la récolte.

Cette maniere de fumer les terres est particulièrement convenable dans les fermes où il y a beaucoup de terrains montueux , & de pâturages , que la charrue ne travaille jamais. En faisant parquer les moutons la nuit , on profite d'une grande quantité de fumier , qui sans cela seroit perdu. Si le pâturage ordinaire des moutons est bon , & qu'on n'ait pas le projet de les engraisser , il n'y a aucun inconvénient , pour la santé de ces animaux , à les tenir parqués la plus grande partie de l'année ; mais s'ils ne vivent pas sur un bon pâturage , ils ne peuvent pas soutenir le jeûne de la nuit , & la fatigue d'aller chercher le parc çà & là.

Lorsqu'on les nourrit au parc , cette objection n'est pas applicable , mais on ne peut pas nourrir les moutons au parc , sur une jeune récolte ; cette pratique ne peut s'employer que sur les terres que l'on prépare pour le blé ou l'orge. Alors les débris de la nourriture des moutons s'enterrent avec leur fumier , par le dernier labour. Mais cela ne peut se faire avec profit que sur les terres légères que la pluie ne rend pas poisseuses , & qui gagnent à être trépignées. Sur les glaises , le trépignement des moutons en temps de pluie nuiroit plus que leur fumier ne pourroit servir.

Il est très-ordinaire de voir entasser dans une étroite enceinte un nombre considérable de bêtes à laine. On ne leur donne que trois pieds en quarré par tête , & l'on mêle indistinctement les brebis , les moutons , les agneaux. Si l'on nourrit les bêtes au parc l'espace est si resserré , qu'une grande partie du fourrage est foulé aux pieds & perdu. L'haleine des moutons les échauffe mutuellement , & ils ne peuvent pas reposer tous à-la-fois.

Il y auroit beaucoup à gagner à donner aux moutons une espace de trois verges quarrées par tête. Une nuit de parc ne feroit pas le même effet sur une aussi grande enceinte ; mais on laisseroit le parc deux ou trois nuits sur le même lieu ; l'on ne perdrait point de fourrage , & les bêtes en feroient mieux portantes.

Ce n'est pas un moindre tort que de mêler les bêtes de tout âge. On ne doit donner que la quantité de nourriture nécessaire au nombre de bêtes qui parquent ensemble : or il arrive que les plus fortes affament les plus faibles , & que celles-ci perdent de jour en jour davantage , dans cette lutte inégale. Il est bien évident , par cette raison , qu'il convient d'asfortir les bêtes pour parquer ensemble celles de même force , lorsqu'on les nourrit dans le parc.

D'après tous les faits rassemblés , la pratique du parc est certainement très-avantageuse ; mais sur cela , comme sur d'autres branches

De l'agriculture, il faut laisser beaucoup au jugement des fermiers, car les règles qu'on peut donner, ne sauroient se plier à toutes les variétés de terrains & de situations. Le parc convient en général aux fermes de terrains secs & légers, où il y a des pâturages que la charrue ne travaille jamais : on fait alors beaucoup de fumier que sans cela on ne feroit pas ; mais sur les fermes où tout se laboure & où les prés artificiels entrent dans l'assolement, faire parquer les moutons sur les champs, après les avoir fait pâturer sur les prés, c'est priver ceux-ci d'une grande partie du bénéfice qui devoit résulter de la culture de l'herbe : c'est enrichir une portion de la ferme aux dépens de l'autre (1). Le cas où l'on peut, en toute

(1) Cette objection est difficile à bien comprendre. Les prés artificiels ont l'avantage d'améliorer la terre, c'est-à-dire, de la préparer à porter des grains, en même temps qu'ils donnent des fourrages qui augmentent les fumiers pour les champs semés en grains dans la ferme. Mais ces champs qui portent des grains une année, seront en foin artificiels l'année suivante ; ces foin profiteront donc aussi du fumier déjà produit par l'augmentation des fourrages sur cette ferme. Or, que cela arrive par la circulation lente du foin à l'étable, puis des fumiers aux champs, ou par le procédé plus abrégé du parcage, où les moutons font leur digestion sur le champ voisin du pré qui les a nourris, on ne voit pas quelle différence il en résulte qui puisse fonder l'objection, que c'est enrichir une portion de la ferme aux dépens de l'autre. (R)

assurance, recommander le parc, dans une ferme arable, c'est celui où l'on cultive des turneps sur les terres glaises (1), alors il convient de les faire manger sur les chaumes ou sur les prés. Tout fermier qui a le sens commun fait bien qu'on ne doit pas les faire manger sur place quand la terre est forte. Mais, comme nous l'avons déjà observé, le jugement du fermier doit le diriger. Il y a des situations auxquelles sont attachés de grands avantages, & d'autres dans lesquelles on ne peut éviter des pertes.

L'usage, d'enterrer les récoltes à la charrue, pour l'amélioration du sol, est extrêmement ancien, & a été recommandé par tous les Romains qui ont écrit sur l'agriculture.

Les pois, les fèves, le blé sarrasin, les turneps, & d'autres plantes succulentes, enterrées lorsqu'elles sont en pleines fleurs, & dans le moment où elles ont le plus de fève, donnent un très-bon engrais. Cette manière de fertiliser le sol n'est pas aussi fréquemment mise en usage qu'elle le mériterait. Dans le Warwickshire, on enterre quelquefois à la charrue des fèves ou du blé sarrasin au lieu d'engrais. On voit dans le rapport de Nottingham que le trefle

(1) Il faut se souvenir qu'on ne sauroit cultiver avec profit les turneps sur les terres glaises, à moins qu'elles ne soient marnées. (R)

enterré pour semer du blé fait réussir celui-ci. Lorsque l'on considère à combien peu de frais cet engrais s'obtient, on s'étonne que cet usage ne soit pas général en Angleterre. C'est le plus économique de tous les moyens de fumer le sol, & on pourroit l'employer quelquefois, au lieu d'une jachère complète, pour préparer le sol à rapporter du froment. Dans ce cas, le prix de la semence, qui est le seul objet coûteux, seroit amplement payé par l'épargne des labours.

L'avantage d'enterrer des récoltes en vert seroit bien plus grand, si l'on répandoit dessus ces récoltes, auparavant de la chaux, de la craie, ou de la marne (selon la nature du sol,) qui accéléreroit beaucoup la fermentation des plantes enterrées, & rendroit la terre plus promptement propre à fournir à la nourriture du blé.

Il paroît par le rapport de Sommerfet présenté au Département, qu'un pré sur lequel on avoit étendu du chanvre rouï pour le sécher, avoit été singulièrement amélioré par cette opération, & que son herbe aigre & grossière s'étoit changée en une herbe de très-bonne qualité. Mr. Billingsley fut conduit par cette observation à essayer de répandre sur les prés, au moyen d'un char semblable à ceux dont on se sert pour arroser les routes, l'eau qui avoit servi à rouir le chanvre. L'effet en fut éton-

(302) AGRICULTURE.

nant. Le terrain qui s'affermoit 10 shellings , monta à 50. Mr. Billingsley trouve que cette substance est beaucoup plus efficace que l'urine , & en recommande fortement l'usage à ceux qui cultivent le chanvre & le lin.

Dans le Lincolnshire , où cette culture est fort suivie , on regarde comme un engrais actif , le sédiment qui se dépose au fond des fosses destinées à l'opération de rouir : ces faits tendent à combattre l'idée assez généralement reçue que le chanvre & le lin ne conviennent pas à notre agriculture parce qu'ils épuisent le sol , sans lui rien restituer. On n'a pas encore déterminé quelle est la quantité d'engrais qu'un acre de chanvre peut fournir , mais elle est probablement considérable. Il suit naturellement de là deux observations :

La première , c'est que comme le chanvre demeure fort peu de temps en terre , & par conséquent ne craint pas les gelées , on pourroit le cultiver dans les parties élevées du pays , & profiter des eaux employées au rouissage pour arroser les pâturages inférieurs. La seconde observation , c'est que l'on ne s'est pas assez occupé , peut-être , des moyens de convertir l'eau en engrais. Il ne s'agit pour cela que de la rendre putride , ce qui est plus facile que pour les substances solides. Si un chimiste trouvoit un moyen de faire passer promptement à l'état putride une quantité d'eau considérable , à peu

de frais , il rendroit probablement à l'agriculture un plus grand service , qu'on ne le pourroit par aucun autre moyen. Il semble que la méthode qui réussiroit vraisemblablement le mieux , seroit de déposer des végétaux frais dans une eau stagnante : ce procédé fait pourrir l'eau en peu de jours (1).

Les effets de la chaux & des autres substances calcaires , sur la végétation , sont une des découvertes les plus extraordinaires dont l'agriculture puisse se vanter. Il est impossible de concevoir une idée en apparence plus absurde que celle de se servir de la chaux pour engrais. Calciner une pierre ; & mêler avec le sol la poudre blanche qui résulte de la calcination , pour obtenir d'abondantes récoltes de grains ou de fourrages , c'est assurément un procédé auquel le raisonnement ne conduisoit pas , mais dont les effets ne sont point douteux (2).

(1) Il paroît que l'eau putride possède la singulière propriété d'extirper les plantes nuisibles des prés , & de leur substituer d'excellent fourrage. Dans le Devonshire on se sert de la chaux pour améliorer l'eau des étangs destinée aux arrosements : on y dépose de temps en temps un sac de chaux. (A)

(2) Il semble que les effets du gyps calciné sont encore plus extraordinaires & plus mystérieux , parce que la quantité employée est beaucoup moins considérable , & qu'on la répand sur les feuilles des végétaux. (Voyez le vol. II d'Agriculture , pag. 60.) (R)

On a fait divers systèmes concernant la manière dont la chaux opere sur le sol. L'expérience démontre qu'elle produit des récoltes prodigieuses dans des terrains qui jusqu'alors avoient été regardés comme de peu de valeur ; mais comme la stérilité succede souvent à ces récoltes prodigieuses, on a soupçonné que la chaux étoit un stimulant qui épuisoit le terrain, en lui faisant faire des efforts de végétation extraordinaires ; & il est très-vrai que si l'on n'y prend garde, les champs où l'on a employé la chaux se trouvent, après quelques récoltes épuisantes, dans un état plus fâcheux qu'auparavant.

Les attentions principales à avoir dans l'usage de la chaux, sont les suivantes :

1°. S'assurer de la quantité convenable pour le sol dont il s'agit.

2°. L'appliquer de manière à en tirer le plus grand parti qu'il est possible.

3°. La préparer convenablement avant de la répandre.

4°. Disposer l'assolement de manière à conserver la fertilité de la terre lorsque la chaux l'a développée.

Dans un ouvrage comme celui-ci, on ne sauroit fixer avec précision la quantité de cet engrais qui convient aux différens sols : cela demande des expériences exactes & répétées. Mais nous pouvons du moins donner des règles générales

générales qui serviront de bases aux observations des fermiers, & qui leur aideront à tirer des conclusions utiles de leurs expériences.

Le chapitre des terres, qui donnera l'idée des parties constituantes des différens sols, aidera à fixer l'opinion sur la quantité de chaux à employer dans les divers terrains. En général il faut observer, que c'est sur les terres les plus fortes & les plus profondes qu'il faut employer la plus grande quantité de chaux ; & diminuer cette quantité à mesure que les terres qu'on veut amender sont plus légères. Les fermiers intelligens saisiront d'abord la justesse de cette observation. Dans les glaises profondes il y a une masse considérable de substances riches sur lesquelles la chaux agit : il en faut donc une quantité assez considérable pour agir sensiblement sur le tout & lui donner de l'activité ; mais une plus petite dose suffit à un sol léger & peu profond, & dans celui-ci, la conduite des récoltes après l'emploi de la chaux est d'une grande importance. Les plus petites différences dans la qualité du sol, doivent être prises en considération par le cultivateur. Il faut souvent varier les doses dans l'enceinte du même champ, surtout si la surface en est inégale. Le sol se trouve souvent léger & ameubli sur les parties élevées, tandis qu'il est pesant & compacte dans les parties basses. Si l'on répand dans un tel champ la même quantité de chaux, quelques

parties en auront trop peut-être , & d'autres point assez. On fait rarement une attention suffisante à cet objet : nous voyons fréquemment répandre la même quantité de chaux sur toute la surface d'une grande piece , où le terrain est de qualité très-différente en divers endroits.

On ne sauroit trop recommander aux fermiers de bien examiner la nature de leurs terres avant que d'y répandre de la chaux. Il y a des terrains sur lesquels cet engrais ne sauroit être employé : tels sont ceux dont le fond est crayeux , calcaire ou marneux , & qui n'ont qu'une très-petite épaisseur de terre végétale. Dans ces cas là , un bon cultivateur , au lieu de mettre de l'argent à acheter de la chaux qui seroit inutile ou pernicieuse à son terrain , achètera des engrais propres à enrichir le sol.

Les différens rapports qui sont parvenus au Département donnent un grand nombre de méthodes diverses pour la manière d'appliquer la chaux , & dans chaque endroit , on raisonne les avantages de la méthode adoptée. Voici ce qu'on peut tirer de la pratique des meilleurs cultivateurs , qui emploient la chaux soit sur les jachères destinées au blé ou à l'orge , soit sur la terre en préparation pour les turneps , soit sur le tressé que l'on rompt pour semer de l'avoine , soit enfin sur le blé au printemps.

Lorsqu'on répand la chaux sur la jachère , assez à temps pour qu'elle puisse se mêler inti-

DES ENGRAIS. (307)

mément avec le sol, elle fait un très-bon effet : pour cela il faut labourer deux ou trois fois depuis qu'elle a été répandue, & herfer aussi souvent. La chaux ainsi incorporée avec la terre produira son effet dès la première année ; au lieu qu'en la répandant avant le dernier labour, & sans herfer, il y a un grand nombre de particules du sol qui ne se trouvent point en contact avec la chaux ; une partie de cet engrais est trop enterrée, & l'année suivante au lieu de pouvoir être ramené dessus par la charrue, comme on l'imagine, il se trouve en très-grande partie entraîné par les pluies à une profondeur qui le rend inutile.

Pour se faire une idée de ce qui se perd ainsi, il n'y a qu'à examiner ce qui arrive lorsqu'une pluie considérable tombe sur les tas de chaux dans les champs. L'eau qui s'échappe après que le tas est saturé, est parfaitement blanche, parce qu'elle entraîne les parties les plus atténuées de la chaux, qui y demeurent suspendues. La même chose arrive sans doute dans tous les champs qui ont reçu de la chaux, quelques précautions que l'on ait prises ; mais lorsqu'on l'enterre sans l'avoir herfée, le mal est plus grand, & il y en a une quantité plus considérable qui descend avec les pluies.

Dans plusieurs endroits, il est d'usage de commencer par enterrer la chaux, puis d'enterrer du fumier ensuite. Il seroit difficile de

donner une bonne raison de ce procédé ; car si la chaux convient au sol, le fumier est inutile, & si l'on veut que l'action de la chaux se porte sur le fumier, on nuit au résultat, ou on l'empêche, en commençant par la mêler avec la terre. Toutes les fois donc que l'on veut employer la chaux & le fumier sur le même champ, il faut ou les mêler en compost, ou les appliquer ensemble ; ce n'est que de ces deux manières qu'on peut assurer l'effet de la chaux sur le fumier. La première est d'une réussite certaine, & paroît de toutes la meilleure. Dans la seconde méthode, le contact ne sauroit être aussi immédiat, ni par conséquent l'effet si complet : il n'y a pas besoin de beaucoup de raisonnemens pour faire comprendre que le mélange intime des deux substances, avant de les répandre, est le moyen de réussite le plus sûr.

On a quelquefois objecté à la méthode recommandée, c'est-à-dire au mélange de la chaux & du fumier en compost, que cela est difficile à arranger, parce que le fumier ne se forme que peu-à-peu, & que comme il faut que le mélange soit fait à l'avance, on perd, pour l'engrais de l'année, le fumier qui se fait pendant les six semaines ou deux mois qui précèdent le moment de le répandre. L'objection est plausible, mais elle n'est pas solide, car le fumier qui se fait dans ce dernier intervalle de temps n'est pas un véritable engrais. Nous avons déjà

appuyé sur la nécessité de la fermentation du fumier d'étable ; & il est impossible, qu'avec la manière ordinaire de traiter les fumiers, la fermentation ait lieu dans un terme si court. Il est certain, cependant, que chaque année il se mene sur les champs une très-grande quantité de fumier tel qu'il est sorti de l'étable.

Si les fermiers vouloient prendre la peine de faire trois ou quatre tas de fumier au lieu d'un, la fermentation seroit beaucoup plus prompte, plus complete, & on n'emploieroit jamais le fumier, soit seul, soit avec de la chaux, avant qu'il eût acquis les qualités que la fermentation lui donne. On ne perdrait ainsi aucune partie du fumier produit dans une ferme.

Nous voyons souvent, au contraire, des fermiers s'efforcer de couvrir la totalité d'un champ qui a été chaudé, avec un fumier si frais qu'il n'est gueres que de la paille, & qu'une forte charrue attelée de quatre chevaux ne peut pas l'enterrer complètement.

Lorsque la chaux n'est pas mêlée avec le fumier, soit en compost, soit sur le champ même, il y a beaucoup d'avantage à pouvoir donner trois labours avant de semer le blé, puis à répandre le fumier sur le blé au commencement du printemps. Si l'on sème de l'orge, il faut répandre le fumier en même temps que la sèmençe, puis enterrer celle-ci à la herse. Toutes les fois qu'on a suivi cette marche, le succès

(310) A G R I C U L T U R E .

a été étonnant, sur le blé en particulier. *Huit* ou dix jours après que le fumier est appliqué, le blé prend un vert foncé, & *stalle* ensuite avec vigueur. Des essais répétés ont prouvé l'excellence de cette méthode, & une seule expérience suffira à convaincre le plus incrédule.

Beaucoup de gens objecteront sans doute que le fumier doit perdre sa force en se desséchant ainsi sur le terrain, qu'il doit être très-difficile de le repartir également sur les champs, & enfin que les animaux, les chars, ou les tombereaux, doivent écraser & tuer un grand nombre de plantes.

Nous répondons à cela que, dans la saison dont il est question, le soleil n'a que peu de chaleur & que l'évaporation est peu considérable, à moins que les vents de Nord-Est ne regnent, & même dans ce cas, ce n'est gueres que la partie aqueuse du fumier qui s'évapore, car les sels volatils n'abandonnent les corps qu'au moyen d'une chaleur assez considérable. Les suc du fumier ont donc tout le temps de pénétrer la terre, avec les pluies, & d'être pompés par les racines : les plantes ont tout le temps de végéter & de protéger le fumier de leur ombre, avant que le soleil soit devenu assez chaud pour faire évaporer les sels.

La seconde objection sur la difficulté de répandre le fumier également sur la surface du champ n'est pas mieux fondée, parce que le

DES ENGRAIS. (311)

fumier bien pourri, se divise & se répand avec une grande facilité. Mais il faut observer ici que dans les cas où l'on applique le fumier sur une récolte en végétation, il ne faut pas former des tas pour les étendre ensuite; il convient de disséminer le fumier depuis le char même ou le tombereau.

Quant à la destruction des plantes, elle ne pourroit avoir lieu que dans le cas où l'on prendroit mal son moment, car si l'on fait l'opération en temps sec, le piétinement sera plus utile que nuisible à la récolte. On fait que les terres à froment, surtout lorsqu'elles ont été chaudées ou fumées, sont souvent soulevées & émiettées par les gels, de manière à n'avoir pas plus de consistance que des taupinieres. C'est un des plus grands dangers auxquels la récolte des blés est exposée, parce que les vents perçans du Nord pénètrent alors jusques aux racines, & font périr les plantes. La protection du fumier est donc singulièrement utile aux plantes dans cette saison là, puisqu'elle leur fournit à-la-fois la chaleur & la nourriture. L'avantage n'est pas moins grand lorsqu'on enterre le fumier à la herse en même temps que la semence de l'orge, surtout dans un terrain léger. Le charriage du fumier, & le piétinement indispensable pour le répandre, donnent à la terre une consistance qui est très-avantageuse, s'il succede une sécheresse; &

au moment où il tombe de la pluie les **sucs** du fumier descendent pour fournir aux racines leur nourriture.

Il faut observer néanmoins que l'opération de fumer sur la récolte ne peut avoir lieu qu'avec du fumier bien pourri, & sur un terrain passablement sec : mais lorsque ces circonstances se trouvent réunies, les produits sont très-considérables, & l'effet est sensible sur plusieurs récoltes.

L'avantage de la chaux, dans la culture des turneps est parfaitement reconnu. Des districts très-étendus, & qui auparavant étoient incultes, ont été mis en valeur au moyen de la chaux, & produisent, non-seulement des turneps en abondance, mais de belles récoltes de *trèfle* & de froment. Il paroît que, pour la culture des turneps dans les terres légères, la chaux fait un excellent effet. Son influence dans de pareilles terres, sur les *trèfles*, les pois & les fèves, est aussi parfaitement reconnue par l'expérience, en sorte que, dans les pays où la chaux est le principal engrais, on ne sème jamais aucune de ces récoltes sans chauffer préalablement. On voit, dans les montagnes, des exemples de cet effet de la chaux sur les plantes à feuilles larges. Lorsqu'un champ, ensemencé de ces plantes, a été partie fumé, partie chauffé, la première portion rend souvent à peine le travail & la semence, tandis que la seconde donne de grands produits.

Il y a presque autant de variété dans la manière d'appliquer la chaux pour les turneps, qu'il y a de fermiers dans un canton. En général on la met sur les champs avant le dernier labour, pour l'enterrer sans herfer, & l'on a soin de la conduire immédiatement après qu'elle est cuite pour la disposer par tas avant qu'elle se soit affoiblie à l'air. La raison que l'on donne de cette dernière attention, c'est que la chaux vive dans le mouvement qu'elle éprouve en s'éteignant, agit avec beaucoup plus de force sur le sol, que ne peut faire de la chaux déjà éteinte. Sans doute que si l'on pouvoit diviser suffisamment la chaux vive pour la mêler intimement avec le sol, elle auroit bien plus d'activité : car la calcination n'étant que l'expulsion de l'eau & de l'acide aérien, & la chaux ayant une extrême tendance à reprendre ces deux composans, elle perd par degrés son état de chaux, pour redevenir une pierre ou terre calcaire, par le seul contact de l'air ; mais la difficulté c'est de la pulvériser sans l'éteindre, & nous blâmons l'usage de mettre la chaux vive en tas sur les champs, par les raisons suivantes.

1°. Si l'on veut la répandre promptement pour l'enterrer à la charrue, on est souvent arrêté par la sécheresse. Il faut qu'il tombe une quantité d'eau suffisante pour que la chaux se divise convenablement, & s'il ne pleut pas, il faut retarder le labour.

2°. S'il ne tombe pas suffisamment d'eau , la chaux ne se pulvérise point assez , & il est impossible de la répandre & de la mêler également.

3°. Enfin , si les pluies sont trop considérables , la chaux après s'être complètement éteinte ; se durcit en gâteaux que l'on ne peut ensuite suffisamment diviser pour les mêler avec le sol. C'est une méthode certainement très-défectueuse , car , en ne hersant pas , & en ne labourant qu'une fois , il est impossible que le mélange s'opere convenablement , & les conséquences en sont évidentes. La semence se trouve en partie en contact immédiat avec la chaux , & en partie dans une terre qui n'a reçu de la chaux aucun bénéfice. Il en résulte , qu'à moins que la saison ne soit extrêmement humide , une partie de la semence ne végete pas , & que les plantes qui végetent foiblement , languissent & séchent sur pied s'il survient des chaleurs.

Les mêmes observations que nous avons faites quant à la manière d'employer la chaux sur les jachères pour le blé , peuvent s'appliquer aux turneps. Plutôt l'on répand cet engrais dans le champ , & plus l'on herse & laboure , pour l'incorporer complètement à la terre , & mieux c'est. Il importe particulièrement , pour cette culture , d'amortir la qualité caustique de la chaux en la faisant agir sur le terrain , & empêcher

qu'elle n'altère la semence. Lors donc qu'on a eu soin de bien opérer le mélange, on ne voit point la récolte des turneps souffrir de la sécheresse, comme cela arrive quand la chaux n'a été qu'entermée. On fait que la chaux dissout les huiles, & lorsqu'elle se trouve en contact avec des semences huileuses, elle les altère sensiblement.

On employe la chaux sur le trefle pour semer de l'avoine. Cette méthode est commune sur les bords de la Tweed, & c'est peut-être la plus mauvaise manière d'employer la chaux. On la répand en automne, & on l'enterre au printemps: le produit est peu proportionné aux frais, & on ne s'en étonnera pas, si l'on réfléchit au procédé. On sème l'avoine sur un seul labour. Si le trefle a été beau, le sillon se souleve tout entier, & soit que le gazon soit à plat dessous, soit que les bandes que prend la charrue ne soient qu'appuyées, la chaux, qu'on avoit répandue sur la surface du terrain, est en grande partie perdue. Si le gazon a été complètement retourné, la semence se trouve séparée de la chaux par un intervalle de trois à quatre pouces que les racines de l'avoine ne percent pas toujours, & si le sol inférieur est sablonneux, la chaux s'enfonce par les pluies & est perdue. — Si les bandes de gazon ne sont qu'appuyées, la chaux glisse au fond des intervalles, où les pluies la font descendre, & elle

(316) , AGRICULTURE.

est bientôt également perdue pour la récolte de l'année, & pour celles qui doivent succéder. Nous avons vu mille exemples de ce fait.

Les fermiers qui employent la chaux de cette manière se plaignent de ce qu'il n'y a pas du profit : cela ne paroîtra pas étonnant après ce que nous venons de dire. Il n'y a aucune méthode moins avantageuse ; il n'y a qu'une raison pour l'adopter, c'est qu'il est commode de pouvoir charrier en tout temps la chaux sur le pré artificiel où on la dépose : c'est aussi le motif que donnent les fermiers pour persister dans une pratique qu'ils avouent n'être pas bonne.

Il y a des parties de l'Angleterre où l'on répand la chaux au printemps, sur les récoltes de blé ou d'autres grains, & sur les prés. D'après toutes les observations que nous avons rassemblées, cette méthode est sujette à beaucoup d'objections, & demande de grands ménagemens. Elle est dangereuse sur les grains quels qu'ils soyent, à moins que la chaux n'ait été mêlée préalablement en compost avec de la terre ou du fumier. Sous cette dernière forme la chaux peut être employée sur la récolte en toute sûreté, & avec profit. Ses qualités stimulantes & caustiques, très-dangereuses pour les jeunes plantes lorsqu'elle est appliquée seule, sont émoussées par leur action sur les huiles, & le mélange fournit une nourriture toute

préparée pour les plantes en végétation.

Nous pensons à-peu près de même quant à l'emploi de la chaux sur les trefles. Elle est d'un très-bon effet dans les prés qui portent des joncs, & une herbe dure ou aigre : elle tue toutes les mauvaises plantes : peut-être est-ce en changeant la nature du sol suffisamment pour le rendre incapable de les nourrir. L'effet de la chaux, sur de telles terres, est encore plus considérable lorsqu'on peut les labourer. Les mauvaises plantes sont plus sûrement détruites dans cette opération. Il convient de rompre ces prairies en été, puis de faire un labour croisé pour l'hiver, en répandant la chaux dessus. On obtient ainsi les deux objets principaux ; c'est-à-dire, que les mauvaises plantes sont complètement détruites, & la chaux intimement mêlée avec le sol pour assurer de belles récoltes.

Observons ici que le chaudage des prés qui ne peuvent pas se labourer est une réparation qui appartient plutôt au propriétaire qu'au fermier, parce que l'amélioration, sous le rapport de la quantité du fourrage, n'est pas en proportion de la dépense, & à moins que le fermier n'ait un long bail, il est impossible qu'il y trouve son compte. Il faut toujours se souvenir qu'un fermier, homme de sens, ne met de l'argent en réparations que lorsqu'il a une espérance raisonnable non-seulement d'être payé

(318) AGRICULTURE.

en principal & intérêts, mais encore de trouver dans les récoltes un profit proportionné aux risques qu'il court & aux travaux qu'il fait.

Pour le propriétaire, le cas est différent. Si la terre est bonifiée de manière à élever la rente en proportion de l'intérêt de la somme dépensée, il ne peut rien perdre; & si les rentrées sont plus considérables, comme cela arrive dans toutes les améliorations bien conduites, le surplus est une compensation pour les risques de l'entreprise, & un stimulant pour de nouvelles réparations.

Donnons maintenant quelques directions sur la manière de préparer la chaux avant de la répandre, & sur la rotation des récoltes que l'on doit adopter dans un terrain chaudé.

Dans tous les cas où l'on emploie la chaux seule, c'est sur les matières contenues dans le sol qu'elle doit agir : il en résulte la nécessité de la mettre en contact avec le plus grand nombre des parties de ce même sol, & pour cela il faut diviser le plus qu'il est possible la chaux & le terrain. Si la chaux reçoit précisément la quantité d'eau qu'il lui faut, elle se réduit en une poudre fine qu'on peut répandre fort également sur le sol, & incorporer exactement avec les molécules de la terre. Mais s'il tombe trop d'eau sur la chaux, elle se forme en gâteaux, comme nous l'avons déjà fait remarquer, & alors elle ne peut plus se diviser.

son effet est beaucoup moindre, il en faut une quantité plus considérable, & l'objet du chaudage n'est jamais si bien rempli.

Le meilleur moyen d'obvier à cet inconvénient, c'est de déposer la chaux à portée d'un ruisseau ou d'un étang pour jeter de l'eau dessus ce qu'il en faut précisément. Cette opération est très-prompte. Une heure suffit pour mettre la chaux en état d'être répandue; & toutes les fois que cela est possible, il faut la conduire, la répandre, & l'enterrer promptement; car outre qu'elle s'affoiblit en demeurant exposée à l'air, elle peut encore se réduire en gâteaux s'il survient des pluies après qu'elle a été étendue. Tous les bons cultivateurs connoissent ce danger, & ils ont pour principe d'enterrer la chaux le plus promptement qu'il se peut.

Cependant, on n'a pas toujours le choix des momens pour les charriages de la chaux : on les fait quelquefois dans les temps où l'on n'est pas pressé d'ouvrages, & où l'on ne peut répandre la chaux parce que les terres ne sont pas prêtes à la recevoir. Dans ces cas là il importe de la disposer de manière à ce qu'elle ne s'altère pas par l'action de l'air, & qu'elle ne se mette point en masses. Après l'avoir mise en poussière, en jetant un peu d'eau dessus, il faut la disposer en un tas étroit & prolongé en dos-d'âne, la recouvrir de trois ou quatre pouces

de terre, puis de chaume, & avoir soin que l'eau puisse s'écouler convenablement tout autour. On peut la conserver ainsi trois ou quatre mois, & la retrouver au moment du besoin, à-peu-près aussi active que si on venoit de la tirer du four.

Les avantages de la chaux dépendent beaucoup de l'assolement que l'on adopte après l'avoir employée. Nous avons dit ci-dessus qu'on a vu quelquefois la stérilité succéder à de belles récoltes obtenues par le moyen de la chaux : c'est toujours aux fautes du fermier qu'il faut attribuer un tel accident. C'est dans les terres légères que cela arrive, toutes les fois, qu'après le chaudage le cultivateur fait successivement plusieurs récoltes de grains. L'expérience a prouvé que les rotations qui conviennent le mieux après le chaudage, sont celles dans lesquelles les grains & les récoltes vertes se succèdent alternativement. Quelques fermiers sement du froment après les turneps chaudés. D'autres, plus intelligens, ne sement jamais que de l'orge ou de l'avoine avec de la graine de trefle. Ces récoltes sont communément belles. Le trefle se rompt à la seconde année, & une récolte d'avoine, ordinairement plus belle encore, succède. On sème ensuite pour mettre des fèves, ou des turneps encore. De cette manière la fertilité du sol se soutient dans les terres les plus pauvres.

Dans

DES ENGRAIS. (321)

Dans les terres glaises où l'on a employé la chaux, les rotations doivent être un peu différentes. On ne doit point cultiver les turneps dans de tels terrains. Ce n'est pas cependant que, quand la saison est favorable, on ne puisse y avoir de belles récoltes de cette racine; mais les saisons pluvieuses leur sont tellement contraires dans ces terrains, & augmentent si fort les difficultés de leur culture; les risques & les inconvéniens du charriage de la récolte sont si grands, que les terres y ont souvent beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Une jachère d'été paroît indispensable dans ces terres fortes. La chaux doit y être répandue en juillet ou août. Trois labours, au moins, & autant de herfages, sont indispensables pour bien incorporer l'engrais; puis un des meilleurs cours que l'on puisse adopter c'est,

- 1^{re}. année . blé.
- 2^{de}. . . . fèves
- 3^e. . . . orge
- 4^e. . . . trèfle
- 5^e. . . . avoine

Nous avons déjà observé que la chaux s'unit aux huiles & aux substances grasses. Or comme les graines de toutes les plantes que nous connoissons contiennent plus ou moins d'huile, la chaux a sur ces graines un effet plus ou moins marqué. Elle tue aussi les insectes; elle détruit certaines plantes & fournit ainsi à la

Agriculture, Vol. 2. N°. 8. Août 1797. R

(322) AGRICULTURE.

nourriture de la récolte, elle agit encore comme un stimulant, elle absorbe l'humidité, enfin elle a un effet mécanique : elle divise le sol, & facilite l'introduction des racines, qui se trouvent ainsi en contact avec un plus grand nombre de points, & peuvent sucer plus de substance de la terre.

La semence d'un grand nombre de plantes annuelles nuisibles dans l'agriculture, & surtout des différentes sortes de moutardes, contient beaucoup d'huile. Ces plantes sont très-embarassantes pour les fermiers dans les terres légères, car, si immédiatement après la semaille du printemps, il survient une pluie, ces mauvaises herbes lèvent en si grande quantité qu'elles ruinent la récolte. On dit alors qu'elles ont étouffé le grain. Sans doute que c'est en partie la raison du mauvais succès ; mais la véritable cause est peut-être la quantité d'huile & de principes utiles à la végétation, qui se trouve absorbée par ces plantes : quantité probablement beaucoup plus considérable que celle qui seroit nécessaire à une récolte de grains, & dont celle-ci se trouve frustrée.

Cela explique d'une manière assez satisfaisante ce qu'on observe quelquefois, c'est que le sol est plus épuisé après une mauvaise récolte, qu'après une bonne. Il n'y a peut-être aucune production, si ce n'est le chanvre le lin, & le colza quand on le laisse monter

en graine, qui épuise d'avantage le sol, que les plantes annuelles à graines huileuses, telles que les moutardes.

La chaux, bien employée, est le vrai remède quand le terrain est empoisonné de ces graines; & le moyen le plus sûr pour la rendre utile, c'est de la bien incorporer à la terre, & de mettre ensuite la piece en pré artificiel pour deux ou trois ans. Au bout de ce temps là, non-seulement les mauvaises semences se trouveront détruites, mais leur huile aura enrichi le sol, & nourrira le grain qui succédera. Ce dernier objet a beaucoup d'importance; car si l'on considère le nombre prodigieux des semences annuelles que contiennent les terres légères, on se convaincra qu'il doit résulter de leur destruction, une quantité considérable de nourriture de la meilleure qualité pour les récoltes de grains. Détruire les mauvaises herbes, est un grand point; créer un engrais est un autre très-important; & enfin il y a beaucoup d'avantage dans la destruction des limaçons & autres insectes que la chaux ne manque pas de tuer.

CORRESPONDANCE.

OBSERVATIONS d'un AGRICULTEUR
du Pays de Vaud.

Messieurs ,

• **J**E cultive , depuis une quinzaine d'années ; le froment blanc , ainsi nommé dans ce pays , & *rouzelle blanche* dans les Départemens méridionaux de France. Je lui donne une préférence très-décidée sur le froment rouge ordinaire du pays. Il a le mérite , essentiel pour moi , de réussir beaucoup mieux dans les terres légères ; il produit , à-peu-près , le double de celui-ci , donne une farine & un pain superbes. Mais il a le grand défaut , commun au reste , à presque toutes les plantes qui ne sont point naturalisées dans notre climat , de dégénérer facilement ; il a aussi celui d'être porté par des tiges peu fibreuses , & de verser plus aisément que l'autre , enfin d'être plus sujet à germer , s'il survient des pluies , pendant la moisson ; mais surtout à la nielle connue ici sous le nom de charbon. ,

» Ces particularités vous sont sans doute déjà connues , Messieurs , instruits comme vous l'êtes , non-seulement dans la théorie , mais encore dans la pratique de notre agriculture. Cependant , j'ose croire

que vous n'avez pas été à portée de faire une observation relative à la nielle, observation qui, si je ne me trompe, pourroit devenir très-utile, & dont je viens vous rendre compte.

» Quoique attaché, comme je l'ai dit, au froment blanc, pour ses excellentes qualités, j'avois le chagrin, de me trouver, en quelque sorte, forcé à y renoncer à cause de sa malheureuse disposition à la nielle. Toutefois, j'avois entendu parler de diverses préparations des semences, pour prévenir cet accident. Je me décidai à en faire l'essai; mais un essai qui pût servir de base à mes opérations pour la suite. Je destinai à cette expérience environ demi-pose de terrain. Ce terrain fut divisé très-exactement en trente parties. Chacune de ces parties reçut la semence que je distribuai avec une exactitude scrupuleuse, soit pour la quantité, soit quant à la séparation parfaite. Mon froment avoit été horriblement niellé, cette année-là. C'est de ce blé que je pris pour mes essais, après l'avoir lavé convenablement. La matière principale de ces préparations étoit la chaux, disposée de différentes manières. Elle étoit mêlée avec différens égouts de fumier de basse cour, avec du fumier de pigeons, du fumier de cochons; elle entroit dans différentes combinaisons de cendres avec du sel, avec du fumier, &c.— Et pour servir de pièces de comparaison, j'avois réservé deux divisions qui reçurent la même

quantité des mêmes semences lavées, mais sans aucune préparation. Le tout fut semé, presqu'à la même heure, en terre convenablement humide, vers le 10 septembre, c'est-à-dire environ 15 jours ou 3 semaines avant l'époque ordinaire où l'on sème dans notre district. Ce fut un hasard très-heureux pour moi, que cette prématuration. Je la dus à ce que je me trouvois libre alors, que je prévoyois de ne point l'être plus tard, & que cependant il importoit de ne confier qu'à moi seul, toutes mes petites expériences. »

» Tous mes essais levèrent très-bien & étoient d'une grande force, à la fin de l'automne, excepté, 1°. ceux qui étoient préparés avec de la chaux vive & où elle dominoit ; 2°. les deux qui n'avoient pas reçu de préparation : mais ceux-ci néanmoins surpassoient de beaucoup les précédens en vigueur. Il n'est pas inutile d'observer que le temps qui avoit succédé immédiatement à mon semis avoit été très-beau. »

» Je semai, cette même année là, mais au commencement d'octobre, & ensuite vers le milieu du mois, un champ de plusieurs poses, du même froment dont j'avois pris pour mon expérience, & également lavé. Cette semaille fut accompagnée de pluies longues & froides. »

» Au printemps suivant, je remarquai que les parties où les semences avoient été préparées avec la chaux étoient, en proportion de la

chaux qu'ils avoient reçue , moindres que tous les autres ; & même la division où j'avois mis la graine préparée avec de la chaux vive ne portoit presque plus de plantes. Je remarquai encore , & avec une sorte de chagrin , que les deux divisions qui portoient les semences non-préparées , pour pieces de comparaison , étoient plus belles que toutes les autres. C'étoit l'époque où le blé avoit tallé. »

» Mais quel ne fut pas mon étonnement , & je pourrois presque dire , ma joie , à la moisson ! Dans tous mes essais , il ne se trouva pas un seul épi niéglé. — Les essais non-préparés me donnerent plus de blé que les mieux réussis des autres. Le froment de ma récolte en grand fut , au contraire , horriblement maltraité du charbon. »

» Reprenant ensuite toutes les circonstances de mes essais & de mes semailles , il me fut aisé de conjecturer que la différence si considérable entre les deux résultats ne venoit point des préparations faites aux semences , mais de la saison où mes essais avoient été semés , & du temps qui avoit régné immédiatement après l'une & l'autre semaille. Il y avoit de quoi fonder mes conjectures ; toutefois , il y avoit encore quelques degrés de là jusqu'à l'évidence. Je résolus d'arriver à celle-ci , s'il étoit possible. J'avois disposé du terrain pour semer de la luzerne pure à la fin d'août. Ce terrain me parut pro-

(328) AGRICULTURE.

pre au nouvel essai, d'autant plus, que quelques plantes de blé pourroient servir à garantir la luzerne des rigueurs de l'hiver. »

» Je pris, à dessein, du froment bien charbonné, que je ne lavai point, auquel je ne fis subir aucune préparation. Je le semai sur une partie de mon terrain, au commencement de septembre, en même temps que je semai l'autre partie, du même blé, mais lavé, & sans autre préparation. J'eus néanmoins, la précaution de semer plus épais que je n'aurois fait sans la circonstance du charbon qu'il étoit naturel de supposer avoir détruit le germe d'un grand nombre de grains. »

» Mon blé devint beaucoup trop fort déjà en automne. Il est vrai que, comme je l'ai dit, le terrain avoit été disposé à recevoir de la luzerne. Au printemps, il se trouva très-fort encore. Vous jugez, Messieurs, par l'intérêt que j'y mettois, que j'étois là, presque à examiner les épis, à mesure qu'ils paroissent. Je n'en fus appercevoir aucun, ni avant la moisson, ni pendant la moisson, qui fût attaqué de la nielle. A la vérité, il étoit complètement versé. Les pluies survinrent pendant la récolte, & il fut entièrement germé, ou ce que nous appelons *moncheré* dans le pays. Il seroit difficile de trouver du blé de plus mauvaise qualité que celui-là ; mais je n'y découvris, dans l'une ni dans l'autre partie, aucun épi niellé. »

» Malgré l'accident de la germination, je crus avoir atteint le degré de certitude qui me suffisoit. Je bornai là mes essais en ce genre. Dès-lors, j'ai semé, de bonne heure, cette espece de froment, & en terre suffisamment amendée. Je continue de semer de même, depuis une douzaine d'années, & j'ai la satisfaction de ne plus récolter de blé niellé, ou, si cela est arrivé, c'est en quantité si petite, qu'elle ne sauroit faire sensation. Cette expérience si souvent réitérée, & que je vous affirme en toute intégrité, vaut bien, je pense, une suite d'autres petits essais que j'aurois pû continuer. »

» Voilà, Messieurs, des résultats bien différens de ceux publiés par Mr. Wimpey, & que vous avez inférés dans votre N^o. 34, sur les causes de la nielle ou charbon. D'après les observations que j'ai l'honneur de vous communiquer, ne serois-je point autorisé à croire que cet accident doit être moins attribué au vice des semences, ou au temps qui régne durant la floraison, qu'à l'époque tardive des semailles, & aux pluies froides qui leur succèdent immédiatement. Si mes petites expériences sur cet objet méritent quelque considération auprès de vous, vous voudrez bien, sans doute, chercher à expliquer la cause de cette différence de résultat. Pour moi, je suis trop ignorant pour me flatter de le faire d'une manière satisfaisante. »

» Il résulte de plus de l'essai que j'ai fait avec du froment extrêmement charbonné qui , sans avoir été soumis à aucune correction , pas même du lavage , n'a produit aucun épi charbonné , que ce vice ne se propage point , au contraire de ce que dit encore Mr. Wimpey. Il est vrai cependant , que je n'ai pas réitéré l'essai , & que le résultat à cet égard pourroit être attribué à quelque circonstance qui auroit échappé à toute mon exactitude , & vous savez , Messieurs , que le plus habile ne peut espérer de les saisir toutes ; mais il est plus vrai encore que , malgré la probabilité que je crois avoir obtenue sur ce point , je ne hasarderois jamais de semer du blé entaché de ce vice , tant que je pourrois m'en procurer qui en seroit exempt. »

Nous remercions l'auteur des observations ci-dessus. Ses expériences paroissent avoir été faites avec soin ; & elles annoncent un esprit sage , & la connoissance des détails. Leurs résultats sont en opposition apparente avec ceux des expériences de Mr. Wimpey dont nous avons rendu compte. Il ne faut pas trop s'en étonner. Il y a certaines parties de la science de l'agriculture dans lesquelles l'observateur trouve à chaque pas de nouveaux mystères : ce qui tient à l'influence des semailles sur les récoltes , n'est point encore suffisamment éclairci , & ne la

fera peut-être jamais d'une manière complète & satisfaisante. Dans la carrière des expériences, les esprits sages se distinguent par le doute, & dans la pratique ils se conduisent d'après les probabilités bien calculées. Les cultivateurs qui, comme nous, emploient depuis plus de vingt ans le chaulage pour les semences *sans avoir jamais recueilli de blé charbonné*, & qui voyent tous les ans la maladie du charbon chez leurs voisins, sont fondés à croire que cette préparation n'est pas inutile. On connoit, sur cette matière, les beaux travaux de Mr. Tillet, & de tant d'autres agriculteurs de mérite. On fait que l'Abbé Rozier, en parlant des lessives préparatoires pour les semences, dit « que leur » efficacité est confirmée par l'expérience de tous » les jours & de tous les lieux. » Cependant il peut y avoir des causes concomitantes qui contrarient, ou affoiblissent, les bons effets qu'on ne peut gueres refuser à la chaux. Il y a toujours à gagner à rassembler des faits, mais il importe beaucoup à l'avancement de l'art de ne pas se hâter de conclure, pour établir des principes exclusifs.

C'est une opinion reçue parmi nos vieux cultivateurs, que l'on a moins de chances de nielle en semant le plutôt que l'on peut dans la saison ; mais ceux-là même qui sont persuadés de l'efficacité de la précaution des semailles hâtives, ne peuvent pas toujours l'employer ; parce que

dans une grande exploitation , on ne peut **pas** expédier les labours à volonté ; parce que les sécheresses ou les pluies peuvent contrarier les ouvrages ; parce que la rareté des foin**s** peut engager à rompre les tress**e**s tard ; parce que dans certaines terres les blés trop avancés en automne languissent ensuite au printemps ; & par beaucoup d'autres raisons encore dont l'énumération seroit de trop pour les habiles , & inutile aux ignorans. Nous allons donner , en confirmation des idées de notre correspondant du Pays de Vaud , l'extrait d'une lettre d'un bon cultivateur de notre voisinage que nous venons de recevoir.

« Je vais vous faire part d'un fait qui n'est peut être point nouveau , mais qui l'est pour moi ; & je suis curieux de savoir si vous en tirez la même conclusion que j'en tire : c'est que les semailles tardives ne conviennent pas à notre pays , ou à notre canton. Un ancien domestique m'avoit dit souvent qu'il avoit presque toujours vu les blés semés tard réussir moins bien que les autres : ce qu'il attribuoit en partie au charbon ou nielle , dont ils étoient attaqués. L'année dernière , presque tous mes champs furent semés dans la première quinzaine de septembre. Le blé de semence avoit été soigneusement lavé à l'eau simple , parce qu'au sortir de la grange il offroit quelques traces de charbon , & étoit ce qu'on appelle légèrement *moucheté*. J'ai eu ,

à la moisson , trois ou quatre de ces champs , premiers semés , remarquablement beaux & au rapport des ouvriers comme d'après ma propre inspection , on n'y appercevoit aucun épi charbonné. Un seul a donné une mauvaise récolte , remplie d'épis dont le grain étoit *retrait* , & avec un assez grand nombre d'épis charbonnés. Il avoit été semé le 21 septembre. J'essayai aussi de semer le 30 octobre sur une portion de pré rompu l'hiver précédent , & qui avoit donné une récolte de pommes de terres , racines d'abondance , & raves. La semence fut exactement la même que celle employée sur les autres champs , & répandue fort clair. Ce blé fut pris par les mauvais temps & le froid avant d'être levé ; mais quelques jours chauds le firent pousser , & au printemps , quoiqu'il fût clair , il s'étoit cependant bien raccommode. Ce ne fut que lorsqu'il eut épié que je m'aperçus qu'il étoit rempli d'épis charbonnés. Ils se sont développés de mieux en mieux jusqu'à la moisson , & je ne crois pas exagérer en en faisant monter le nombre à la sixième partie du tout .

Garchy, près Pouilly. (Nièvre)
le 20 Thermidor, 3^{me} année.

Messieurs ,

LA note relative à la chicorée sauvage, considérée comme prairie artificielle, que vous avez insérée dans votre collection, tom. V pag. 217, me décide à vous communiquer quelques expériences que j'ai faites. Au commencement de floréal, an 4, j'ai rendu compte de quelques essais sur cette plante (*Feuille du Cultivateur*, tom. VI pag. 157) : il en résulte que, circonstances égales, dans le canton que j'habite, la chicorée est moins précoce que la luzerne, & je puis ajouter actuellement moins productive. La continuation de l'expérience me confirme ce que je pensois alors, c'est que la plante doit réussir davantage dans un pays dont l'atmosphère est habituellement humide, comme l'Angleterre, que dans les climats secs qui composent la grande majorité de la France.

J'annonçois alors que j'en avois semé avec du trèfle pour observer, dans ce mélange, si la chicorée pourroit peut-être en balancer l'effet quelquefois dangereux. Ma prairie a bien levé, le trèfle étoit beau, mais gêné par l'expansion horizontale des feuilles de la chicorée. Cette circonstance & l'état de dépérissement de mes chevaux, causé par des foins qui avoient été inondés, me décidèrent ce printemps à leur abandonner cette prairie pour pacage; bientôt ils se sont rétablis, mais ils ont mangé le trèfle & laissé la chicorée; les vaches les ont suivis, elles ont brouté les restes des chevaux, sans toucher à la chicorée qui montoit en fleurs: mes bêtes à laine espagnoles ont

CORRESPONDANCE. (335)

Juivi & ont mangé quelques-unes des tiges en fleurs , mais de loin en loin , tandis qu'elles recherchoient avidement les feuilles éparfes du trefle.

Voilà donc une fuccelfion d'animaux qui n'ont aucun goût pour la chicorée , & fi Crette Palluel a vu fes beftiaux la dévorer , c'eft à l'étable où aucune autre plante ne s'offroit à la comparaifon ; en effet , je l'ai fait manger aux vaches de cette maniere. Cependant je ne renonce pas abfolument à la chicorée ; fes qualités médicales peuvent la rendre avantageufe au printemps , faifon où tous les animaux fouffrent plus ou moins : je vais encore varier mes effais pour combiner cet avantage avec celui du produit.

Permettez-moi de finir cette lettre par quelques obfervations fur vos articles d'Agriculture. Autant les François adoptent avidement les pratiques étrangères , autant les Anglois ont la manie de blâmer ce qui n'eft pas inventé par eux. L'inhabitude de notre langue eft , pour beaucoup d'agronomes Anglois , une raifon fuffifante pour déprimer leurs rivaux en France ; mais il feroit à défirer que vous , qui formez un point intermédiaire entr'eux & nous , vous fifſiez connoître dans votre collection , l'injuftice de leurs farcafmes très-multipliés , & l'identité des travaux chez les deux Nations. Rozier , qu'ils ne fe donnent pas la peine de citer , a fait les articles *Alterner* & *Agriculture* de fon Dictionnaire , dans un temps où l'on ne penfoit gueres aux ouvrages d'Arthur Young. L'obfervation que je vous fais eft venue à l'efprit de plufieurs perſonnes , & je m'emprefſe de vous la communiquer ; votre entreprife eft trop intéreffante pour qu'on ne défire pas de la voir tendre à fa perfection , &c.

L. REYNIER.


(336) AGRICULTURE, &c.

NB. J'ouvre en ce moment l'*Encyclopédie Méthodique*, division d'*Agriculture*, article *Chicorée*, où le C. Teffier annonce des résultats pareillement défavorables dans les expériences qu'il a faites sur cette plante.

Nous remercions Mr. Reynier de la communication qu'il veut bien nous faire. Nous dirons un mot sur l'observation qui termine sa lettre.

Sans prétendre justifier ce que la jalousie nationale peut avoir dicté d'exagéré ou d'injuste à quelques agronomes Anglais, nous observerons que le ton du sarcasme sur les méthodes de culture étrangères à leur pays, n'est pas ordinaire à ces écrivains : ils cherchent, en général, à prendre le bon partout où il se trouve ; mais ils ne sauroient reconnoître l'identité des travaux chez les deux nations, car cette identité n'existe pas. Si l'on met à part les productions qui sont particulières à la France, il n'y a aucune comparaison entre les ressources que l'art fait tirer d'une même étendue de terrain, de même qualité, dans les deux pays. Le nombre des bestiaux nourris, & la quantité de grains produits sont de beaucoup à l'avantage de la culture anglaise. L'Abbé Rozier (qui, au reste, n'a commencé son estimable ouvrage que onze ans après la publication de celui qui a fondé la réputation d'Arthur Young) a donné, dans son article *alterner*, des idées sages, mais fort incomplètes, si on les compare à l'ensemble de la partie des assolements, bien entendue. On doit regretter qu'un si bon esprit n'ait pas été exempt des préventions qui tiennent aux rivalités nationales : il se seroit rendu tout autrement utile s'il eût étudié en Angleterre cette branche essentielle de l'art. (R)

Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.			OBSERVATIONS Diverses.
L. du S.	2 h.	du C. S.	
D. dix.	D. dix.	D. dix.	
+17. 3	+18. 0	+18. 3	La sécheresse soutenue a fait beaucoup dimi- nuer les regains, & a réduit les sources plus bas qu'on ne se rappelle de les avoir vues depuis très-longtems : dans quelques endroits l'eau a manqué tout-à-fait. Les sarrasins sont en gé- néral chétifs. Les raisins ont commencé à chan- ger dès le 20, mais la vendange ne promet pas d'être considérable. Les trèfles semés au prin- temps de cette année ont généralement bien réussi. Ceux que l'on a gypsé dans ce mois, n'ont pas sensiblement profité par cette opéra- tion, faute de pluie. Les jachères sont parfaite- ment purgées d'herbe. Les blés qu'on a battus pour semer rendent à- peu-près à raison de cinq gerbes (de 7 pieds de France de tour) pour une coupe pesant 110 à 115 liv. de 18 onces, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne.
17. 7	17. 5	17. 5	
16. 0	16. 7	16. 7	
15. 3	16. 5	16. 5	
15. 3	16. 5	16. 5	
15. 3	16. 3	16. 3	
14. 7	16. 0	16. 0	
14. 5	16. 0	16. 3	
15. 5	16. 7	16. 7	
16. 0	16. 7	16. 7	
15. 5	17. 0	17. 0	
16. 5	17. 5	17. 5	
17. 0	17. 3	17. 3	
16. 0	17. 0	17. 0	
15. 3	16. 5	16. 5	
16. 5	17. 0	17. 0	
16. 0	17. 0	17. 0	
16. 0	17. 0	17. 3	
17. 0	16. 0	16. 0	
14. 7	15. 7	16. 0	
14. 5	16. 0	16. 0	
15. 3	15. 5	15. 5	
13. 7	15. 0	15. 0	
13. 0	14. 7	14. 7	
12. 5	14. 5	14. 5	
12. 5	14. 7	14. 7	
13. 5	15. 3	15. 3	
14. 0	15. 5	15. 5	
14. 5	16. 0	16. 0	
15. 0	16. 5	16. 5	
16. 0	16. 5	16. 5	
+15,24	+16,29	+16,33	



A G R I C U L T U R E.

ON MANURES , &c. Des engrais ; tiré du XV^e chapitre de l'Esquisse du rapport général du Département d'Agriculture , sur l'état actuel de l'Agriculture de la Grande Bretagne. (Voy. les 2 N^{os}. précédens).

EN considérant la chaux comme une substance qui opère sur les corps organisés que le sol contient , en même temps qu'elle agit mécaniquement sur le sol lui-même , nous voyons d'abord la convenance d'appliquer tout-à-la-fois la dose nécessaire pour opérer ces effets : si le sol est profond , & la quantité peu considérable , l'influence de la chaux est à peine sensible , & l'engrais est perdu , au lieu que si la quantité eût été suffisante l'effet en auroit été très-utile. Ce sont des demi-essais qui souvent ont dégoûté les fermiers de l'usage de la chaux dans leurs terres : avec plus d'attention & d'exactitude dans leurs expériences , ils auroient vu que la quantité employée étoit insuffisante.

Nous dirons un mot , à cette occasion , de l'usage de certains Comtés où les baux obligent les fermiers à répandre , de quatre en quatre ans , une certaine quantité de chaux sur

(338) AGRICULTURE.

les terres. Nous avons examiné avec soin les rapports de ces Comtés, & nous n'avons pas su trouver de bonne raison de cette singulière pratique. Dans les cantons où la plupart des Fermiers ont des baux d'un an seulement, les clauses restrictives sont convenables; mais obliger un fermier à répandre sur toutes les terres, quelle que soit leur qualité, une certaine quantité de chaux à des époques fixes, c'est une absurdité évidente; car tout le monde fait que la dose de la chaux doit varier selon le terrain. Si, donc, la quantité que le fermier s'engage à répandre sur les terres argileuses, est suffisante, elle sera trop considérable pour les terrains légers. Voilà le premier inconvénient d'une pareille stipulation. Mais il y a un autre inconvénient plus grave: c'est que si la première fois, l'on a répandu assez de chaux, le renouvellement du chaudage fait beaucoup de mal.

On dit, pour défendre cet usage, que la quantité qu'on répand à chaque fois est si peu considérable, qu'il faut la répéter souvent pour rendre l'opération utile. Cet argument n'a aucune solidité. Nous avons déjà indiqué pour quoi une petite dose de chaux reste sans effet, à moins que le sol ne soit très-léger; & il faut être fort ignorant pour penser qu'une quantité insuffisante demeurera en terre pendant plusieurs années en conservant ses qualités, &

pourra devenir efficace par l'addition d'une nouvelle dose. Le sens commun condamne cet usage, qui est à-la-fois ruineux pour le fermier & pour la terre ; car nous avons vu que , lorsque la quantité de chaux n'est pas proportionnée à la qualité de la terre , cette substance nuit quelquefois au sol , au lieu de le rendre fertile.

Nous ne saurions donc trop répéter qu'il faut proportionner la quantité de chaux à la qualité du sol ; car ce qui suffit à une terre ne fera aucun effet sensible sur une autre ; mais lorsqu'une fois on a mis sur un champ la dose de chaux qu'il lui faut , on ne doit jamais y revenir , à moins que ce ne soit avec de la chaux mêlée de fumier.

C'est sous cette dernière forme que l'emploi de cette substance est particulièrement avantageux , parce qu'au lieu d'agir comme stimulant , elle agit alors comme aliment de la végétation ; c'est-à-dire qu'en réduisant à un état de putréfaction complète les substances avec lesquelles on la mêle , elle augmente leur faculté nutritive. On peut alors l'employer à plusieurs reprises sur la même terre , & toujours avec le même succès. Si au lieu de la clause absurde de faire chauffer par les fermiers tous les trois ou quatre ans , les propriétaires , exigeoient d'eux de mettre , pour les turneps ou pour le blé , du compost de fumier , terre , & chaux , les uns & les autres y gagneroient beaucoup.

Le remède, pour les cas où l'on a répandu trop de chaux sur une terre, se trouve dans les substances grasses & mucilagineuses, telles que le fumier d'étable, les plantes de rivière, les gâteaux de colza. Il faut ensuite éviter de faire deux récoltes consécutives en blé; mais au contraire mettre le terrain en pré pour quelques années, ce qui lui rendra son ancienne fertilité.

Nous ne devons pas terminer cet article sans revenir encore sur la manière de mêler la chaux avec la terre. Nous avons observé que pour la rendre utile, il faut la mêler intimement au moyen des labours & des hersages. Il faut d'abord faire attention à la manière de l'étendre sur le sol : cette opération doit toujours se faire en temps calme, & avec beaucoup de régularité. S'il fait du vent, la personne qui répand la chaux en sera extrêmement incommodée, & jugera fort mal de l'égalité avec laquelle elle se trouvera répandue. Le hersage ordinaire ne sauroit ensuite suffire pour bien mêler la chaux à la terre : il faut employer d'abord des fagots d'épines liés sous deux herbes réunies, ensuite herse le terrain avec les instrumens ordinaires, ce qu'on ne sauroit en quelque sorte, répéter trop souvent, puisque ce n'est qu'à force de herse que le mélange intime s'opère.

Le second objet qui mérite l'attention c'est le labourage. Moins la quantité de chaux a été

considérable, & plus il importe de ne pas labourer trop bas; puisque non-seulement on placeroit la chaux hors de la portée des racines, mais encore on la mèleroit à une quantité trop considérable de terre pour que son effet sur celle-ci pût être sensible. Le premier labour ne doit donc piquer qu'à deux ou trois pouces, & les labours subséquens qu'à quatre pouces au plus, afin que l'action de la chaux, bornée à une moindre quantité de terre, demeure plus sensible, & soit aussi plus durable.

Nous citerons, comme une curiosité de l'agriculture anglaise, l'usage du Derbyshire de mettre de 500 à 600 bushels de chaux sur un acre de tourbe, & d'élever ainsi tout-à-coup la rente depuis un shelling jusqu'à 25. Il est évident que cela ne peut se faire que dans les endroits où la pierre à chaux abonde, & où le combustible est à très-bon marché.

La craie, dans son état naturel, est un engrais qu'on peut employer d'après les mêmes principes que la marne, & les terres calcaires; mais la craie étant une terre calcaire presque pure, tandis que la plus riche marne que nous ayons ne contient qu'environ un quart de son poids (1) de terre calcaire, il faut répandre

(1) Ceci ne s'accorde pas avec ce que dit Marshall des marnes de Norfolk. (Voy. le I^{er}. vol. d'Agriculture p. 65.)

moins de craie sur une terre quelconque que l'on n'y mettroit de marne. Ceci doit s'entendre de la craie dans son état naturel, car dès qu'elle est cuite, elle participe à toutes les qualités de la chaux, & doit être employée exactement de la même manière.

La craie abonde dans les provinces méridionales d'Angleterre, & y est fort employée. Les terrains où elle a le plus d'effet sont les terres profondes, & les glaises de peu de fond qui ne contiennent point de terre calcaire. Elle ne fait que peu ou point de bien lorsque la couche inférieure est de la craie; & elle fait du mal lorsque la terre est très-légère, & de peu d'épaisseur. Pour employer la craie sur les terrains légers; il faut la mêler en compost avec la terre & le fumier. Lorsque ces composts sont faits dans les proportions convenables, & mélangés avec soin, ils produisent sur le sol des effets sensibles pendant plusieurs années.

L'usage ordinaire est de répandre le compost sur la jachère pour le blé, ou sur les prés en hiver. Dans les deux cas l'effet en est très-bon. Sur les prés, il détruit la mousse, les joncs, & toutes les plantes aquatiques qui croissent dans les terres aigres & froides : sur les jachères il ouvre & ameublir la terre, & ne manque pas de produire de bonnes récoltes.

Lorsque la craie s'emploie sans calcination préalable, il faut avoir soin de la briser autant

qu'il est possible. Cette opération devient facile lorsque la craie se tire de la carrière à la fin de l'automne, & se répand immédiatement. L'humidité, dont l'atmosphère est ordinairement chargée dans cette saison là, est absorbée par la craie. Elle s'enfle, & se brise d'elle-même. Mais lorsqu'on la tire en été, & qu'elle reste exposée à un air sec & chaud, elle se durcit, & devient en grande partie inutile. Il faut alors la briser avec des massues, car on ne doit jamais l'enterrer à la charrue qu'après l'avoir mise en état de se mêler intimement à la terre ; on peut ici appliquer à la craie ce que nous avons dit précédemment de la chaux : il faut mettre en contact avec les molécules de la terre, le plus grand nombre des parties de l'engrais.

Quant à l'usage de mêler du fumier à la craie, il faut se régler d'après la nature des terrains. Lorsque la terre est légère & de peu de fond, l'addition du fumier est très-convenable, mais dans les terres fortes & profondes, le mélange du fumier n'est point nécessaire, & il ne fait qu'affaiblir l'action de la craie. Quand une fois, cependant, une terre a été complètement amendée avec de la craie, il ne faut plus revenir à cet engrais pur, mais s'il ne fait qu'entrer comme composant dans le compost, il réussit bien. L'expérience comparative a été faite dans une des provinces du Midi, où l'on emploie beaucoup la craie. Un champ qui avoit

été autrefois amendé avec cette substance ; divisé en bandes dont les unes étoient préparées avec de la craie , & les autres avec le compost de craie & fumier , a donné dans les premières divisions une très-mauvaise récolte , & dans les autres une très-bonne.

La marne est une substance qui contient de la terre calcaire , & qu'on trouve à diverses profondeurs , & dans diverses situations. Elle est employée dans toute la Grande Bretagne , & l'expérience a démontré sa grande utilité dans l'agriculture. On la distingue , selon ses composans , en *marne argileuse* , (clay-marl) *marne pierreuse* (stone-marl) *marne schisteuse* (slate-marl) & *marne coquillere* (shell-marl).

La marne argileuse ressemble fort à la terre glaise , & en contient une grande quantité. Elle varie beaucoup pour la couleur.

La marne pierreuse est ainsi nommée à cause de sa dureté , elle est moins aisément soluble dans l'eau que la précédente.

La marne schisteuse se trouve en couches ou feuillets minces : elle est plus dure que la marne argileuse , & plus tendre que la marne pierreuse. Elle se dissout aussi difficilement dans l'eau.

La marne coquillere est aisée à distinguer de toute autre ; par les coquilles qu'elle contient , & par son extrême légèreté. On la trouve souvent dans des endroits qui ont été recouverts

DES ENGRAIS. (345)

par des eaux stagnantes. Lorsque ses coquilles ne sont pas très-anciennes , & que l'émail existe encore sur leur face extérieure , la marne a peu de valeur ; mais lorsque les coquilles sont déjà en grande partie décomposées , c'est de beaucoup la plus riche & la plus efficace que nous connoissons.

L'avantage des marnes , en agriculture , est principalement dû à la quantité de terre calcaire qu'elles contiennent , & elles sont plus ou moins efficaces , à raison de ce qu'il en entre plus ou moins dans leur composition. Le caractère distinctif d'une bonne marne , est la promptitude de son effervescence avec les acides. On peut se servir de ce procédé pour déterminer la quantité de terre calcaire contenue dans la marne , circonstance importante pour les cultivateurs. Voici comment on doit s'y prendre pour s'assurer de la bonté d'une marne.

Après avoir fait sécher une certaine quantité de la substance qu'on veut éprouver , soit à un soleil ardent , soit en la tenant sur le feu pendant une demi-heure , il faut la réduire en poudre fine ; puis la délayer dans l'eau. On ajoute ensuite à cette eau un peu d'acide nitreux , qu'on y laisse tomber goutte par goutte , & en les comptant , jusqu'à - ce que l'effervescence cesse. On met alors , dans un verre , le même nombre de gouttes du même acide , avec une demi-cuillerée d'eau. On laisse tomber peu-à-

peu dans ce mélange de la pierre calcaire réduite en poudre fine, & en ayant soin de remuer le verre à chaque fois qu'on en ajoute, jusqu'à ce que l'effervescence cesse. Comme la quantité d'acide, dans les deux cas, est la même, la quantité de terre calcaire employée dans la seconde expérience, sera exactement la même que celle qui se trouvoit contenue dans la marne employée pour la première. Cette connoissance peut servir à diriger les fermiers sur la quantité de cette substance qu'ils doivent répandre pour un acre.

Il faut observer, néanmoins, que dans toutes les marnes, la terre calcaire, contenant de l'air fixe & de l'eau, a une action beaucoup moindre sur le sol que la chaux : il faut donc beaucoup plus de terre calcaire contenue dans la marne pour faire un certain effet, qu'il ne faut de chaux vive.

En parlant de la chaux, nous avons blâmé l'usage de la répandre sur les récoltes ; mais il n'en est pas de même de la marne, parce que la terre calcaire ne possède point les qualités caustiques de la chaux. On peut donc l'employer, en toute sûreté, sur les récoltes en végétation, surtout dans les terres légères. L'argile contenue dans la marne ajoute alors à la consistance du sol ; & cet engrais détruit efficacement l'oseille sauvage, dont les terres légères sont souvent infestées.

Nous doutons de l'utilité de la marne sur les prairies humides , principalement si l'herbe est rude , & mêlée de joncs. Pour la rendre efficace dans de telles situations , il faudroit en mettre une quantité très-considérable , & même alors , son effet ne peut jamais être si utile que celui de la chaux parce que celle-ci , non-seulement tue toutes les plantes nuisibles telles que les roseaux , mais en accélère la putréfaction , & enrichit le sol en épurant ses productions. Il faut encore remarquer que la partie argileuse de la marne , qui est très-utile sur les terres légères , est perdue sur les prairies basses , qui sont en général d'une terre grasse & substantielle.

Il suit de là que , dans tous les cas , où l'on peut se procurer de la chaux & de la marne avec une égale facilité , il faut donner la préférence à la chaux dans les terres profondes , dans les prés aigres , & mouilleux ; & à la marne , pour les terres légères , graveleuses , & peu profondes. Jamais , peut-être , la marne ne peut être employée avec plus d'effet que sur ces terrains légers , mis en prés artificiels. L'expérience des fermiers , dans les endroits où l'on emploie beaucoup la marne , confirme ce principe ; & il n'y a probablement aucun moyen possible d'employer les terres sablonneuses ou graveleuses plus utilement , que de les amen-

der par la marne après les avoir mises en prés artificiels (1).

En donnant décidément la préférence aux terres légères pour l'emploi de la marne, nous n'entendons pas condamner son usage sur les autres terrains ; nous pensons au contraire qu'elle est très utile sur les glaises, pourvu qu'elle y soit appliquée en quantité suffisante, & que la marne soit choisie avec jugement. La marne argileuse ou pierreuse y fait plutôt du mal que du bien ; mais les marnes coquillères ou schisteuses rendent les terres fortes plus meubles, plus aisées à travailler & à pénétrer par les pluies.

Il existe deux substances qui, sans être des marnes, leur ressemblent singulièrement. La première est une sorte de pierre onctueuse & tendre, de diverses couleurs, composée d'argile & de magnésie. Cette substance ne fait pas effervescence avec les acides ; mais d'après ses composans, on peut la juger utile dans tous les cas où la marne le seroit. L'autre substance est d'une couleur bleuâtre, & ressemble beaucoup à la marne argileuse. Elle est extrêmement nuisible à la végétation, comme l'ont éprouvé en divers endroits des cultivateurs trompés par sa ressemblance avec la marne. Elle

(1) On trouve, en général, que la marne réussit mieux sur les prés, & la chaux sur les champs. (A)

contient beaucoup d'acide vitriolique & de fer , deux substances qui sont de véritables poisons pour les végétaux.

On peut s'affurer de la présence du fer dans cette terre , par une expérience très-simple. On n'a qu'à en brûler un petit morceau dans le feu avec de l'huile ; battre ensuite cette terre brûlée , & y appliquer l'aimant , pour voir si elle y adhère. On peut encore découvrir la présence du fer dans cette terre , en la faisant bouillir une heure ou deux dans de l'eau de pluie ; puis laissant évaporer , on obtient une poudre , qui , mêlée à une infusion de noix de galles donne une couleur noire , si la terre contenoit du fer.

Il y a des endroits où il est d'usage de cuire la marne , & de la réduire en chaux ; elle acquiert alors plus d'activité sous un moindre volume.

Toutes les substances testacées sont principalement composées de terre calcaire , & sont de la très-bonne chaux ; mais , dans leur état naturel , elle ne sont comparativement que peu d'effet comme engrais , même lorsqu'on les a pulvérisées préalablement. Si on les trouve dans un état de décomposition , on peut alors en espérer le même effet que de la marne coquillière.

Il y a plusieurs parties de l'Angleterre voisines des côtés où l'on emploie les coquilles

(350) AGRICULTURE.

avec succès , surtout sur les terres fortes & profondes. Leur effet , dans ces terres , est presque semblable à celui de la marne ou de la craie ; mais elles n'opèrent pas sensiblement sur les terrains légers , à moins qu'elles n'aient été préalablement mélangées en compost avec du fumier , de la glaise , ou du terreau. Alors elles servent non-seulement d'engrais , mais d'addition au fonds de la terre végétale.

Lorsque les terrains légers sont en prés artificiels , ce compost y fait un bon effet. Les coquilles dans leur état naturel sont encore utiles sur les terres froides , & qui produisent du foin aigre ou des roseaux : elles détruisent ceux-ci , & tendent à dessécher le sol.

Il y a plusieurs endroits dans le Royaume , où cette ressource est absolument négligée , quoiqu'elle pût être considérable , en particulier dans le voisinage des côtes basses où l'on trouve les coquilles par bancs immenses , & dans un état de décomposition si avancée qu'elles se pulvérisent en les touchant. Nous déplo-rons cette négligence , & nous espérons que l'attention du public dirigée à l'avenir sur cet objet ne laissera plus lieu à ce reproche.

La potasse , ou l'alkali végétal , a été jusqu'à présent peu employée comme engrais , quoiqu'elle forme un des composans essentiels de toutes les substances fertilisantes que nous con- noissons. C'est un des principes actifs de tous

Les engrais végétaux ; il ne s'évapore point au feu , & c'est un des résultats les plus utiles de l'opération de l'écobuage.

En parlant des opérations de la chaux , nous avons observé que l'addition des sels alkalis varie ses effets. Dans son union avec ces sels , elle agit plus efficacement pour accélérer la putréfaction des corps animaux & végétaux qu'aucune de ces deux substances ne puisse le faire isolée.

Dans les situations les plus favorables , tout ce qui tend à augmenter la quantité des engrais , & à en améliorer la qualité , est d'un très-grand prix ; mais dans les lieux qui ont peu de moyens naturels d'amélioration , & qui sont éloignés des ressources ordinaires , les substances qui peuvent suppléer les engrais communs , surtout lorsqu'elles sont d'un transport facile , & ne sont pas chères , doivent être encore plus recherchées.

Après les expériences que nous avons tentées sur les effets de la potasse , expériences dont on verra ensuite le détail , nous sommes disposés à la considérer comme l'engrais le moins coûteux qu'on puisse employer dans les Provinces. Le prix d'achat n'en est pas cher ; & la quantité requise pour un acre est petite , que le charriage ne peut pas faire un objet important. Dans une route passable un charriot peut porter de quoi amender fix 600 toises.

Dans les expériences dont on rendra compte ; on a trouvé qu'environ deux cents livres pesant de potasse suffisoient à un acre ; mais il s'agissoit d'une terre profonde , qui contenoit une grande quantité de substances animales & végétales. Il en faudroit beaucoup moins dans les terres légères. La meilleure maniere de l'employer dans celles-ci seroit d'en faire un compost avec de l'huile & de la terre végétale ou terreau. En l'appliquant par dessus les récoltes en végétation , on y trouvera amplement la récompense de ses peines & de ses dépenses. Dans les glaises profondes il faut l'employer seule , surtout si ces terres ont été anciennement & abondamment fumées ; & si l'on calcule la différence des charriages , la potasse pourra bien revenir moins cher que la chaux. A un certain égard c'est un engrais supérieur en qualité , parce que la potasse , unie à divers acides , forme des sels neutres plus ou moins utiles dans la végétation ; au lieu que lorsque la chaux rencontre l'acide vitriolique , elle est presque entièrement perdue comme engrais.

On dira probablement que dans un pays comme l'Angleterre , où la quantité de potasse produite est à-peu-près en équilibre avec la consommation , l'emploi de cette substance comme engrais , ne seroit qu'en élever le prix , au détriment des fabriques qui l'emploient. Cette objection n'est que spécieuse , parce qu'une
partie

partie considérable de la potasse, employée dans les manufactures, sera aussi utile après avoir fait son office là où on l'emploie, la fabrique du verre seule exceptée. D'ailleurs, si on appliquoit la potasse comme engrais, & qu'on supprimât les droits d'entrée; qu'on encourageât même son importation par des primes, cette importation seroit bientôt doublée; & comme les contrées d'où l'on tire cette production abondent en forêts, il y a peu de risques d'en voir épuiser promptement les sources.

Parmi les divers procédés des arts dans lesquels la potasse est employée, il faut distinguer les blanchisseries, comme en consommant une très-grande quantité qui pourroit devenir utile à la végétation. La totalité de ce qu'on en emploie pour le blanchiment pourroit, en quelque sorte, être appliquée à l'agriculture, après avoir rempli ce premier objet. L'alkali en feroit même meilleur, pour s'être uni au mucilage & aux graisses dans l'opération de blanchir les toiles. On sait qu'une quantité donnée de potasse ne sauroit s'unir qu'à une certaine quantité de graisse, de mucilage, ou de matière colorante, & lorsque cette action a eu lieu, l'alkali devient inutile. Si donc au lieu de le jeter au rebut, comme on le fait dans toutes les blanchisseries, on le vendoit aux agriculteurs, il y auroit doublement à gagner pour la communauté.

(354) AGRICULTURE.

La soude, ou l'alkali minéral, auroit dans l'agriculture les mêmes avantages, s'il étoit traité de la manière dont nous avons recommandé de traiter la potasse ; mais pour l'obtenir en quantité suffisante, il faudroit réussir à le séparer de l'acide marin dans l'eau de mer. Nous espérons avoir bientôt cette obligation à la Chimie ; il existe déjà une fabrique établie dans ce but à Liverpool, & qui promet des succès. C'est un objet du plus grand intérêt pour l'agriculture, & par conséquent pour la prospérité du Royaume.

La fougere abonde dans plusieurs cantons incultes du Royaume. On l'emploie de deux manières comme engrais. On la coupe pour litiere, ou on la brûle pour en appliquer la cendre seule, ou en compost.

Le premier usage est excellent. Nous condamnons décidément le second, à moins qu'on ne manque de bestiaux pour faire pourrir la fougere. Il n'y a aucun végétal qui donne une aussi grande quantité de potasse ; & dans plusieurs endroits les pauvres se servent de ses cendres pour blanchir leur linge. Lorsqu'on brûle la fougere, l'alkali est le seul principe utile qu'on en retire ; au lieu qu'en l'employant en litiere on la soumet à la fermentation, & on conserve tous ses principes fertilisans. Elle améliore beaucoup le fumier d'étable, par la quantité de sel alkali qu'elle contient, & qui ne se

DES ENGRAIS. (355)

trouve qu'en petite quantité dans le fumier de paille.

Il n'y a pas plus de raisons pour brûler la fougere, dans le but d'en employer la cendre en engrais, que pour brûler la paille dans le même but. Mais si cela arrive, il ne faut appliquer cette cendre que sur les terres les plus grasses & les plus profondes ; sur les prés aigres & froids : dans tous les autres cas, il faut la faire entrer dans les composts. Enfin, il faut se régler, quant à l'emploi de ces cendres, par les mêmes principes que nous avons établis relativement à la potasse appliquée comme engrais.

Lorsqu'on réfléchit sur les qualités de la fougere, l'on s'étonne & l'on regrette de voir qu'on en laisse périr annuellement une quantité immense sur les communaux. On pourroit en employer tous les ans plusieurs centaines de charretées à faire d'excellent fumier ; & cela dans des situations où les moyens d'amélioration manquent, & où une pareille ressource seroit, par cela même, plus précieuse.

Outre le fumier qui en résulteroit, on y trouveroit l'avantage de tenir le bétail au sec. Il y a dans quelques endroits une négligence honteuse, sur ce point. On voit les bestiaux enfoncer dans la boue jusqu'aux genoux dans les cours des fermes, tandis qu'à peu de distance on a en quantité de la fougere qui servi-

roit d'excellente litiere , & retiendrait les suc^s des excréments qui s'écoulent à pure perte , ou s'imbibent dans le sol. En général, on ne doit négliger aucun des moyens d'augmenter les fumiers , en rassemblant les substances végétales , telles que les roseaux , la bruyere , les herbes dures , pour les employer en litiere ; & lors même que le fumier qui en provient n'est pas d'excellente qualité , on y trouve le grand avantage de tenir les bestiaux au sec.

Il faut avoir soin de couper la fougere avant qu'elle sèche ; car on doit observer que toutes les plantes qui contiennent beaucoup d'alkali , en sont privées par la pluie , lorsque celle-ci tombe sur la plante desséchée.

Quelques fermiers sont dans l'usage de garnir à une épaisseur considérable , & tout à-la-fois , la cour , ou parc domestique , où les bestiaux sont renfermés. Cette méthode est mauvaise. S'il tombe beaucoup de pluie , peu après que cette litiere a été formée , elle se pénètre d'eau ; pendant long-temps les bestiaux sont couchés dans l'humidité , & une partie des sels de la fougere est perdue. Il faut , au contraire , n'en répandre à la fois que la quantité nécessaire pour tenir les bestiaux au sec ; & avoir soin de nettoyer complètement la cour , de six semaines en six semaines. On fait ainsi plus de fumier , de meilleure qualité , & le bétail est mieux couché. Cette observation s'applique à toutes les subs-

tances qu'on emploie pour litiere dans les enclos des fermes.

On se sert de la cendre de tourbe comme engrais dans plusieurs parties de l'Angleterre. On l'applique communément sur les trefles en végétation , ou sur d'autres récoltes , dans les terres argileuses ; & lorsque la pluie tombe immédiatement après qu'elle est répandue , la récolte s'en trouve très-bien. Sur les terres légères , & en temps sec , la cendre de tourbe nuit , au lieu d'être utile , surtout si elle provient d'une tourbe grasse.

Il n'y a aucune substance qui varie davantage en différentes situations , que les tourbes. Quelques-unes contiennent une grande quantité d'alkali fixe , & d'autres en contiennent beaucoup moins. Toutes cependant en donnent par la combustion , & la valeur de leur cendre dépend uniquement de la quantité qu'elle contient de ce sel , car la combustion détruit tous les autres composans , comme elle le fait dans tous les autres végétaux : l'huile s'évapore dans la fumée , & la terre végétale qui fait un des principaux composans de la tourbe , devient absolument inutile lorsqu'elle est brûlée.

En analysant avec soin différentes tourbes , nous avons trouvé que quelquefois l'alkali y entre pour une vingt-deuxieme du poids total , d'autrefois pour une trente-deuxieme seulement. Dans le premier cas , il peut être utile de ré-

duire la tourbe en cendres pour s'en servir comme engrais ; mais il en coûteroit moins de temps & très-peu de peine , pour soumettre la tourbe , en nature , au procédé de la fermentation , & pour conserver , par conséquent , l'huile & la terre végétale qu'elle contient. Nous avons déjà détaillé dans l'article des fumiers animaux , de quelle manière il faut s'y prendre.

Lorsqu'on emploie des cendres de tourbes bien chargées d'alkali , pour les répandre sur les récoltes en végétation , huit à dix bushels suffisent à un acre ; & il faut avoir soin de les répandre avant que les plantes se soient élevées à un certain point. Il faut que la cendre tombe sur le sol ; & si la plante est déjà un peu haute , la cendre s'arrête sur les feuilles , & fait du mal. Un temps de brume est le plus convenable pour cette opération , parce qu'alors la cendre pénètre immédiatement dans la terre.

Peut-être feroit-on mieux , lorsqu'on emploie les cendres de tourbe sur les grains , de les enterrer à la herse , en même temps que l'on sème : elles feroient ainsi également efficaces , & il n'y auroit point de danger qu'elles pussent nuire. On peut s'en servir très-convenablement sur les jachères pour le blé & l'orge (1). Il en

(1) Nous éprouvons de très-bons effets de la cendre de tourbe , depuis plusieurs années , en la répandant sur la jachère dans des terres argileuses. Ces terres

faut alors une plus grande quantité que lorsqu'on emploie ces cendres sur la récolte en végétation : peut-être en faut-il trois fois davantage. Il convient aussi, dans ce cas, d'employer, pour les bien mêler avec la terre, les mêmes soins que nous avons recommandés pour la chaux.

Nous allons joindre ici un détail qui a été communiqué au Département, sur la manière d'employer la tourbe comme engrais.

« Il est bien connu que la tourbe peut être
 » convertie en engrais, soit en la mêlant avec
 » de la chaux, avec du fumier, ou en la dis-
 » posant en compost. Dans quelques Provinces
 » d'Angleterre, & particulièrement en Bedford-
 » shire & Berkshire, on la prépare de deux
 » manières différentes. La première consiste à
 » la réduire en cendres ; la seconde à employer
 » le pouffier de tourbe, après que l'action de
 » l'air & de la gelée l'ont réduit en une poudre
 » fine, mais sans lui faire subir aucune autre
 » préparation (1) ».

sont à portée d'une tuilerie où l'on emploie la tourbe. La quantité employée est d'un tombereau sur mille pieds quarrés, ce qui revient à 25 tombereaux sur un espace où l'on sème un quintal de blé. (R)

(1) Nous éprouvons aussi de l'avantage du mélange du pouffier avec les terres fortes : nous pensons qu'il n'agit qu'en divisant le sol & en le rendant plus meuble. (R)

(360) AGRICULTURE.

» La cendre employée comme engrais , provient de la consommation de la tourbe dans les ménages , ou de la combustion opérée dans le but de se procurer des cendres. Lorsqu'on brûle la tourbe exprès pour avoir la cendre , on la dispose en gros tas , & on la brûle lentement : le feu dure fix à huit semaines ; & l'on observe que le feu le plus lent produit les meilleures cendres. La charge de deux charrettes de tourbe sèche , convenablement brûlée , fait 5000 bushels de cendres (1). Nos cendres sont rouges ; mais les blanches sont également bonnes pour engrais. Leur prix , sur le lieu même où on les brûle , est d'un pence & demi le bushel. Elles sont assez estimées pour qu'on les vienne chercher de dix à douze milles de distance. »

» Un propriétaire de marais , en Berkshire , tire quelquefois 200 livres sterl. d'un acre de tourbe ; & après l'extraction , son terrain est beaucoup meilleur qu'auparavant. On sème les cendres à la main , comme la suie. »

„ Le poussier de tourbe se vend six shellings

(1) Il est évident qu'il y a ici une grosse erreur de chiffres ; car , d'après notre expérience , douze tombereaux de tourbe donnent un tombereau de cendres. Cela peut varier un peu selon la nature de la tourbe , & le procédé de la combustion ; mais il y a au moins deux zéros de trop ou de trop peu dans l'un des nombres. (R)

* la charretée, & on le transporte souvent à sept ou huit milles de distance. »

Le détail ci-dessus est propre à réveiller l'attention de ceux qui possèdent des marais tourbeux, & ce qui rend cet objet plus intéressant encore, c'est que ce moyen d'amélioration se trouve ordinairement dans des cantons où les autres moyens manquent.

La cendre de bois est un engrais à raison de la quantité d'alkali qu'elle contient. Il faut observer que certaines cendres, telles que celles des pins & sapins, ne contiennent l'alkali végétal qu'en petite quantité. La plupart des bois durs, tels que le chêne, le frêne & d'autres en contiennent beaucoup.

Ce n'est que sur les terres les plus fortes & les plus tenaces que la cendre de bois peut faire un bon effet. Sur toutes les autres terres, il ne faut les employer qu'en compost avec la terre, le fumier & les substances animales. Ces composts bien préparés, sont très-utiles pour répandre sur les récoltes, & dans la culture au semail, parce qu'on peut les appliquer immédiatement au sillon même.

On peut faire un engrais très-actif en répandant des mauvaises huiles sur des cendres de bois, dans la proportion d'un demi gallon sur une charretée de cendres, en y mêlant ensuite une quantité de chaux égale à celle de la cendre, & en ajoutant six parties de terre pour

une de ce mélange. Douze charretées de ce compost suffisent à un acre, lorsqu'on les répand sur la récolte. Il ne faut jamais répandre la cendre pure sur les sols légers & chauds : elle leur nuit sensiblement.

La cendre convient sur les terrains aigres, les mauvais prés, qui produisent des joncs & des plantes nuisibles. Elle tue ces mauvaises productions (1), & fait à-peu-près les mêmes effets que la chaux. Le mélange de celle-ci avec les cendres rend leur influence beaucoup plus marquée.

Les cendres du charbon de pierre conviennent aux glaises profondes : elles rompent la tenacité de ces terrains & les rendent plus fertiles. Dans les endroits où cet engrais a été employé avec modération, l'effet en a toujours été avantageux ; mais dans le voisinage immédiat des villes, où l'application de cette substance revient fréquemment, le sol a été quelquefois tellement amenuisé par ce mélange, que la terre manque de consistance & que, pour peu que l'année soit sèche, la récolte est perdue. Les plantes ne peuvent d'ailleurs s'enraciner assez fortement pour résister aux vents violens, & elles versent aisément lorsque ces

(1) Un des meilleurs effets de la cendre, soit de bois, soit de tourbe, sur les prés froids, c'est de détruire la mousse. Nous en avons l'expérience. (R)

DES ENGRAIS (363)

vents surviennent dans la dernière quinzaine de juillet. Lors même que la récolte ne verse pas, les plantes sont si ébranlées & si déchauffées, qu'elles dépérissent au lieu de mûrir.

Nous recommandons à tous les fermiers du Royaume de mettre leurs cendres de charbon de pierre, sur leurs terrains les plus pesans, les plus froids, les plus tenaces & les plus aigres. Elles y produiront d'excellens effets; mais sur les sols légers, sur les graviers, les sables, la craie, la pierre à chaux, & la terre végétale très-meuble, elles ne doivent jamais s'employer que sous la forme de compost avec de la terre & du fumier.

On a beaucoup écrit & beaucoup raisonné sur l'utilité du sel marin, comme engrais. On a présenté des faits très-intéressans, mais ils n'ont pas levé tous les doutes: il peut être avantageux d'examiner en peu de mots, d'après quelle théorie le sel a été employé.

En portant son attention sur les diverses substances dont on se sert comme engrais, on voit qu'elles sont utiles, soit en fournissant un aliment aux végétaux, soit en rendant d'autres substances capables de le fournir. Si le sel marin avoit la faculté de hâter la fermentation ou la putréfaction des substances animales ou végétales, il ne seroit pas difficile d'expliquer comment le sel agit sur les engrais. Mais c'est un fait, connu de tout le monde, que le sel

364) AGRICULTURE.

retarde la putréfaction, puisqu'on l'emploie tous les jours à empêcher les matieres animales ou végétales de se corrompre. Il conserve la viande pendant des années ; il prévient la fermentation du foin ; il empêche les olives de se gâter ; ce ne seroit donc que comme engrais stimulant qu'il pourroit être considéré.

On a cité les succès du sel sur les prairies nouvellement desséchées. On a observé que les inondations de la marée produisoient des effets salutaires ; mais il ne nous paroît pas que cela soit probant en faveur du sel. Le dessèchement des prés détruit très-efficacement les joncs, & toutes les plantes qui se plaisent dans un sol humide ; & cet effet peut avoir été produit indépendamment du sel. On a observé, en revanche, que lorsque, dans ces cas là, le sel marin a été employé, la végétation a été retardée en raison de la quantité de sel répandue. Lorsque cette quantité étoit peu considérable, & lorsque, surtout, l'année étoit humide & que les pluies délavoiert & affoiblissoient le sel, la récolte étoit toujours plus hâtive & plus abondante, soit en foin soit en grains.

On a attribué à l'action du sel les salutaires effets des inondations. Dans la plupart des endroits inondés au fond de la mer, les inondations sont produites par les obstacles que rencontrent les rivières près de leur embouchure, & les marais que l'on nomme salans, sont

ordinairement formés d'eau douce : il est très-rare que la marée pénètre dans l'intérieur des terres pour y former de pareilles inondations.

Nous avons examiné , en Angleterre & en Ecosse , des marais qualifiés de marais salans , & surtout dans le voisinage de Liverpool & de Colchester. Ce sont des prairies basses , qui sont souvent submergées dans les hautes marées ; mais elles le sont par les eaux douces qui les arrosent : aussi l'eau des inondations de ces marais salans est-elle douce , ou tout au plus légèrement saumâtre. Le bénéfice qui résulte de la présence accidentelle des eaux , est uniquement l'effet de l'arrosement par inondation , effet bien connu dans d'autres situations où on l'obtient par l'art.

Les observations ci-dessus s'appliquent proprement au sel marin employé pur. Il y a quelques années que , sur la conviction de l'utilité du sel dans l'agriculture , le Gouvernement accorda une remise des droits sur la partie des sels qui seroit employée comme engrais ; & pour empêcher que le sel vendu dans ce but ne fut appliqué à d'autres usages , on y faisoit mêler de la suie. Son bas prix & la réputation qu'il avoit acquise , engagerent plusieurs Cultivateurs du Comté d'Haddington , en Ecosse , à en faire l'essai : quelques-uns firent leur expérience fort en grand. Ils l'employèrent dans toutes sortes de terres , sous toutes sortes de

formes , & dans toutes les saisons de l'année indifféremment. Au bout de plusieurs années d'usage , le sel a été abandonné , par la conviction de son inutilité dans la plupart des cas , & de ses mauvais effets dans d'autres.

Le rapport de la Province de Chester en donne une toute autre idée , & on y énumère les bons effets de cette substance , d'après des autorités très - respectables. Quant aux expériences faites sur des terrains mouilleux , aigres & qui donnent des joncs , on fait que le dessèchement seul suffit à changer leur nature , & que comme ces terrains sont ordinairement riches & profonds , ils donnent spontanément de la bonne herbe , lorsqu'ils ont été débarassés des eaux souterraines qui leur nuisoient. Dans le détail d'une de ces expériences , on remarque une circonstance qui appuie l'opinion que nous avons des effets du sel. Dans deux espaces d'un acre chacun , on mit sur l'un huit & sur l'autre seize bushels de sel marin. Sur le premier acre , il ne parut pas un brin d'herbe avant la fin de mai : sur le second acre , ce ne fut qu'à la fin de juillet que la végétation commença. Or , comme le sel est extrêmement soluble à l'eau , ne peut-on pas soupçonner que la végétation n'a recommencé , dans ces deux cas , qu'après que les pluies ont eu complètement lavé le terrain ?

Il y a néanmoins une espèce de sel grossier

qui peut servir d'engrais, c'est le résidu des chaudières après que le sel a été purifié. Ce résidu est l'acide muriatique un peu magnésique. Il paroît que, dans la dessiccation, une partie se évapore en partie : on ne le trouve qu'en quantité beaucoup moins considérable que la magnésie, avec lequel il forme un sel neutre imparfait ; & il y a une partie de la terre qui n'est pas combinée. Ce résidu employé, comme engrais, est utile dans tous les cas où la marne & la craie produisent de bons effets. L'addition de l'alkali le rendroit peut-être plus actif, & comme on perd tous les jours une très-grande quantité de substances alkaliines, nous recommandons des essais de ce genre.

En même temps que nous donnons notre opinion contre l'usage du sel, à moins qu'on ne l'emploie comme stimulant, le désir de rendre ce rapport aussi utile qu'il est possible, nous engage à mentionner le détail donné par John Pringle. Il résulte d'une série d'expériences bien conduites, que le sel, en petite dose, aide la putréfaction. Nous avons fait des expériences analogues, & n'avons point obtenu les mêmes résultats. Nous avons éprouvé, en appliquant le sel aux substances animales, que la putréfaction a toujours été retardée en proportion de la quantité de sel que nous avions employée, & que la plus petite quantité possible, dans les mêmes circonstances de chaleur,

(368) AGRICULTURE.

d'air & de lumière, retardoit sensiblement la fermentation putride. (1).

Un Cultivateur de Suffex a aussi communiqué au Président du Département un exemple des bons effets du sel comme engrais : nous allons le rendre dans les mêmes termes.

« Il y a environ seize ans que j'achetai douze bushels d'un sel impur, à un shelling. Je le semai avec du blé en octobre, sur une jachère, en terrain léger. La proportion fut deux bushels de sel & deux de blé par acre. Le sel donna de la consistance au terrain, & tout l'hiver le blé fut d'un vert foncé qui annonçoit la vigueur de la plante. Le printemps fut sec ; & à la fin de mars la croûte du terrain paroissoit dure. Je fis passer deux fois un pesant rouleau de chêne sur le blé ; & s'il eût été garni de dents ou de pointes, son effet auroit été beaucoup meilleur. »

« Il parut que le sel avoit détruit tous les vers, les larves & les insectes. On ne mit pas un atome de fumier sur le champ. Il en auroit fallu de douze à quinze charretées par acre qui, y compris le charriage, auroit coûté 2 sh. 7 den. la charretée. Les récoltes

suivantes

(1) La différence dans les effets du sel est peut-être due à ce que, dans un cas, le sel marin employé contenoit un sel terreux, tel que du muriate de magnésie, & que dans l'autre le sel marin étoit pur. (A)

DES ENGRAIS. (369)

» fulvantes d'orge & de trefle furent extrême-
 » ment belles ; beaucoup plus belles que lors-
 » qu'on avoit employé du fumier ; & jusqu'à
 » présent le sol a paru se ressentir du bénéfice
 » de cet engrais. Il faut avoir vû ce champ avant
 » & après cette amélioration , pour concevoir
 » qu'une si petite quantité de sel puisse produire
 » un effet aussi grand & aussi durable. Le droit
 » additionnel sur le sel qui l'a fait monter à 6 sh.
 » 3 den. le bushel , a empêché de répéter l'ex-
 » périence. »

Dans un autre chapitre du rapport général ,
 on rendra compte des effets de l'écobuage : opé-
 ration que nous observerons seulement ici de-
 voir être pratiquée avec réserve. Mais quoique
 le brûlement de la glaise puisse être préjudi-
 ciable , il y a pourtant aussi des cas où il peut
 être utile ; c'est lorsque le sol est extrêmement
 tenace , argileux , & qu'il retient les eaux. Un
 mélange de glaise cuite rend ces terrains plus
 friables , plus aisément labourables , & en même
 temps empêche les eaux d'y séjourner (1). Mais

(1) Voici l'extrait d'une lettre de Mr. J. WHITE
 PARSONS, au Président du Département, dans la-
 quelle il rend compte de sa manière de brûler la glaise :

« Lorsque j'eus l'honneur de causer quelques mo-
 » mens avec vous , à Noël dernier , vous parûtes
 » vous intéresser au détail que je vous donnai sur
 » ma manière de brûler les terres & les taupinieres.
 » Je vous dis , je crois , alors que cette réparation
 » ne m'avoit jamais moins rendu qu'une amélioration
 » de 10 sh. sur la rente de mes terres glaises que le
 » séjour des eaux gâtoit. »

. *Agriculture*, Vol. 2, N°. 9, Septembre 1797. V

ce n'est que sur les terres fortes & profondes que cette pratique peut réussir. Sur ces terrains, particulièrement lorsque le sol inférieur est de la terre calcaire, ou de la craie, il résulte un grand avantage du brûlement d'une partie du sol pour opérer un mélange de la partie brûlée, avec le reste; parce que les glaises situées de cette manière contiennent toujours beaucoup de terre calcaire, qui, dans ce brûlement, se change en chaux vive. On obtient donc par cette opération un double bénéfice: 1°. en produisant une matière durable, qui, lorsqu'elle existe en quantité suffisante, empêche que jamais les eaux ne séjournent dans la terre au détriment de la végétation, & rend la terre

„ L'année dernière, je brûlai au moins 1600 charretées dans une semaine, en ne mettant pas moins de 500 charretées par monceau. La dépense, autant que j'ai pu la calculer, n'a pas passé un pence & demi par charretée. Vous pouvez juger du tout, & de la permanence d'un tel engrais; & combien la texture d'une glaise tenace doit être améliorée par le mélange d'une cendre qui y reste à demeure; & de débris calcaires, à raison de 50 ou 60 bushels par acre: matières que le sol fournit sur le lieu même & qu'il faudroit emporter à grands frais plus loin que l'endroit où on les brûle. „

„ J'ai observé une circonstance très-intéressante, c'est que la chaux réussit ensuite très bien sur ces terrains, quoiqu'auparant elle eût été essayée en quantité triple, sans faire aucun bien. „

„ Comme ce moyen n'a pas été employé, que je sache; & comme il n'y a aucun doute sur son utilité, je regretterois que son effet se bornât à mon domaine. „ —

West-Castle, près de Sherborne, avril 1795.

plus labourable ; 2°. en mêlant de la chaux vive dans un terrain auquel elle convient particulièrement.

Mais sur les terres de peu de fond , même des glaises , le brûlement ne convient pas. Ces terrains là , dans leur état naturel , contiennent trop peu des principes nécessaires à la végétation. Si donc l'on brûle une partie de la terre , le sol se trouve appauvri des principes qui déjà y étoient en trop petite quantité.

En donnant ainsi notre assentiment à l'usage de brûler les glaises profondes , nous supposons toujours que c'est dans des situations où la chaux & les cendres sont d'un prix excessif , ou ne peuvent point s'acheter du tout , car partout où l'on peut se procurer ces substances , leur usage , sur les glaises les plus tenaces , & qui retiennent le plus les eaux , sera l'amélioration la moins chère & la plus utile que l'on puisse faire. Il est parfaitement prouvé maintenant , que ces engrais , non-seulement rendent de tels terrains plus meubles & plus perméables à l'eau , mais qu'en agissant sur les huiles & les autres principes qu'ils contiennent , ils convertissent ces substances en une nourriture convenable pour les végétaux , sans déperdition quelconque. Au contraire , lorsqu'on brûle la terre , une partie du sol devient absolument inutile ; & lorsque l'épaisseur de la terre végétale est peu

(372) AGRICULTURE, &c.

considérable, cette perte ne peut pas se réparer (1).

(1) Nos lecteurs trouveront peut-être dans l'ensemble du travail sur les engrais, dont nous avons rendu compte, quelque chose d'un peu trop systématique pour un art qui est essentiellement expérimental. Nous observerons néanmoins, que lorsque les phénomènes s'accordent évidemment à indiquer certaines vérités fondamentales, il est utile de poser des règles générales, & des principes de théorie qui aident singulièrement tous ceux qui sont capables de généraliser leurs idées, sans nuire à ceux qui ne saisissent les vérités qu'une à une. Au reste, il est juste d'observer que la partie la plus essentielle de la théorie de ce chapitre des engrais, c'est-à-dire, celle qui montre la nécessité de produire des *savons* pour la nourriture des plantes, a été développée d'une manière très-lumineuse par l'Abbé Rozier. On aura pu remarquer l'omission du gypse, considéré comme engrais. Cette omission n'existe pas dans l'esquisse du rapport; mais l'article est très-court & très-imparfait: il est purement théorique; le gypse n'y est considéré que comme un engrais à mélanger avec la terre, ainsi qu'on emploie la chaux, & l'on n'y parle pas de la calcination préalable, qui est essentielle. Nous avons supprimé cet article, qui n'est propre qu'à donner de fausses notions, & qui prouve que ce puissant engrais n'est presque pas connu en Angleterre. On trouve, parmi les *addenda* du chapitre, les expériences de Mr. Smithe sur le gypse, dont nous avons déjà rendu compte (vol. II. p. 60), ces expériences, très-probantes, & les seules qu'on ait publiées en Angleterre, à notre connoissance, sur les effets du plâtre, manquent d'une explication, très-importante, c'est que le gypse avoit été calciné avant d'être réduit en poudre. Quoique l'auteur ne le dise point, nous n'en doutons pas, en lisant le détail des effets, qui sont parfaitement d'accord avec ce que tous les cultivateurs de ce pays-ci ont éprouvé & éprouvent tous les jours sur cet engrais. (R)

Thermomètre dans le tronc d'un gros arbre.				OBSERVATIONS
				Diverses.
L. du S. à 2 h.		du C. S.		
D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	
id. +16. 0	+16. 5	+16. 3		La beauté du temps
v. 15. 5	16. 3	16. 0		à favorisé les semailles
co. 14. 3	14. 3	14. 3		qui sont maintenant
v. 13. 0	14. 5	14. 5		très-avancées dans les
, id. 13. 0	14. 0	14. 0		terres fortes. Les blés-
, id. 12. 0	14. 0	14. 0		noirs sont en général
, id. 12. 3	14. 5	14. 5		beaux, & promettent
, id. 13. 5	15. 5	15. 3		du grain. Les trefles de
, id. 14. 0	15. 7	15. 7		l'année ont bien réussis :
, nu. 14. 7	15. 0	15. 0		on en a coupé quelques-
, p. 14. 0	14. 3	14. 5		uns, & ils donnent
, av. 14. 7	14. 7	14. 5		maintenant un beau
, id. 12. 5	14. 5	14. 5		paquis. Les raisins sont
, nu. 12. 3	14. 3	14. 5		parvenus à un point de
, s. 13. 3	14. 3	14. 3		maturité que l'on n'es-
, id. 12. 3	14. 3	14. 3		péroit pas, après les
, id. 12. 0	14. 3	14. 3		avoir vus si retardés. Il
, id. 12. 5	14. 0	14. 3		y a un peu de pourri,
, id. 13. 7	15. 3	15. 3		mais il paroît, qu'en
, id. 14. 3	14. 5	13. 7		général, le vin sera bon,
, id. 10. 7	12. 3	13. 0		surtout le blanc. Le pâ-
, id. 10. 5	11. 5	11. 7		turage des prés naturels
, id. 11. 3	12. 7	13. 3		après le regain, est très-
, id. 12. 0	12. 5	12. 5		abondant.
, id. 12. 0	11. 5	11. 3		
, couv. 10. 0	10. 3	10. 3		
, id. 9. 5	10. 7	11. 3		
, s. 10. 3	11. 7	12. 3		
, id. 11. 0	12. 3	12. 5		
, s. 11. 3	12. 5	12. 7		
loy. +12.62	+13.76	+13.82		

TIONS TERRESTRES.

3 pouces entre.		Ther. à 4 pieds enterr.	Ther. dans l'eau qui s'évapore au ni- veau du Sol.			Evaporation de l'eau au niveau du Sol.		
h.	C. du S.	2 heu.	E. du S.	2 h.	C. du S.	L. du S.	2 h.	C. du S.
dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	D. dix.	Li. Dou.	Li. Dou.	Li. Dou.
7	15. 7	17. 0	16. 7	19. 0	17. 3	1. 6	0. 0	0. 0
5	15. 0	17. 0	15. 0	16. 7	16. 0	0. 3	0. 0	0. 0
0	14. 5	17. 0	12. 5	16. 3	15. 0	0. 0	0. 0	0. 2
5	15. 7	16. 7	11. 7	21. 0	17. 0	0. 0	0. 6	1. 0
0	15. 7	16. 3	12. 0	20. 5	16. 5	1. 6	0. 5	0. 10
7	16. 0	16. 0	10. 3	20. 0	17. 0	1. 5	0. 4	0. 1
9	17. 0	16. 0	11. 0	21. 3	18. 0	1. 3	0. 3	0. 1
0	18. 0	15. 7	13. 3	21. 7	18. 5	1. 6	0. 5	0. 1
0	18. 5	15. 7	13. 0	21. 3	19. 3	1. 8	0. 6	0. 1
8	16. 3	15. 7	14. 7	20. 3	17. 0	1. 6	0. 0	0. 1
4	14. 3	15. 7	14. 3	16. 0	16. 0	0. 10	0. 0	0. 0
0	13. 0	15. 7	14. 7	15. 5	14. 3	0. 7	0. 0	0. 0
7	15. 3	15. 5	10. 0	19. 3	16. 5	0. 0	0. 3	0. 0
8	16. 0	15. 5	10. 7	20. 0	17. 3	0. 8	0. 3	0. 0
8	16. 0	15. 3	12. 7	20. 3	17. 0	0. 0	0. 2	0. 0
19	16. 0	15. 3	10. 5	20. 7	17. 3	1. 0	0. 3	0. 0
19	16. 7	15. 3	10. 5	20. 5	18. 0	1. 1	0. 2	0. 0
10	17. 5	15. 0	11. 5	21. 0	18. 5	1. 1	0. 2	0. 0
10	17. 3	15. 0	13. 5	20. 5	18. 3	1. 2	0. 3	0. 0
13	11. 3	15. 0	13. 3	14. 0	12. 3	1. 2	0. 2	0. 0
16	13. 5	15. 0	7. 5	18. 0	15. 0	0. 0	0. 1	0. 0
16	13. 7	14. 7	8. 5	18. 3	15. 3	0. 10	0. 1	0. 0
18	15. 3	14. 5	10. 5	19. 5	16. 5	0. 10	0. 2	0. 0
12	12. 7	14. 5	12. 0	14. 7	14. 3	0. 11	0. 0	0. 0
10	10. 0	14. 3	12. 0	11. 7	11. 3	0. 0	0. 0	0. 0
11	10. 7	14. 0	10. 0	12. 7	12. 3	0. 0	0. 0	0. 0
14	13. 3	13. 7	10. 3	16. 3	15. 0	0. 4	0. 2	0. 0
17	14. 5	13. 5	10. 3	18. 7	16. 3	0. 11	0. 2	0. 0
16	14. 5	13. 5	11. 0	18. 0	16. 0	1. 3	0. 3	0. 0
15	13. 5	13. 5	11. 0	17. 0	14. 5	1. 1	0. 3	0. 0
+16,86	+14,92	+15,25	+11,83	+18,36	+16,12	Total.		
						24.4	5.3	

ier. + 8, 3.

le 15^e. + 8, 3.

208 Toises de Fr. au-dessus du niveau de la Mer : Latitu

TEMBRE 1797.

Etat du Ciel.

Evaporation de la Terre.

Le signe — indique que l'appareil a reçu de la pluie ou de la neige. Les deux zéro qu'il n'y a point eu d'évaporation.

Ther. à la surface du sol qui s'évapore.

Jour du Mois.	Evaporation de la Terre.			Ther. à la surface du sol qui s'évapore.		
	L. du S.	2 h.	C. du S.	L. du S.	2 h.	C. du S.
	Li. Dou.	Li. Dou.	Li. Dou.	D. dix.	D. dix.	D. dix.
id., id.	1	—	—	14. 3	16. 3	14. 7
id., id., pl.	2	0. 0	0. 4	13. 3	14. 3	12. 7
couv., id.	3	—	—	9. 0	16. 3	14. 5
id., sol., couv.	4	—	1. 1	8. 0	21. 0	12. 0
id., id.	5	0. 1	0. 10	9. 0	23. 3	11. 5
id., id.	6	0. 2	0. 5	4. 7	22. 0	12. 5
id., id.	7	0. 1	0. 4	7. 0	21. 7	15. 5
id., id.	8	0. 1	0. 4	10. 3	29. 0	15. 3
id. cl. nu.	9	0. 1	0. 4	10. 5	29. 0	17. 0
nu., sol., nu.	10	0. 0	—	12. 3	23. 0	13. 0
pl., couv., nu.	11	0. 2	—	12. 0	15. 5	15. 7
pl., id.	12	0. 1	—	13. 7	14. 5	12. 0
id., id.	13	0. 6	1. 0	5. 5	19. 0	11. 7
nu., id., pl., nu., pl.	14	0. 2	0. 9	7. 5	20. 5	15. 0
sol., nu., id.	15	—	1. 1	9. 3	23. 0	13. 5
id., nu.	16	0. 3	0. 11	6. 5	24. 5	12. 7
id., id.	17	0. 2	0. 8	6. 5	27. 3	13. 5
id., id.	18	0. 1	0. 5	9. 3	29. 5	15. 7
id., nu.	19	0. 2	0. 3	10. 7	24. 7	15. 5
id., pl., nu.	20	0. 2	0. 2	10. 0	9. 7	9. 0
id., id.	21	0. 0	0. 7	3. 0	21. 0	10. 3
id., id.	22	0. 1	0. 6	6. 3	24. 0	11. 0
id., nu.	23	0. 6	0. 3	7. 0	22. 0	13. 0
v., id., pl., id.	24	0. 1	0. 0	9. 3	14. 5	13. 0
id., id.	25	—	—	10. 3	10. 3	10. 0
couv., id.	26	0. 3	0. 7	8. 0	12. 5	10. 3
fol., id., nu.	27	0. 3	0. 6	7. 7	21. 0	12. 0
id., nu.	28	0. 1	0. 8	8. 3	21. 5	13. 0
sol., nu.	29	0. 1	0. 7	8. 3	19. 3	13. 0
nu., id. cou., plu.	30	0. 1	0. 6	8. 5	19. 5	9. 0
Total. Moy.			+ 8,87	+ 20,32	+ 12,55	
3. 8 13.9 3. 2						

Température d'un Puits de 30 l

antée

Observations météorologiques faites à GENTHON, près de GENÈVE :

MÉTÉOROLOGIQUES.

SE

Hygromètre. à cheveu.			Elec- tromè- tre.	Pluie ou neige en 24 heu.		Gèle blanche ou Kofte.	Vents.		
du 3	2 h.	C. du 3		Li. Dou.			L. S.	2 h.	C. du 3.
deg.	Deg.	Deg.	2 h.						
—	92	98	4	4.	7	R.	SO	SO	SO
98	87	93	—	0.	9	—	SO	SO	SO
97	94	87	—	3.	5	—	NE	NE	NE
88	67	77	—	0.	6	—	NE	NE	NE
90	79	79	—	—	—	R.	NE	SO	SO
98	79	86	—	—	—	R.	SO	SO	SO
98	73	71	—	—	—	—	SO	SO	SO
90	65	77	—	—	—	—	SO	SO	SO
84	68	83	—	—	—	—	SO	NE	NE
98	86	90	—	2.	4	—	SO	SO	SO
96	96	79	—	1.	1	—	SO	SO	SO
88	95	91	—	6.	2	R.	calme	calme	calme
94	83	89	—	—	—	R.	SO	SO	SO
95	77	82	—	—	—	—	SO	SO	SO
—	71	79	—	6.	6	R.	NE	NE	NE
94	81	92	—	—	—	R.	calme	calme	NE
99	82	87	—	—	—	R.	SO	SO	SO
92	67	72	—	—	—	—	SO	SO	SO
94	69	80	—	—	—	R.	SO	SO	SO
92	87	99	—	3.	2	R.	NE	NE	NE
98	77	88	—	—	—	R.	NE	NE	NE
97	—	—	—	—	—	R.	NE	SO	SO
—	52	54	—	—	—	R.	SO	SO	SO
72	66	69	—	0.	6	—	calme	calme	calme
72	72	72	—	14.	9	—	calme	calme	calme
73	60	66	—	2.	7	—	calme	calme	calme
69	52	59	—	—	—	R.	NE	NE	NE
72	46	60	—	—	—	R.	NE	NE	NE
70	55	63	—	—	—	R.	SO	O	O
72	49	55	—	—	—	—	—	—	—
79.37	70.90	75.90	—	Total					
				47. 4					

Observatoire de Genève, le 1^{er}. 19°. 36'. le 15^e. 19°. 42'. Ou

SEP

OBSERVAT

Jours du Mois.	Phases de la Lune.	BAROMÈTRE.									Therm. à 4 pieds, divisiones.		
		Lev. du Sol.			à heures.			Coul. du Sol.			L. du S.		
		Pou.	Li.	Seiz.	Pou.	Li.	Seiz.	Pou.	Li.	Seiz.	D. dix.	D.	
1		26.	9.	9	26.	9.	8	26.	9.	13	13.	3	15
2		—	9.	11	—	9.	11	27.	0.	1	14.	0	13
3		—	10.	14	—	10.	15	26.	11.	3	9.	3	11
4		—	10.	14	—	10.	7	—	10.	7	9.	5	14
5		—	10.	15	—	11.	3	—	11.	6	10.	0	14
6	☉	—	11.	13	—	11.	11	—	11.	9	5.	0	14
7		—	11.	12	—	10.	14	—	10.	12	6.	7	17
8		—	11.	1	—	10.	11	—	10.	11	11.	3	20
9		—	10.	9	—	10.	6	—	10.	6	13.	0	20
10		—	10.	12	—	10.	9	—	10.	1	11.	7	15
11		—	9.	4	—	8.	7	—	8.	8	11.	5	13
12		—	9.	6	—	11.	2	27.	0.	4	15.	5	13
13		27.	0.	8	27.	0.	1	26.	11.	10	5.	7	14
14	☾	26.	11.	4	26.	9.	11	—	9.	10	6.	5	16
15		—	11.	14	27.	0.	1	27.	0.	11	9.	5	16
16		27.	1.	0	—	0.	11	—	0.	10	6.	7	16
17		—	0.	1	26.	11.	7	26.	11.	1	6.	3	14
18		26.	10.	3	—	9.	8	—	9.	8	9.	0	20
19		—	9.	9	—	8.	8	—	8.	4	10.	7	19
20	●	—	7.	13	—	10.	3	—	11.	0	12.	0	9
21		—	11.	4	—	10.	7	—	9.	13	3.	3	12
22		—	9.	7	—	8.	15	—	8.	14	5.	5	12
23		—	9.	1	—	8.	12	—	8.	11	6.	7	14
24		—	9.	0	—	8.	13	—	8.	13	8.	7	13
25		—	7.	15	—	7.	12	—	7.	12	10.	0	8
26		—	7.	13	—	8.	7	—	8.	7	7.	5	10
27	☾	—	9.	5	—	9.	2	—	9.	1	8.	3	13
28		—	9.	4	—	9.	9	—	9.	8	8.	3	14
29		—	10.	0	—	9.	13	—	9.	8	5.	3	13
30		—	9.	0	—	8.	12	—	9.	2	8.	0	15
Moyennes.		26.	10.	3,6	26.	10.	1,1	26.	10.	2,7	+ 8,96	+ 14	

Déclinaison de l'aiguille aimantée



A G R I C U L T U R E.

DÉTAILS SUR L'AGRICULTURE DU COMTÉ
DE YORK. Tirés de l'ouvrage intitulé (THE
RURAL ECONOMY OF YORKSHIRE, de Mar-
shall.)

LA diversité des sites demande un art varié pour la disposition des eaux. Sur les hauteurs, il faut les retenir à la surface : dans les vallées, il faut se hâter de les faire arriver à leur issue. La plupart des vallées de ce Comté sont sujettes à être inondées partiellement dans les grandes eaux ; mais elles sont, je pense, susceptibles d'être suffisamment desséchées dans les basses eaux. La seule chose nécessaire pour obtenir ce dessèchement, c'est de couper un assez grand nombre de canaux entre les parties à dessécher & les rivières ; un nombre suffisant de fossés qui dégorgent ces canaux & un nombre suffisant de rigoles qui communiquent à ces fossés.

On a fait avec succès plusieurs essais dans ce but. Les marais de l'ouest, en particulier, en font un exemple frappant, car quoiqu'ils n'aient absolument aucune pente, & qu'ils se trouvent immédiatement au-dessus du niveau

de la Derwent, ils sont maintenant soumis à l'action de la charrue, & on n'y dispose pas même la terre en sillons relevés ou en à-dos. Au moyen des rigoles, des fossés, & des canaux, le pays est aussi à l'abri des eaux surabondantes que s'il se trouvoit d'un mille au-dessus du niveau de la Derwent.

Cependant les marais de l'est, & quelques autres portions de la vallée, à la honte des habitants, demeurent encore inondées, ou du moins dans un état marécageux, & ne donnent qu'un pâturage grossier aux jeunes bêtes pendant les mois d'été. Le remède à ce mal, remède applicable à toutes les situations du même genre qui se retrouvent dans tant de districts du Royaume, c'est de resserrer la rivière entre deux jetées, & de creuser un canal de chaque côté, en dehors de ces jetées.

Si, dans le temps des basses eaux, la rivière peut dégorger le canal dans sa partie la plus basse, de manière que le marais soit débarrassé des eaux stagnantes, l'ouvrage peut se faire sans de grands frais, du moins si on les compare aux avantages qui en résultent. Des écluses placées au point le plus bas, pour donner issue aux eaux superflues & pour les empêcher de retrograder, compléteront le travail.

Si le niveau de la rivière dans les basses eaux, se trouvoit trop élevé pour la profon-

leur nécessaire du canal, il faut avoir recours à des moulins (*marsh-mills*) placés dans la partie la plus basse, & qui dans tous les cas ordinaires, rempliront très-bien l'objet de suppléer la pente.

La dépense de l'établissement d'un moulin est considérable, & son entretien est également coûteux; mais en supposant que les premiers frais s'élevassent à 200 guinées, & qu'il en coûtât annuellement vingt pour l'entretien & les soins, cette dépense ne seroit encore qu'une bagatelle si on la compare à l'avantage de transformer quelques milliers d'acres de marais presque inutiles, en terres labourables ou en près d'une valeur dix fois peut-être plus considérable.

Dans le cas dont il s'agit, les moulins de décharge, s'ils étoient nécessaires, ne pourroient être appliqués que d'un côté de la rivière. Les ruisseaux sont trop nombreux sur la rive du Nord de la Derwent pour qu'un moulin pût les décharger; mais en resserrant ces ruisseaux entre des jetées, & en appliquant un moulin à chaque compartiment du marais, on auroit la certitude de réussir. Au Sud & à l'Est de la rivière, on pourroit faire plus de bien à moindres frais: il s'agiroit seulement après avoir resserré la rivière entre des jetées, de faire la même opération sur un des ruisseaux.

(376) AGRICULTURE

Il est presque inutile de dire que la terre tirée en faisant les canaux doit servir à faire les jetées, de manière qu'un même travail remplit deux parties de l'objet. On sent aussi que les principaux fossés doivent communiquer depuis les canaux jusqu'à la partie à dessécher. Mais il y a une chose qui ne paroîtra pas si évidente, c'est la manière de placer les jetées relativement à la rivière. Si on les place immédiatement au bord, comme c'est l'usage, la moindre déviation dans le cours de la rivière peut les détériorer. D'ailleurs, s'il y a une jetée de chaque côté, il faut, pour que les grandes eaux soient contenues, élever les jetées à une grande hauteur. Si, au contraire, les jetées sont placées à dix ou quinze toises de la rivière, elles sont à l'abri des dégradations opérées par le courant; & comme l'espace dans lequel les eaux s'étendent lors des crues est plus considérable, elles ne montent pas si haut, & il n'est point nécessaire de donner aux jetées autant d'élévation.

On pourroit imaginer que, dans ce cas, il y a du terrain perdu; mais l'expérience prouve que les jetées sont aussi utiles au terrain qu'elles circonscrivent qu'à celui qu'elles laissent en dehors. Les eaux d'une rivière enrichies par les inondations, déposent, en se retirant, les principes fertilisans qu'elles charrient, & ces dépôts, resserrés sur un petit es-

pace, ont un effet qui n'étoit point sensible sur un vaste terrain. On voit aussi dans l'espace compris en dedans des jetées les inégalités de la surface disparaître peu-à-peu, & le terrain s'élever d'année en année. J'ai eu occasion d'observer un effet de ce genre, extrêmement marqué : le bord de la rivière, du côté où il y avoit une jetée, s'étoit élevé d'environ un pied au-dessus du niveau du rivage opposé. Cette élévation de surface est une addition de richesse pour le sol. Ces bandes de terrain comprises en dedans des jetées sont singulièrement propres à former des oseraies, & à servir de pâturages. Dans les ordinaires, la dépense de l'embranchement (1) n'est pas très-considérable. On voit dans la vallée de la Derwent plusieurs exemples de cette opération. Les marais de *Brawby*, contenant environ trois cents acres d'un sol tourbeux couvert de joncs, étoient fréquemment inondés par la rivière de Seven qui en cotoye la partie supérieure ; & la Rye qui forme leur borne de l'autre côté leur servoit d'écoulement. Ces trois cents acres appartiennent au Comte de Salisbury, & lui rendoient cinquante livres sterling par an pour le pâtunage qu'il louoit. L'embranchement lui a coûté environ soixante

(1) Il faut faire un mot pour rendre *embankment*, qui signifie le resserrement des grandes eaux d'une rivière par des jetées. (R)

livres sterling, c'est-à-dire, un shellings par yard, sur une longueur de trois quarts de mille ; il est vrai que les restes d'une ancienne jetée contribuèrent à diminuer les frais. Lorsque la jetée fut finie, elle étoit haute d'environ sept pieds ; elle avoit à son sommet un replat assez large pour que les bestiaux pussent y marcher. Le talus étoit suffisant pour empêcher l'éboulement, ou la dégradation par les animaux, & il étoit revêtu de gazon du côté de la rivière.

Outre la jetée qui auroit pu coûter environ cent livres sterling, si l'on ne s'étoit pas aidé d'une ancienne levée de terre, il étoit nécessaire de couper une route au travers de l'espace racheté sur les eaux ; d'y faire quelques bâtimens, & d'enclorre le tout. En supposant que le chemin, les bâtimens, & la clôture eussent coûté trois cents livres, la totalité des frais auroit été de quatre cents livres sterling, c'est-à-dire de 15 à 20 livres sterling annuellement.

Après l'amélioration, la rente de ce terrain a été de huit shellings par acre ; c'est-à-dire que les 300 acres rendent cent-vingt livres sterling. Il y a donc d'abord un profit de 50 livres sterling annuellement. Dans une douzaine d'années la rente pourra être doublée, parce que le sol est profond, & que sans être riche, il est propre au blé & à l'herbe. Lorsque les

travaux stipulés avec les fermiers actuels auront été faits, les trois cents acres rendront au moins deux cents livres sterl. c'est-à-dire quatre fois leur ancienne rente.

Il y a encore, dans le même arrondissement, un autre exemple d'un embranchement, qui a fort bien réussi. Les commissaires chargés d'exécuter un acte de clôture, ont sagement mis à l'abri des inondations un terrain bas qui y étoit sujet. Le remède se trouvoit facile ; il ne s'agissoit que d'une jetée peu étendue, & rarement plus élevée de trois pieds. Cependant l'amélioration a été très-considérable : ce terrain ne rendoit à-peu-près rien, il est devenu une terre arable, susceptible d'augmenter beaucoup de valeur.

Il faut convenir que le premier talent d'un propriétaire cultivateur, c'est de découvrir & d'exécuter des améliorations qui donnent un accroissement durable dans la rente, sans rien coûter au bonheur ni à la conscience de celui qui en jouit.

Il y a beaucoup de bois dans les vallées du pays. Celles qui séparent les hauteurs de pierre à chaux au Nord de la vallée de Pickering, & qui donnent passage aux rivières & aux ruisseaux qui découlent des terrains tourbeux, sont garnies de bois. Il est probable qu'autrefois il y avoit au pied des collines des espaces considérables en bois : il n'en reste que peu aujourd'hui.

Dans la partie méridionale de la vallée de Pickering , il y a , de place en place , des bois qui ont quelque importance. Le chêne y est en abondance , & on y voit quelques frênes. Le hêtre , quoique parfaitement adapté aux pentes rocailleuses , ne se trouve jamais dans les forêts naturelles , ce qui semble prouver que le chêne & le frêne sont naturalisés depuis un grand nombre d'années , & descendent des forêts qui autrefois couvroient le pays ; tandis que le hêtre y a été transporté plus récemment. Celui-ci se trouve sur les hauteurs de roche calcaire dans le Gloucestershire , le Herefordshire , & la partie méridionale du pays de Galles , où , selon toutes les apparences , il est dans son état naturel. Les informations que j'ai rassemblées concernant les bois , dans ce pays-ci , peuvent se rapporter aux chefs suivans.

1°. Les plantations.

2°. Les ventes.

3°. L'exploitation.

4°. Les bois de construction.

5°. Les écorces.

6°. Les transports.

On ne voit gueres dans ce Comté des exemples de plantations de glands. Ce qu'il reste des anciennes forêts avoit évidemment été produit fortuitement par des rejets des racines des arbres coupés , ou par des glands semés d'eux-mêmes. Un chêne qui vient de gland ,

dans une plaine ouverte, jete des branches de tous côtés; & comme le bétail les ronge, il prend la forme d'un arbuſté. Mais lorsqu'un plant de chêne s'éleve parmi les épines & dans les buiffons épais, à l'abri de la dent des beſtiaux, la nature le pouſſe dans une direction verticale, en un ſeul jet, pour lui faire prendre promptement l'avantage ſur les plantes environnantes.

Cette habitude précoce de s'élever verticalement favoriſe peut-être pour la ſuite cette même tendance à s'élever. On peut conjecturer auſſi que les plants naturellement foibles ne peuvent jamais gagner l'avantage ſur les buiffons environnans, & que, par conſéquent, ceux qui y parviennent ſont d'une conſtitution vigoureuſe. Quoiqu'il en ſoit de la cauſe, on obſerve que les arbres qui croiſſent dans les brouſſailles épaïſſes deviennent plus grands & plus beaux.

La plupart des bois qui ſubſiſtent aujourd'hui, au Sud de la rivière de Derwent, ont repouſſé ſur de vieux troncs coupés. C'eſt l'uſage dominant dans le pays, où les bois taillis n'ont pas une valeur auſſi conſidérable qu'ailleurs. Les fagots, les plantés de haies, & les petits cercles ſont les ſeuls articles de vente qu'on tire des taillis.

Lorsqu'on veut couper un bois pour qu'il repouſſe, on a ſoin, en abattant les arbres,

(382) . AGRICULTURE

de laisser l'écorce intacte, autour du tronc, que l'on coupe à quelques pouces au-dessus de la terre. Avant que les rejetons paroissent, on rase absolument le bois tout autour, & l'on renouvelle les fossés ou les haies. Si on laisse subsister quelques arbres dans les intervalles des troncs coupés, jusqu'à-ce que les rejetons aient paru, on fera ensuite beaucoup de mal en les abattant; & si l'on n'a pas soin de mettre les rejetons à l'abri de la dent des bestiaux jusqu'à-ce qu'ils soyent un peu élevés, il en résultera une perte difficile à compenser. (1)

Autrefois la seule précaution que l'on prit pour les jeunes plants étoit de les défendre des bestiaux. Aujourd'hui l'on y ajoute le soin d'éclaircir le bois de temps en temps, c'est-à-dire de couper la broussaille & les plants tortus, ou qui ne promettent pas, pour donner plus d'air & de soleil à ceux qui sont de belle venue. Cette opération ne se fait gueres que lorsque

(1) Le cultivateur qui réfléchit ne peut voir de sang-froid l'incalculable dégât que les bestiaux font dans les bois soumis à une administration vicieuse, & dans les cantons où la police est sans vigueur. Un bon fossé d'enclos change une broussaille inutile, en un bois de grand prix, dans le cours de vingt-cinq ou trente années. Le mal que font les bestiaux est à pure perte. Ils font mal nourris en dévastant de grandes étendues de terrain, qui, sous une bonne administration, donneroient cent fois peut-être ce que leur arrachent des animaux languissans & chétifs. (R)

Les arbres que l'on ôte peuvent déjà être utiles, ce qui double le profit de ce procédé. La première coupe qui se fait dans le but d'éclaircir, se fait ordinairement au bout de dix ans, & la seconde au bout de vingt ans. De dix en dix ans, pendant cinquante ans au moins, l'on peut couper des arbres avec double profit, & en ayant principalement pour but de favoriser la crue des bois de construction.

Les arbres destinés à cet usage, s'ils se trouvent en terre passable, & dans une situation favorable, atteignent au bout de quarante ans, une hauteur de trente à quarante pieds, & une circonférence de vingt à trente pouces.

Il faut observer que lorsqu'on coupe un bois pour le faire repousser, il importe de raser tout, arbres & broussailles. Les arbres isolés que l'on laisse quelquefois de place en place quand l'on coupe les bois, parce qu'on les trouve trop petits & d'une trop belle venue pour être abattus, ne profitent pas lorsqu'une fois les arbres voisins sont coupés, & cependant leur ombre, & l'eau qui en dégoûte nuisent beaucoup aux jeunes plants qui se trouvent dessous.

On peut observer aussi qu'il y a de grandes inégalités dans cette manière d'élever les plants pour bois de construction. Il y a dans quelques endroits dix fois plus de plants qu'il n'en faut pour qu'ils se trouvent à une distance convenable, & dans d'autres il y a de grands vides

qu'on ne sauroit éviter. On peut élever des bois pour construction, avec une sorte de sûreté lorsqu'on s'y prend comme je l'ai dit ci-dessus; mais, avec la dernière méthode, on court risque de ne pas réussir.

Je ne connois plus qu'une seule terre en Yorkshire où il y ait de très-beaux arbres pour bois de construction, & cette possession n'est pas très-considérable. Les bois que l'on vend pour construction sont donc plus jeunes en Yorkshire qu'ailleurs: on en a vendu quelquefois de quarante ou cinquante ans; & l'on estime qu'on en tire meilleur parti à cet âge qu'on ne feroit en attendant plus tard; surtout lorsque les fossés de clôtures sont faits à neuf.

J'ai vu un bois de quarante ans vendu à raison de vingt livres sterling l'acre, les frais à la charge de l'acheteur. Le sol étoit une glaise mouilleuse qui, dans l'état arable, ne vaut gueres que sept à huit shellings l'acre annuellement, mais qu'on ne pourroit convertir à l'état arable qu'en sacrifiant une partie de la valeur du terrain. En considérant donc ce qu'il en auroit coûté pour le mettre en culture, & l'avantage qu'on retire des bois en les laissant repousser, il convenoit de laisser la piece en bois, quoiqu'il y eût plusieurs vides à remplir.

Ordinairement les ventes se font en gros, & au plus offrant, les bois étant sur pied:

cette maniere de vendre à l'enchere est la plus avantageuse au propriétaire. Les acheteurs de bois sont des gens qui entendent très-bien ce genre d'affaires; ils estiment la valeur des bois avec une forte de certitude, tandis que le vendeur est obligé de s'en rapporter à la capacité & à l'intégrité d'un tiers, qui n'ayant point d'intérêt dans la vente, manque du grand stimulant pour l'exactitude rigoureuse. Mais lorsque l'on dispose des bois à l'enchere, avec un nombre suffisant d'enchérisseurs, ce n'est plus entre le vendeur & l'acheteur qu'est le débat, c'est entre les miseurs. Tous étant bons juges de la valeur des bois en vente, ils donnent au vendeur une bonne chance pour les prix.

On estime les bois sur pied en calculant ce que chaque arbre peut valoir; non pas cependant en les mesurant tous, mais quelques-uns seulement, avec une exactitude suffisante. Lorsqu'on s'est formé le coup-d'œil, on calcule par approximation, en vérifiant de temps en temps l'estime par la mesure exacte. Lorsque les arbres ne sont pas très-gros, on se dispense de mesurer, & les experts jugent très-bien de la grosseur & de la longueur du fût.

On n'arraché jamais les arbres; on les coupe à quelques pouces de terre. Cet ouvrage se fait presque toujours à la journée. Les ouvriers sont au compte du marchand de bois, & non du tanneur. Il en résulte une grande économie

d'écorces. Des ouvriers qui font les écorces & entreprise, à tant le quintal, laissent perdre beaucoup de branches : il n'est pas de leur intérêt d'écorcer tout. Il en est de même quand le tanneur écorce à ses frais. Mais quand celui-ci achete l'écorce d'une certaine quantité de bois convenu au poids, ou que le marchand de bois fait faire les écorces pour les vendre, il est de leur intérêt dans les deux cas d'écorcer tout ce qui peut supporter les frais. Cela explique comment les écorces de ce pays-ci sont souvent d'un très-petit calibre. Lorsque la sève est bonne (1) on écorce quelquefois des rameaux qui ne sont guères plus gros que le doigt.

On sèche ordinairement les écorces en les inclinant contre des perches soutenues horizontalement.

(1) C'est une chose très-singulière que les variations que l'on observe dans la facilité avec laquelle les écorces s'enlèvent. On sait que cette opération ne peut se faire qu'au mois de mai, dans le moment où la sève est en pleine activité : c'est le seul instant de l'année où l'écorce se détache aisément de l'aubier. Il y a des cantons où le travail des écorces se fait avec plus d'aisance que dans d'autres. Cette aisance varie dans l'enceinte du même bois, & fréquemment d'un arbre à l'autre. Elle varie encore selon le vent qui souffle, & le temps qui se prépare. Pour les ouvriers experts c'est une espèce de baromètre ; & en particulier, lorsque l'air est fort électrique, l'écorce se détache avec une étonnante facilité. Nous avons fait & répété cette observation nous-mêmes. (R)

talement sur des fourches ; mais quand la saison est humide , & la terre mouillée , on fait un lit de branches sur lesquelles on met les écorces , qui sont ainsi soutenues à environ un pied de terre : c'est peut-être la meilleure méthode , dans tous les cas.

Les principaux débouchés pour les bois de construction ont été jusqu'ici les ports de Whitby & Scarborough. Mais aujourd'hui il ne reste que bien peu de bois de construction dans le Comté. Les bois semés sont en petit nombre , & jeunes encore ; les bois recrus sont en général trop épais , & ont souvent trois ou quatre chênes sur la même racine : ils sont d'ailleurs trop droits pour la construction des vaisseaux.

Le prix moyen des bois de construction est de 3 liv. sterling à trois guinées la tonne , à 40 pieds de long , rendue dans les ports. Ce prix , au reste , varie avec les temps , & encore plus avec la qualité des bois : les plus courbes ont le plus de prix. Le chêne pour bois de charpente coûte maintenant quatorze pence le pied.

Le frêne s'emploie presque tout par les charrons , & les tonneliers : ceux-ci en font des ustensiles pour la laiterie. Son prix varie entre un shelling & dix-huit pence le pied du tronc selon la grosseur.

On peut s'étonner de voir le prix du frêne aussi haut que celui du chêne ; mais le pre-

(388) AGRICULTURE

mier est plus rare, & s'employe dans le *pays*, même, au lieu qu'il faut charrier le chêne à une distance de vingt milles, pour en avoir une demande égale.

Les écorces se vendent toutes préparées au tanneur. Le marchand de bois les fait sécher dans la forêt, & en forme des magasins. Il les fait ensuite piler, & les vend à tant le *quarter*, prêtes à être mises dans les fosses. Cette méthode paroît vicieuse, en ce que le tanneur étant le meilleur juge de la préparation que les écorces doivent subir, _devroit aussi la surveiller.

L'usage de moudre les écorces n'a pas encore pris pied dans ce Comté: leur prix moyen, lorsqu'elles sont préparées, est de 10 shelling 6 d. le *quarter*.

Le charriage des bois a été long-temps un métier à part dans la vallée de Pickering. Le prix pour 20 milles, qui est la distance la plus proche, est d'environ 15 shellings la tonne de quarante pieds. On donne 30 shellings pour quarante milles: ce qui revient également à neuf pence la tonne par mille.

En supposant que le prix des bois de construction soit de trois livres sterling la tonne, dans les ports, & que le bois vienne de l'extrémité de la vallée, le transport réduit le prix de vente à 30 shellings, c'est-à-dire à la moitié. Les bois qui croissent à 20 milles du port perdent

perdent un quart , & ceux qui croissent à 10 milles du port , un huitieme de leur valeur. On peut calculer , d'après cela , combien il est avantageux d'élever des bois dans le voisinage des ports , & combien cet avantage est moindre à de grandes distances.

On s'occupe beaucoup plus de détruire les bois que de faire des plantations en Yorkshire. Il y a des parties où les forêts naturelles sont assez abondantes pour rendre les plantations peu nécessaires ; mais sur les hauteurs qui environnent la vallée , les plantations seroient extrêmement utiles , & il est réellement étonnant qu'on ne s'en soit pas plus occupé.

Le hêtre seroit , je pense , l'arbre le plus utile à propager sur les hauteurs. Il aime de préférence les sols calcaires , & prospere dans les situations fort exposées au vent. C'est le bois de construction le plus commun sur les hauteurs de Surrey & de Kent. Il réussit aussi très-bien sur les hauteurs craieuses d'Amersham en Buckinghamshire , & on commence à bien sentir les avantages de ce bois.

La maniere la plus profitable d'établir les bois de hêtre sur de tels terrains seroit de semer la graine en lignes , & de cultiver les intervalles.

Dans la vallée , on n'a gueres planté avec des vues d'utilité que quelques bouquets de sapins d'Ecosse , destinés à servir d'abri aux best.

tiaux à la pâture. Il y a pourtant un exemple d'amélioration très-bien entendue, qui a été suivi avec jugement & persévérance par un homme dont j'ai reçu plus d'idées utiles sur les plantations que de tout autre. Cet exemple vaut la peine d'être cité.

Le sol qu'il s'agissoit d'améliorer étoit un marais tourbeux qui se trouvoit presque au niveau d'un ruisseau voisin. Le sol inférieur étoit une glaise bleue. La couche supérieure étoit une terre tourbeuse, noire, & dont l'épaisseur varioit depuis un pied jusqu'à trois ou quatre pieds. Le gazon étoit un tissu de roseaux, de joncs, d'herbes marécageuses qui ne rendoit presque aucun pâturage. Il y avoit des endroits où les bestiaux couroient risque de se perdre dans la vase. Ce marais formoit un triangle de neuf à dix acres qui avoit une pente à peine sensible du côté de l'angle le plus aigu. La situation étoit très-froide, parce que cette piece placée au centre d'une plaine mouilleuse, n'étoit garantie d'aucun côté.

Il s'agissoit évidemment de donner de la chaleur, & de dessécher jusqu'au point convenable. Pour y parvenir, on commença par approfondir le lit du ruisseau & les fossés environnans. On ouvrit en même temps un large fossé d'écoulement en dedans de la limite de la piece, en laissant entre ce fossé & la borne de la possession une bande irrégulière de cinq

à dix yards de large. Ces opérations suffirent pour ôter l'eau surabondante dans la pièce, excepté à l'extrémité la plus basse, près de l'endroit où le principal fossé se dégorgeoit dans le ruisseau. La bande extérieure fut aussi suffisamment desséchée pour y faire une plantation. Les parties les plus humides furent plantées en arbres aquatiques; les parties les plus seches en arbres de forêts de diverses especes.

Il y a quinze ans que cela a été fait. La bordure, à une certaine distance, a déjà l'air d'un bois. L'intérieur de la pièce profite de l'abri que lui donne la bordure, contre les vents. Je reviendrai aux améliorations opérées dans ce terrain; mais je dirai ici quelque chose du succès des différens arbres dans ce terrain tourbeux desséché.

Le propriétaire qui a fait cette opération pense que la tourbe desséchée est le plus sec de tous les terrains, & il en a l'expérience. Dans les étés de 1785 & 1786, qui furent très-secs, la plantation fit peu de progrès & la pièce rendit très-peu. L'année suivante fut humide, & la végétation fut très-vigoureuse.

Les sols tourbeux parfaitement secs repoussent l'eau comme une éponge bien seche; mais lorsqu'ils en sont saturés, & qu'ils sont dans une situation basse ils la retiennent plus longtemps que d'autres terrains. Cependant si la tourbe se trouve fort au-dessus du niveau de

Peau, les eaux pluviales la traversent aisément.

Cela explique comment le bouleau & le sapin d'Ecosse qui, l'un & l'autre sont des arbres de montagne, ont fait des progrès rapides dans cette plantation. Au bout de quinze ans ils se sont trouvés avoir vingt pieds de haut, & dépasser toutes les autres espèces, si l'on en excepte le sapin de Norvège. Celui-ci pendant les dix ou douze premières années a fait des progrès étonnans; ensuite il a languï: font-ce les hivers rigoureux qui ont nui à cet arbre, ou ses racines sont-elles parvenues à la glaise froide qui arrête leurs progrès? Je l'ignore.

Le sapin d'Amérique, le pinaster, le mélèze, le cèdre de Virginie, prospèrent dans cette même pièce; mais aucune de ces espèces n'y a encore végété plus de sept ou huit ans. Le frêne & l'orme à larges feuilles ont l'air vigoureux, mais quoique le chêne ne paroisse pas y languir, il ne s'élève pas. (1)

Dans les parties les plus humides c'est l'aune

(1) J'attribue cela plutôt aux gelées tardives du printemps qu'à la nature du sol. Les sapins argentés y souffrent encore plus que les chênes: on a observé des jets de plusieurs pouces, que les blanches gelées avoient desséchés. Les blanches gelées d'été sont plus communes & plus fortes dans les situations basses, où les rosées sont aussi toujours plus abondantes. (A)

qui a l'avantage sur tous les autres arbres. Mais le frêne, le tremble, le peuplier, & l'osier y viennent très-bien, & il est évident, que le sol & la situation leur conviennent.

On a essayé d'y former une oseraie. La végétation en a été très-forte, & le profit depuis la seconde à la cinquième année a été considérable : c'est-à-dire au moins cinq guinées par acre annuellement; mais comme les plants commençoient à décliner, que l'oseraie ne donnoit pas l'abri dont le sol avoit besoin & qu'on avoit eu en vue dans la plantation, l'expérience n'a pas été suivie. Les osiers qu'on a laissé pousser, ont déjà été coupés, depuis pour des ridelles de chariot.

Il me paroît résulter de cette expérience que l'osier, le frêne, & le bouleau sont les arbres les plus profitables sur la tourbe desséchée. Il convient de les tenir en taillis, en coupant alternativement la bordure intérieure & extérieure. De cette manière on s'assure un abri perpétuel. Quelques sapins d'Ecosse plantés çà & là sur la limite, & qu'on tiendrait émondés du côté de l'intérieur, ajouteroient à l'agrément sans nuire à l'utilité.

Fermes.

L'étendue des fermes varie beaucoup selon les lieux. Dans les parties élevées elles sont, en général, grandes; & dans les vallées on

Les terrains tourbeux, elles sont extrêmement petites. Plus de la moitié des fermes de la vallée de Pickering sont au-dessous de 20 livres sterling; & peut-être les trois quarts des terres de la vallée appartiennent à des fermes au-dessous de 50 livres sterling.

Dans les marais de l'ouest, les situations basses, & les parties les plus riches quant au sol, les habitans sont plus rares, & les fermes plus grandes; mais si l'on considère l'ensemble de cette vallée, il n'y a peut-être pas en Angleterre un canton d'une égale étendue, & dont l'agriculture soit le premier objet, qui se trouve morcelé en un aussi grand nombre de possessions distinctes. Plusieurs sont occupées par les propriétaires, & non par des fermiers. Les partisans des petites fermes chercheront ici l'agriculture dans sa perfection; & l'on imaginera y trouver l'exactitude & les soins en proportion du peu d'étendue des propriétés. C'est tout le contraire. Il y a du bon & du mauvais dans les procédés agricoles de tous les cultivateurs du pays, mais ce n'est que dans les grandes fermes que l'on peut observer l'esprit d'amélioration qui conduit à une bonne culture.

La pauvreté & l'ignorance habitent les petites fermes, & les petits propriétaires sont remarquables par leur mauvaise culture. Qui-conque veut étudier les bonnes pratiques de

pays doit les chercher dans les grands domaines, & dans les grandes fermes.

Il ne faut pas croire néanmoins que ce rapport de la grandeur des fermes avec la perfection de la culture ne soit sujet à aucune exception. Il ne résulte pas non plus de l'exemple de ce canton que les très-grandes fermes soient favorables à l'agriculture. Celui qui tient une ferme de huit cent à mille livres sterling, est trop occupé des grands objets pour donner aux détails une attention suffisante ; moins encore pour inventer & exécuter des améliorations utiles. Ce qu'il fait d'ordinaire, c'est de suivre le sentier battu ; & les usages du canton où il se trouve, en comptant sur l'étendue de son exploitation pour compenser les non-valeurs qui résultent de la négligence sur les détails.

Les prés sont la grande partie des fermes de la vallée, & les terres arables sont subordonnées à l'exploitation des pâturages.

Parmi les petits fermiers on trouve peu d'instruction. L'on en trouve encore moins dans la classe des petits propriétaires. Mais chez les grands fermiers ou les grands propriétaires ; qui se sont instruits par la conversation & par la lecture, on trouve en général moins de préjugés, des principes d'exploitation plus sains, & les dispositions nécessaires pour perfectionner la culture.

On a souvent observé, en économie politique

que , que la liberté fait fleurir le commerce & les arts ; on peut observer de même , en économie rurale , que l'indépendance des individus fait fleurir l'agriculture. Celui qui cultive sa propre terre est le plus indépendant des agriculteurs ; le fermier à bail vient ensuite ; & le fermier *à bien plaire* est le moins libre de tous.

Les baux ne sont point en usage dans le pays : les fermiers dépendent presque tous de la volonté du propriétaire. Ils n'ont donc aucune sécurité sur l'avenir. Ils n'osent faire des améliorations dont on pourroit prendre avantage. Ce n'est que parmi les propriétaires de moyenne force & au-dessus , qu'il faut chercher ce degré d'indépendance sans lequel il ne peut y avoir de succès en agriculture , & il faut avouer qu'il n'y a aucune partie de l'Angleterre où les propriétaires aisés soyent plus nombreux que la vallée qui nous occupe , & où l'on trouve le sentiment de l'indépendance plus généralement répandu.

Les domestiques de campagne gagnent de très-gros gages , vivent de peu , & travaillent beaucoup.

Un domestique mâle gagne communément de douze à quinze liv. sterl. de gage annuel ; en temps de guerre les gages montent quelquefois jusqu'à dix-huit liv. sterling. Mais la simplicité de la nourriture compense ce haut prix. Le lit

en fait un article essentiel. Au lieu de donner de la viande trois fois le jour, comme cela est d'usage dans quelques endroits, on n'en donne qu'à un seul repas, excepté peut-être pendant les foins & les moissons.

Les domestiques sont également sobres dans l'usage de la bière. Cependant, si l'on en juge par leur air de santé, & la quantité d'ouvrage qu'ils font, ce régime ne nuit point à leurs forces.

La question tant agitée de la supériorité des chevaux ou des bœufs, comme animaux de trait à l'usage des cultivateurs, peut être examinée avec avantage dans ce pays-ci, mais je ne pense pas que les résultats de l'examen puissent être assez évidens pour résoudre le problème. Autrefois, & de temps immémorial on employoit en Yorkshire six bœufs attelés avec des jougs, & précédés de deux chevaux. C'étoit là l'attelage constant, non-seulement pour charrier sur les routes, mais pour labourer. Lors même qu'il ne s'agissoit que d'un second ou d'un troisième labour, on regardoit les huit bêtes comme indispensables; & lorsque l'on rompoit les terres, ce pesant & dispendieux attelage étoit accompagné de deux hommes, & d'un jeune conducteur.

Aujourd'hui l'on ne voit pas dans toute la vallée de Pickering une seule paire de bœufs au labourage. Tout se laboure avec la petite char-

rue sans roues, attelée de deux chevaux, sans conducteurs (1).

Pour les chariages des fermes, cependant, on se sert encore des bœufs; mais on n'en attelguères qu'une paire à-la-fois, & on met ordinairement deux ou trois chevaux devant eux. On voit aussi sur les routes beaucoup d'attelages de chevaux seuls, ce qui étoit inouï autrefois. Les gens âgés estiment qu'il ne s'emploie pas à présent un quart du nombre des bœufs qui s'employoit ci-devant.

Doit-on conclure de ce qu'on a abandonné les bœufs pour le travail, qu'ils n'y foyent pas si propres que les chevaux? Ce seroit mal raisonner. Deux motifs ont dû faire renoncer aux bœufs ou en diminuer l'usage.

Autrefois il y avoit plus de terres arables, & la charrue étoit un instrument très-lourd & mal construit, qui exigeoit, par son poids seul, une paire de bœufs de plus; cependant, l'étendue du terrain soumis au labourage obligeoit à faire travailler cette charrue en toute saison. Aujourd'hui on emploie une charrue admirablement construite, légère, & très-bien calculée pour diviser aisément le sol. Avec cet

(1) Quel exemple à citer à ceux qui s'obstinent à justifier les pratiques établies, par les convenances de localité, & qui prétendent qu'il y a toujours, dans chaque canton, de bonnes raisons des usages que le temps a consacrés? (R)

instrument, & avec le soin de prendre les momens favorables pour mettre la charrue dans les champs, on trouve que deux chevaux suffisent très-bien. Dans un pays où l'éducation des chevaux a été de tout temps un objet d'industrie, cela suffisoit bien pour faire renoncer aux bœufs quant à la charrue.

Quant aux chariages, il est aisé de comprendre que, deux attelages de charrue faisant un attelage de chariot, on doit voir beaucoup plus de chevaux sur les routes depuis qu'on les emploie exclusivement à la charrue; mais il y a une autre raison encore qui en a multiplié l'usage pour les transports. Dans le temps où l'on se servoit des bœufs, les routes n'étoient point chargées; elles étoient boueuses en hiver, mais jamais fatigantes pour les pieds de ces animaux. Aujourd'hui ce sont des chaussées faboteuses qui, en tout temps, sont ennemies des pieds des bœufs. Les fers mêmes ne les garantissent pas suffisamment, lorsqu'ils sont continuellement sur les routes.

Il n'est donc pas surprenant que, dans de telles circonstances, l'usage des bœufs ait diminué; il doit plutôt paroître étonnant qu'il s'en emploie encore un si grand nombre; & c'est à mes yeux, une preuve de l'utilité de ces animaux pour le trait. Les charretiers des bois, gens industrieux & intelligens, continuent eux-mêmes à employer les bœufs sur les routes.

Ils trouvent que , pourvu que les pieds ne leur manquent pas , les bœufs supportent mieux que les chevaux un fort travail journalier ; & ils leur trouvent encore l'avantage de se nourrir mieux dans le même temps , au même pâturage. Un bœuf qui est en pâture dans un bon pré a bientôt apaisé sa faim , & se couche alors pour se reposer ; mais les courtes nuits d'été suffisent à peine à un cheval pour se rassasier.

Les charretiers trouvent aux bœufs un autre avantage. Dans les endroits où il y a beaucoup à tirer , & particulièrement dans les montées rapides , ils considèrent une paire de bœufs comme un ancre de secours. Les chevaux sont craintifs ; & dans une route glissante , en pente roide , ils perdent courage. Les bœufs au contraire , lorsqu'ils ne peuvent avancer , tiennent bon jusqu'à ce qu'on leur aide : enfin l'on regarde les bœufs comme indispensables dans les attelages des charretiers quand il y a beaucoup à monter & à descendre.

Cette opinion peut être fondée dans un pays où l'on se sert de chevaux qui ont peu de corps , & qui ne sont qu'une race croisée de chevaux de chasse ; mais dans les endroits où l'on emploie les vrais chevaux de charrette, elle peut être mal fondée.

Un cheval de charrette de la vraie race est un pesant animal , uniquement propre au trait.

& que d'après nos lois, on ne peut employer à aucun autre usage, sans une dépense que personne ne fait. Ces chevaux à l'âge de quatre ans, coûtent de vingt à trente guinées. Avec des soins extraordinaires, un entretien très-couteux & beaucoup de bonheur, on peut espérer d'eux un service de huit à dix ans; après quoi, il est rare d'en trouver plus de 5 shillings.

Si nous n'avions dans notre isle, ou que nous ne pussions y naturaliser aucune autre espèce d'animaux de trait que cette lourde race de chevaux, sans doute elle auroit un grand prix, & elle a de beaucoup l'avantage sur les chevaux de race ou de selle, pour le trait. Mais ce qui me paroît évident, d'après ma propre expérience & mes observations, c'est que si l'on donnoit à la propagation des bœufs de trait seulement une partie des soins que l'on accorde à la propagation de la race des chevaux de charrette, on obtiendrait des animaux aussi forts, plus actifs, moins coûteux, également propres aux ouvrages de la campagne, d'un entretien beaucoup moindre, beaucoup plus durables, & d'une valeur infiniment plus grande lorsqu'ils seroient hors d'âge (1).

(1) Je ne prétends pas qu'aucune race de bœufs pût être aussi propre que les chevaux pour les charriages seuls. Je n'ai pas assez d'expérience sur ce point, qui est étranger à mon sujet: c'est aux charretiers à en décider. Ce que je soutiens c'est, qu'avec des

Les bœufs travaillent avec des jugs, & sont toujours conduits par un cheval, au moins. On commence à les atteler à deux ou trois ans, & ils travaillent jusqu'à six. On les vend alors aux engraisseurs des provinces du centre ou du Midi.

Si l'on considère les bœufs comme du bétail qu'on élève pour engraisser, & qu'on fait travailler occasionnellement, cette méthode ne paroît pas mauvaise; mais si l'on regarde les bœufs comme des animaux de trait seulement, cet usage est essentiellement vicieux; car on les travaille avant qu'ils aient toute leur force, tandis qu'ils sont encore gauches, & embarrassés faute d'expérience, & on s'en défait dès qu'ils deviennent capables de faire leur devoir & de supporter les travaux.

Un jeune bœuf doit être accoutumé aux harnois dès l'âge de deux ou trois ans, comme un poulain; mais on ne doit le soumettre à un travail rude que depuis l'âge de cinq ans. Avec ces précautions on conserve les bœufs dans toute leur force jusqu'à quinze & vingt ans. J'avois un bœuf, en Surrey, qui m'avoit servi plusieurs années, & qui à l'âge de dix-huit ans auroit tenu tête au meilleur cheval de char-

soins, on obtiendrait une race de bœufs qui seroit aussi propre qu'aucune race de chevaux au labourage, & à tous les charriages de fumiers & autres, qui sont nécessaires dans l'exploitation d'une ferme. (A)

rette du royaume pour la légèreté, la force, & la sagacité.

Je considérerai la race des bœufs de cette vallée en traitant du bétail.

Les instrumens du district dont je dois faire quelque mention, sont : les chars, les charrues, les traineaux ordinaires, les traineaux à unir (moulding-sledges) & les machines à vanner.

Les chars, & toutes les voitures à roues du district, sont fort au-dessous du pair pour la grandeur. Les plus grands chars ne contiennent que quarante pieds cubés. Les chars des bœufs ne portent que 24 pieds. Je ne parle pas de leur construction, parce que, quoique singulière à quelques égards, elle n'a rien de recommandable; mais ils ont un défaut qui demande d'être remarqué parce qu'il n'est pas particulier aux chars du pays.

L'acte de la treizieme année du présent règne, concernant les grandes routes, ordonne que, dans les routes à Turnpikes, à plus de vingt milles de Londres, aucune voiture portant des roues de trois pouces d'épaisseur, n'aura une voie plus large de quatre pieds & demi, mesurée sur le sol, de l'intérieur à l'intérieur, sous peine de cinq livres sterling d'amende.

Les chars des provinces du centre, qui sont très-grands, ont une voie de cinq pieds deux pouces; ceux du Gloucestershire, qui sont de moyennes dimensions, ont une voie de qua-

tre pieds neuf pouces ; & ceux de la vallée de Pickering , quatre pieds trois pouces seulement. Or toutes ces voies sont beaucoup trop étroites pour les dimensions des charriots cités , & on a peine à concevoir sur quel principe le bill dont je viens de parler a été calculé.

Le dommage causé à une route par un char est toujours en raison composée de l'inclinaison de la route , de la hauteur de la charge , & du peu de largeur de la voie. Le centre de gravité de la charge , y compris le char lui-même , & les deux points de la circonférence des roues qui , dans une charrette à deux roues , se trouvent en contact avec le sol , forment un triangle. Le cas où le dommage est le plus considérable est celui où le char est prêt à renverser , parce le centre de gravité se trouve reposer presque en entier sur une des roues. Le mal qui en résulte pour la route est précisément le même que s'il passoit sur ce lieu là une charrette d'un poids double. Toutes les fois qu'un des côtés du triangle se trouve dans une direction verticale , c'est le cas de cette position dommageable pour la route.

Cela posé , il est évident qu'il y a trois moyens d'éloigner la verticalité des côtés du triangle , & d'empêcher par conséquent que le char ne prenne une position qui use la route. Le premier moyen est d'élever l'angle le plus bas du triangle , c'est-à-dire de rendre la route

de niveau, ou à-peu-près. Le second est de réduire la longueur des côtés du triangle, c'est-à-dire d'abaisser le centre de gravité du chariot chargé. Le troisième moyen est d'allonger la base du triangle, c'est-à-dire de faire la voie plus large. Cela est susceptible d'être démontré mathématiquement, & il est inutile de s'arrêter ici à des propositions si évidentes.

Mais le mal qui en résulte pour les routes n'est qu'une partie des inconvéniens qui dépendent des voies étroites. Les chevaux tirent davantage, les chariots s'usent plus tôt, & sont plus sujets à verser. Ces objets sont importants pour les fermiers.

Il seroit peut-être impossible de conjecturer ce qui a déterminé pour chaque canton la voie qui y est adoptée pour les chariots.

Il me semble que la largeur des portails & des barrières devoit fixer celle des chars. Cette largeur est de huit à dix pieds, & elle comporteroit des chariots dont la voie seroit de cinq & même de six pieds. Cette largeur dans la voie auroit divers avantages. Les routes se gâteroient moins ; le travail des animaux de trait seroit plus facile, les chariots dureront plus long-temps, & il y auroit moins d'accidens. Enfin la largeur plus grande de la voie admettroit également une plus grande largeur dans le corps des chariots, & l'on ne seroit pas obligé de charger si haut.

La charrue qui est maintenant adoptée &
Agriculture. Vol. 1. N°. 10. Octobre 1796. Z

estimée universellement dans la vallée de *Pic-kering*, est la petite charrue courte sans roues , à oreille contournée, & qu'on appelle dans d'autres parties du Royaume charrue hollandaise, ou charrue de *Yorkshire*.

On a écrit des volumes sur la construction des vaisseaux ; & cependant on n'est point parvenu à établir des principes universellement adoptés. Les habitans des *Bermudes* qui construisent leurs vaisseaux à l'œil , seulement, & sans aucune mesure ni desseins exacts , surpassent toutes les autres nations dans l'art de construire des petits bâtimens qui sont excellens voiliers , & qui pincent le vent plus près qu'aucun autre.

Quelque différens que paroissent au premier coup-d'œil un vaisseau & une charrue , il y a de certains rapports dans les principes de leur construction , & la difficulté de fixer ces principes, de les réduire à une théorie régulière, est à peu-près aussi grande pour l'une de ces productions de l'art humain que pour l'autre. C'est à la pratique qu'il appartient d'approcher de plus près de la perfection.

La petite charrue simple est mieux construite dans ce pays-ci qu'elle ne l'est peut-être nulle part ailleurs. Mais cependant on remarque des différences dans la facilité avec laquelle les charrues des divers ouvriers divisent la terre.

Quoique je me sois appliqué à observer les nuances dans les diverses constructions de la char-

rue, je me fens incapable d'établir aucune règle propre à diriger les ouvriers, & qui puisse être utile dans la pratique. Je ne parlerai même qu'avec défiance des principes généraux.

La grande difficulté dans la construction d'une charrue, c'est de la rendre applicable à toutes les terres, à toutes les saisons, & à toutes les profondeurs.

Si le sol est de nature à ce que le sillon se lève tout entier sans se rompre, chaque pouce de différence dans la profondeur, exigeroit strictement une autre charrue, ou une autre disposition. Voilà le fondement de la principale objection contre l'oreille contournée, parce qu'elle ne se prête pas aux variations dans les degrés de profondeur. Si la courbe de la partie postérieure de l'oreille est faite pour retourner complètement une bande épaisse de gazon, elle est inutile pour retourner une bande mince; & en revanche; si elle est telle qu'il la faut pour retourner une bande mince, il est impossible que l'oreille retourne proprement une bande épaisse: il n'y a pas place pour que la masse soulevée soit embrassée par la courbe comme il le faudroit. L'effet inévitable de cela, c'est de deux choses l'une: ou la bande de gazon écartée uniquement par la partie supérieure de l'oreille est placée de côté & dans une direction verticale; ou l'oreille glisse & appuie dessus la bande retournée, en faisant lever le salon de la char-

rue, d'où il résulte des inconvénients évidens.

Une oreille plate avec un *enterre-gazon* mobile, (*Heel plate* ou *Bury sod*) (1) est beaucoup préférable sous ce rapport à une oreille concave ; & si l'on ajoute à l'avantage de cette protubérance, qu'elle forme un petit parapet de terre sur le sillon retourné, lequel sert ensuite à recouvrir la semence, on devra reconnoître son utilité évidente ; & je ne vois aucune raison pour ne pas perfectionner la charrue de Yorkshire par cette addition.

La partie antérieure d'une charrue de Yorkshire bien construite est admirablement calculée pour pénétrer dans la terre, & pour soulever le gazon : on ne peut rien désirer, peut-être, de plus parfait. Mais les charrues de ce district sont fort éloignées d'être toutes bien construites à cet égard. On en voit beaucoup dont le col (2) est trop épais & la gorge (3) trop

(1) Le *bury sod* est une loupe, d'une certaine courbure, qui s'adapte à volonté, plus haut ou plus bas, à la partie postérieure d'une oreille plate, pour achever de retourner & enterrer le gazon. (R)

(2) Le *col* est la partie antérieure de la *scie*, à laquelle s'adapte l'oreille, immédiatement au-dessous de l'*âge*. La *scie* est la pièce de fer ou de bois qui réunit l'*âge* au *sep* dans la partie antérieure de celui-ci. (R)

(3) La *gorge* est la partie antérieure & inférieure de l'oreille, en avant de la *scie*. La gorge doit être concave, & la courbe qu'elle décrit importe à la marche de la charrue. (R)

creusée. Le premier défaut augmente le frottement; le second fait que la terre s'attache sur le devant. On peut faire la gorge trop pleine; mais il n'est gueres possible de faire le col trop tranchant.

Le côté droit de la partie antérieure du soc doit se terminer en lame tranchante. La partie inférieure doit être plate, & parfaitement sur le même plan que le dessous du sep. La douille du soc, ou la partie postérieure qui embrasse le sep, fait souvent sur celui-ci une protubérance qui rend la charrue moins sûre, augmente le frottement, & souleve le soc, c'est-à-dire l'empêche de bien remplir ses fonctions.

La charrue de Yorkshire n'est pas seulement remarquable par sa forme excellente, elle est encore recommandable par son bas prix. L'ouvrage complet du charron coûte ordinairement sept shellings & demi, l'ouvrage du maréchal revient à 20 shellings. On commence à employer des oreilles en fer coulé, assez semblables à celles de Norfolk: cet usage réduira encore les frais de cette charrue.

Le traineau ordinaire ne paroît pas un instrument qu'il vaille la peine de mentionner; cependant ceux qui connoissent son utilité en font grand cas, & il est généralement employé dans le pays. Il sert à transporter les herbes & d'autres outils, les fagots, les épines, les turneps quand la terre est humide, &c. il est

préférable à un char pour tous ces objets. On en a de grands pour un attelage complet & de petits qui vont avec un seul cheval. La seule chose à remarquer dans la construction de ces traîneaux c'est que leur largeur est augmentée par des pieces de bois qui portent des ridelles de chaque côté.

Les traîneaux à unir la terre sont particuliers à la province. Leur usage est d'applanir la surface des prés & d'étendre les taupinieres, en même temps qu'ils égalisent le fumier. Ce traîneau s'emploie en le faisant cheminer en travers. La barre qui racle le terrain pousse en avant les taupinieres, les fourmillieres commencées, les fientes d'animaux, ou le fumier qu'on a répandu. Ces matieres brisées & mêlées par le frottement qu'elles subissent, se divisent extrêmement, & se logent peu-à-peu dans les crevasses & les petites cavités du terrain. Il en résulte un double effet pour unir & régaler la surface.

La piece de bois qui est en avant, & qui éprouve le frottement le plus considérable, s'arrondit bientôt si l'on n'a pas soin de la garnir d'une bande de fer. L'autre côté du traîneau, qui dans l'action sur le pré se trouve le côté postérieur, agit précisément de la même manière, & applanit les inégalités que la première barre peut avoir laissées. Ce traîneau a ordinairement quatre pieds & demi sur sept.

On charge quelquefois le traineau pour que l'ouvrage se fasse mieux , & le conducteur se met occasionnellement dessus , lorsqu'il s'agit d'emporter quelque protubérance plus marquée , & par dessus laquelle l'instrument pourroit passer.

L'excellente machine qui sert à vanner est trop généralement connue pour demander une description ; mais ce n'est que dans le Comté de York que l'usage en est généralement adopté.

C'est probablement aux Chinois ou à quelque autre nation de l'Est , que nous devons l'invention de cette machine. Je l'ai vue dessinée dans un ouvrage Indien avec une régularité qui montrait que le dessinateur en connoissoit très-bien l'usage. Les Hollandais à qui cette invention a été attribuée, l'ont probablement tirée des Indes.

Il y a à présent trente-cinq ans que la première machine de ce genre fut apportée dans le pays par un gentilhomme qui y étoit établi ; mais cet instrument compliqué demeura sans usage entre les mains des domestiques , & fut bientôt relegué au galeas. Quelque temps après , cette même machine fut découverte & examinée par un paysan intelligent , qui aidé d'un voisin , réussit à reconnoître son application , & à la mettre en état d'agir. Mon pere , après en avoir bien étudié le mécanisme , en fit une semblable , & même un peu

perfectionnée. Ce fut probablement la première qui eût été faite en Angleterre.

Quelques personnes intelligentes ayant eu occasion d'étudier les effets de ces machines, en firent faire d'autres sous les directions de mon pere. Mais malgré le soin qu'on eut de les appliquer à l'usage de tous ceux qui vouloient s'en servir, & malgré la curiosité & l'admiration qu'elles exciterent, il se passa quinze ou vingt-ans avant que l'usage en fut généralement adopté. Depuis dix ou douze ans la construction de ces machines est un principal objet d'occupation pour les charrons & les charpentiers du canton. Aujourd'hui il n'y a pas un propriétaire ou un fermier un peu considérable, qui n'ait une machine à vanner.

La construction de cet instrument a subi quelques variations, mais aucun changement essentiel. Sa complication est le seul obstacle à son adoption universelle; si l'on pouvoit découvrir quelque heureux moyen de simplification, il n'y auroit personne qui n'en adoptât l'usage. Elle coûte environ cinq guinées. Nous verrons ses avantages en parlant des ouvrages de la grange.

L'économie agricole du district, comme celle de beaucoup d'autres lieux, a subi un changement total par les clôtures. Autrefois toute la lisière & une grande partie du fond de la vallée de Pickering étoient en champs ouverts & communs; & de temps immémorial on y suivoit l'assolement suivant :

- 1^{re}. Année blé, ou orge.
2^{de}. Avoine, fèves, ou pois.
3^{eme}. Jachère.

Au-dessus des champs, il y avoit de grands pâturages communs pour les moutons; au-dessous des champs, des communes pour le pâturage des bêtes à cornes & des chevaux; puis des prés communs dont on coupoit l'herbe.

Sous ce système, le produit du district étoit peu considérable. Les champs, à force de porter du grain, ne rendoient presque plus rien. Les prés, fauchés d'année en année, de toute ancienneté, & ne recevant jamais d'engrais que ce que les hasards des eaux y apportoit, étoient amaigris & épuisés; enfin les pâturages étoient couverts de broussailles & de mauvaises plantes (1). La plus grande partie des pro-

(1) On ne sauroit retracer trop souvent de tels exemples à ceux qui sont placés pour influer sur les améliorations de la culture, dans les pays soumis à la désastreuse routine des jachères. Dans cette routine, on a beau perdre une année sur trois pour donner au sol un prétendu repos, la terre fatiguée, non pas de produire, mais de produire *des grains*, ne rend que de chétives récoltes. On manque de pailles pour faire des fumiers. Les prés s'appauvrissent faute d'engrais. Les bestiaux sont maigres, faibles, en petit nombre. Le cultivateur n'a point d'avances; la culture est imparfaite, languissante; la ruine amène la ruine. Supposons l'introduction des

(414) AGRICULTURE

duits de chaque ferme alloit à l'entretien des chevaux & des bœufs employés à l'exploitation ; & les payfans propriétaires, même ceux qui avoient des possessions étendues, mouroient de faim sur leurs domaines.

Les clôtures qui se sont faites dans ce siècle ont absolument changé le système de culture. Elles ont augmenté , au triple peut-être , les produits nets du district , & ont singulièrement changé la valeur comparative des terres.

Autrefois les prés étoient regardés comme la partie la plus précieuse d'un canton. On a vu échanger des prés froids , humides , éloignés des habitations , contre des portions de champs communs , qui aujourd'hui se trouvant à portée d'une ville, encloses, & mises en prés valent cinq fois ce que vaut la même étendue en prés naturels parce que ceux-ci sont demeurés ouverts & communs , & par conséquent ont été peu améliorés. Ce fait est le plus marquant dont j'aye eu connoissance pour prouver qu'un changement dans les circonstances générales d'un canton , peut en produire de très-considérables dans l'agriculture des individus.

trèfles , des sainfoins , des racines qu'il faut cultiver à la main : les fourrages sont doublés ou triplés , les bestiaux se multiplient , les récoltes sont plus que doublées en pailles & en grains , les fumiers sont abondans ; les terres augmentent de rente d'année en année ; & l'aisance est généralement répandue chez les cultivateurs. Quels miraculeux changemens ! quel beau secret ! & qu'il est simple ! (R)

Ces améliorations extraordinaires n'ont pas été l'effet des enclos seuls ; elles ont encore résulté de la conversion des vieux prés en champs, & des champs en prés : conversion qui, lorsqu'elle est faite avec intelligence, ne peut être qu'avantageuse au fermier, & qui, dans ce cas, a été singulièrement profitable aux propriétaires fonciers.

Les principaux objets de l'industrie des cultivateurs sont :

Le beurre ; dont le meilleur va à Londres ; & les qualités inférieures s'écoulent dans les villes du Yorkshire.

Les vaches.

Les bœufs pour le travail.

Les chevaux, surtout les chevaux de selle ; dont il sort chaque année une très-grande quantité qui va dans les Provinces du midi.

Les bœufs gras & les moutons gras qu'on transporte dans les ports de Whitby & Scarborough,

Le lard. On en a exporté dans les dernières années d'assez grandes quantités pour l'ouest de Yorkshire.

Quant aux végétaux :

Le colza est-ce qui fait entrer le plus d'argent dans le pays.

L'avoine s'exporte en grande quantité. Il sort aussi un peu d'*orge* & de *pois*. Mais si l'on considère la bonté du sol, on doit s'étonner qu'il s'exporte si peu de blé. Depuis quelques années,

néanmoins , l'exportation de ce grain a augmenté , & le port de Whitby s'est pourvu dans la vallée.

Outre ces objets de vente , l'agriculture du pays embrasse diverses productions , telles que les foins naturels & artificiels , les turneps les pommes de terre , le lin , & le tabac.

Mais avant de considérer ces articles en détail , il importe de nous occuper séparément de plusieurs objets généraux , tels que les assolemens , la nature des terres & la manière de cultiver ; les engrais & la manière de les appliquer ; les semences & la manière de semer ; les herbes & animaux nuisibles ; les récoltes de grains ; l'économie des bestiaux dans les cours des fermes ; & enfin les marchés.

Il ne faut point chercher , dans ce canton , de cours régulier de récoltes établi par l'usage. Chacun suit son jugement dans l'application de son terrain à telle ou telle culture d'année en année. Cette méthode est , en général , celle des pays de prés , où la charrue est un objet secondaire.

Lorsqu'un pré commence à s'affoiblir , on le rompt , & on le cultive à la charrue jusqu'à ce que quelqu'autre morceau de pré demande la même opération : alors le premier est remis en pré.

Dans les provinces du centre , où cette alternance des prés aux champs a été pratiquée

de temps immémorial, cela est devenu un assésément réglé ; mais dans cette vallée , où la diversité des terrains est infinie , & où l'on n'a pas encore une longue pratique sur la succession des récoltes , l'usage n'a rien fixé , à cet égard , qui soit universellement adopté.

Les terres qui ont été labourées pendant des siècles font des prés qui se soutiennent beaucoup plus long-temps que ceux qui s'établissent dans des terres qui n'ont été travaillées que peu d'années par la charrue. Une terre riche , dans une situation fraîche , retient aussi beaucoup plus long-temps un gazon vigoureux & bien fourni , qu'une terre de peu de fond dans une situation sèche.

Il y a plusieurs parties des terrains frais ; parmi celles qui ont été encloses le plus anciennement , qui sont en pré depuis plus de cinquante-ans , & qui quoique fauchées tous les ans , sont encore bien gazonnées , d'un grand produit , & d'un bon foin. Rompre de tels prés , qui forment une grande portion de la vallée , pour soumettre les terres à une succession quelconque de récoltes , seroit évidemment une économie vicieuse.

La nature des terres , & la manière de les cultiver , est un sujet complexe qui exige des subdivisions.

Il convient de considérer successivement : L'espèce de terrain que l'on cultive ; la cou-

(418) AGRICULTURE

che inférieure, & les desséchemens souterrains & les défrichemens, & le labourage.

Il y a une grande diversité de terres dans la vallée: c'est une sorte de curiosité, que ce canton sous ce rapport. Dans une enceinte de quelques milles on trouve des bruyeres seches, & des riches marais; des terres ingrates parsemées de grès; des terres à chaux très-minces; des terres à pierres rouges; des luts riches mêlés des petites pierres rouges; & enfin de la glaise bleue. Ce qu'il y a de plus remarquable c'est que toutes ces diverses terres se trouvent quelquefois dans l'enceinte de la même ferme.

Cette variété est un aiguillon pour l'industrie elle oblige le fermier à mépriser ces routines & ces préjugés qui prennent possession des esprits dans les endroits où il y a uniformité de terrains & de pratiques. Cela peut servir à expliquer l'esprit d'amélioration qui est si remarquable parmi les cultivateurs du district.

Les pentes, & surtout le pied des côteaux, abondent en sources, & en terres mouilleuses & froides; mais dans la plaine il y a presque partout une couche inférieure de gravier qui évite la peine des desséchemens souterrains, & donne au sol assez de consistance pour recevoir le bétail en hiver. L'exemple de desséchemens qui m'a le plus occupé est celui de trente acres d'un terrain froid & stérile situés auprès d'un côteau, & qui gagna par cette opération, une

valeur plus que double. C'étoit une pâture maigre & grossière : le dessèchement en fit une bonne terre à blé ; & aujourd'hui c'est un pré bien gazonné & productif.

Les clôtures des communaux & terrains vagues qui ont été exécutées depuis quelques années , ont tourné l'attention des cultivateurs vers les meilleurs moyens d'opérer les défrichemens,

L'écobuage est extrêmement estimé & pratiqué dans le canton. C'est une pratique qui est généralement peu connue en Angleterre , & qu'il importeroit néanmoins que chaque cultivateur entendît bien.

Lorsqu'on a débarrassé le terrain des buissons , & autres obstacles qui s'opposent au travail de la bêche , on enlève le gazon , avec un instrument fait exprès ; par pièces d'environ un pied de large & trois pieds de long. C'est au jugement de l'ouvrier à déterminer l'épaisseur des gazons. S'ils sont trop épais , ils brûlent difficilement ; s'ils sont trop minces , les racines ne sont pas complètement détruites , & le produit des cendres n'est pas assez considérable. Un gazon spongieux dont les racines sont entrelacées à une grande épaisseur , exige d'être enlevé plus épais qu'une croûte sèche & peu gazonnée. L'épaisseur moyenne peut être d'un pouce , environ.

Il faut surveiller les ouvriers pour s'assurer qu'ils font les pièces de gazon de la grandeur convenable , & les enlèvent proprement. Le prix est de dix à douze shellings l'acre. Les racines sont un obstacle à cette opération ; mais ce qu'on redoute principalement , comme endommageant les instrumens , ce sont les pierres.

Si les gazons sont humides , & le temps pluvieux , on les dispose sur le côté pour les faire sécher. Si les gazons sont spongieux & secs , & le temps beau , on épargne ce travail. On brûle toujours en petits tas rapprochés , & il n'y a pas de méthode fixe pour

(420) AGRICULTURE, &c.

formation de ces tas. Ordinairement, on dispose les gazons en cercle de trois pieds de diamètre, en les plaçant sur le côté, & on forme un dôme en les plaçant successivement de manière que la voûte se soutienne par elle-même. Les uns, en construisant les tas, de la fougère ou quelque matière bien sèche du côté du vent, en la faisant pénétrer sous la voûte, & l'entourant des gazons les plus secs, & allument ensuite successivement chaque tas avec des étoupes goudronnées.

D'autres, dans la construction des tas, ménagent une cheminée au milieu, & mettent le feu en jetant des cendres chaudes par cette ouverture. Lorsqu'on manque de matières bien sèches pour mettre le feu, cette méthode peut être préférable.

Lorsque les gazons ne sont pas très-secs, les tas sont plus difficiles à faire. Il importe surtout de les maintenir légers, & vides en dedans, en ayant toujours égard au côté d'où souffle le vent. Un peu de pratique & d'attention apprend bientôt ce qu'il y a à faire.

Si les tas sont trop gros, ils s'écroulent, & le vide nécessaire de l'intérieur se détruit; s'ils sont trop petits, le feu perd sa force en se répandant au dehors. Lorsque le feu est en train, on ajoute de temps en temps de nouveaux gazons sur les tas, dont la formation devoit n'avoir employé qu'environ la moitié de la totalité du gazon enlevé. Mais cette addition des gazons par-dessus le tas ne doit se faire que quand le feu a commencé à se montrer au-dehors; & il faut toujours les appliquer du côté où le feu est le plus vif.

Les gazons non-brûlés glissent quelquefois sur les côtés du tas, & demeurent déposés à l'entour; on les relève alors pour les replacer dans le centre jusqu'à ce que le tout soit réduit en cendres.

Le brûlement se fait ordinairement par des femmes, à la journée; quand c'est par acre, cette opération coûte de cinq à six shellings: quelquefois l'écobuage entier se fait à tant par acre.

Généralement on répand les cendres aussitôt qu'elles sont froides, & même avant, & l'on laboure immédiatement pour la récolte, à une petite profondeur,

GENÈVE : 208 Toises de Fr. au-dessus du niveau d

OCTOBRE 1797.

C. du S.		Etat du Ciel	Jours du Mois.	Evaporation de la Terre.		
				Le signe — indique que l'appareil a reçu de la pluie ou de la neige. Les deux zéros qu'il n'y a point eu d'évaporation.		
				L. du S.	2 h.	C. du S.
				Li. Dou.	Li. Dou.	Li. Dou.
calme	Couv. , id. , id.		1	—	0. 8	0. 2
NE	Sol. id. , id. , cl.		2	0. 2	0. 7	0. 1
calme	Sol. , id. , cl.		3	0. 1	0. 3	0. 1
calme	Couv. , id. , fol. , nu.		4	0. 1	0. 5	0. 1
calme	Couv. , id. , id.		5	0. 0	0. 2	0. 0
calme	Ceu. , fol. , couv.		6	—	0. 3	0. 0
calme	Pl. , couv. , fol. , nu.		7	—	0. 7	0. 3
calme	Couv. , fol. , nu.		8	0. 2	0. 4	0. 1
NE	Brouill. fol. , id. , cl.		9	0. 1	0. 4	0. 0
NE	Sol. , id. , cl.		10	0. 1	0. 5	0. 0
NE	Sol. , id. , nu.		11	0. 1	0. 5	0. 1
NE	Sol. , id. , nu.		12	0. 2	0. 7	0. 1
NE	Nu. , id. , id.		13	0. 3	0. 4	0. 1
NE	Couv. , pl. , id.		14	0. 1	—	—
NE	Sol. , id. , cl.		15	0. 1	0. 5	0. 2
NE	Sol. , id. , cl.		16	0. 1	0. 4	0. 1
calme	Sol. , id. , cl.		17	0. 1	0. 3	0. 0
O	Sol. , id. , cl.		18	0. 1	0. 3	0. 0
O	Brouill. , fol. , nu.		19	0. 1	—	—
O	Brouill. , pl. , id.		20	—	—	0. 4
O	Pl. , id. , id.		21	1. 5	0. 6	0. 1
O	Sol. , couv. , id.		22	—	0. 6	0. 1
O	Couv. , id. , id. , pl.		23	0. 1	0. 2	0. 0
O	Couv. , id. , id.		24	0. 2	—	—
O	Pl. , id. , id.		25	—	0. 2	—
O	Nu. , id. , id. , pl.		26	0. 1	0. 7	0. 4
O	Nu. , fol. , nu. , cl. , nu.		27	0. 3	0. 1	—
calme	Couv. , id. , id. , pl.		28	—	0. 0	0. 1
calme	Pl. , couv. , id. , id.		29	0. 1	—	—
calme	Couv. , id. , id.		30	—	0. 7	—
E	Couv. , pl. , pl.		31	2. 2	0. 1	—
	Couv. , id. , pl. , couv.					
				Total. Moy.		
				6. 9 9. 3 2.		
Ouest.				Tempé		

A G R I C U L T U R E.

DÉTAILS SUR L'AGRICULTURE DU COMTÉ DE YORK. Tirés de l'ouvrage intitulé (THE RURAL ECONOMY OF YORKSHIRE, de Marshall) (1).

Moisson.

IL n'y a aucun département de l'économie rurale dans lequel les procédés des provinces du Nord soyent aussi différens des méthodes des provinces du centre & du Midi, que dans les opérations de la moisson ; & le Yorkshire se distingue encore par certaines particularités de détail. On coupe le blé à la faucille ou à la faux.

Il est probable que les neuf dixièmes du blé qui se coupe à la faucille, dans le Royaume, est moissonné par des hommes. En Surrey & en Kent on voit quelquefois des femmes la faucille à la main : en Norfolk presque jamais. En Yorkshire, au contraire, il est très-rare de voir un homme se servir de la faucille ;

(1) Nous omettons le procédé des semences qui n'offre rien de neuf, & le chapitre des herbes nuisibles qui n'a gueres d'intérêt pour d'autres pays. (*Rij* Agriculture, Vol. 2, N°. 11, Novembre 1797. Aa

c'est, presque partout, les femmes qui moissonnent.

Un *assortiment* (a set) est composé de trois femmes & d'un homme. Ces quatre personnes moissonnent un acre par jour d'un blé médiocre. Si le blé est clair, un homme suffit pour lier ce que quatre femmes peuvent couper. Si le blé est très-épais, il faut un petit garçon qui fasse les liens.

Quelquefois on pose à terre les liens, prêts à recevoir la poignée de blé que les femmes coupent ; mais ordinairement elles déposent le blé en javelles, dont deux font la petite gerbe. Le lier ramasse soigneusement les épis avec les jambes, comme l'on ramasse la paille à la grange pour la lier. Cette manière est un peu plus longue, mais beaucoup meilleure, parce que les gerbes sont plus égales, & les épis mieux rangés.

Les journées de femmes, pendant les moissons, sont de 10 pence, & celles des hommes de 2 shellings. Le blé se coupe donc pour 4 shel. 6 d. l'acre, tandis qu'en Surrey la même opération coûte 10 à 12 shel. & dans aucun des pays que j'ai eu occasion d'observer, ne coûte pas moins de 7 à 8 shellings.

Mais l'économie que l'on fait sur les journées est bien loin d'être le seul avantage que l'on trouve à employer des femmes pour moissonner. On occupe un plus grand nombre de

bras ; le revenu de l'indigent s'en accroit , la taxe des pauvres , par conséquent , est moins forte ; & la communauté , considérée dans son ensemble , y gagne par la diffusion de l'industrie & d'une occupation qui favorise la santé. Quelle différence , sous ce dernier rapport , entre les occupations de l'agriculture & celles des fabriques ! Les travaux de la moisson , loin d'être considérés par les femmes comme trop pénibles , sont regardés par celles qui y ont été élevées , comme une véritable fête , comme une diversion très-agréable aux travaux sédentaires qui les occupent le reste de l'année.

Le blé & le seigle se disposent en tas de dix à douze gerbes chacun ; deux de ces petites gerbes sont employées à couvrir les autres , dans le haut , & se placent par dessus en forme de bonnet.

Dans le Sud de l'Angleterre , on ne couvre jamais le blé : dans le Yorkshire on ne le laisse jamais découvert. Les deux méthodes sont mauvaises. Dans le beau temps , les épis ne sauroient être trop exposés au soleil & à la rosée. Si le grain est retraits , un peu de pluie , même , lui fait du bien. Lorsque l'année est pluvieuse , les blés ne peuvent être trop soigneusement couverts. Il faut donc , sur cet objet là comme sur beaucoup d'autres , que le fermier consulte la saison , plus que l'usage du pays.

Dans les provinces du Midi , le blé que l'on

(424) AGRICULTURE

coupe à la faux, se coupe *en dehors* (1), & se sèche en ondins. En Yorkshire tout le blé que l'on fauche se coupe *en dedans*, contre le grain qui est debout.

La maniere de lier varie selon les lieux. Dans certains Districts l'on lie les épis au milieu de la paille, & cet usage commence à gagner dans la vallée de Pickering, mais autrefois la pratique invariable, & encore aujourd'hui la méthode dominante, dans la vallée, c'est de lier la paille tout auprès de l'épi, par javelles, & de mettre la javelle debout. Cet usage est admirable quand le blé a de la mauvaise herbe, ou se trouve mêlé de foin artificiel.

Lorsqu'on fauche pour lier, on attache ordinairement au manche de la faux un triple pliant, dans le même genre que le double pliant que l'on emploie en Kent pour faucher en ondins. Cet instrument est commode pour ranger le blé scié par le coup de faux. Lorsque le blé n'est point versé, un homme qui fait arranger son pliant, & donner convenablement le coup de faux, dispose le blé, à mesure qu'il le coupe avec une parfaite régularité. Si le blé est un peu versé, mais cependant fauchable,

(1) Ce qu'on appelle *couper en dehors*, c'est faucher en laissant à sa droite le blé encore debout, sur lequel on prend un coup de faux. *Couper en dedans* c'est laisser le blé qui est debout à gauche, en appuyant contre les épis debout le blé que l'on fauche. (R)

On adapte à la faux un pliant simple, semblable à celui dont on se sert en quelques endroits pour faucher *en dehors* (1).

(1) On a beaucoup discuté la convenance comparative des deux méthodes, c'est-à-dire de moissonner le blé ou de le scier ou faucher. Nous allons rendre compte de ce que nous avons nous mêmes éprouvé & observé à cet égard. En 1794, le haut prix des journées de moissons & la rareté des bras, nous conduisirent à essayer la faux sur les blés. Nous avions un ouvrier habitué à cette méthode. Il adaptoit un pliant simple à la manille où s'applique la main droite, lequel faisoit ressort, & étoit retenu à l'autre bout par une ficelle fixée à la douille de la faux, & fortement tendue. Avec cet appareil simple, il rangeoit très-proprement les épis, en fauchant *en dedans*. Nous avons calculé que cet ouvrier faisoit à lui seul l'ouvrage de trois moissonneuses. Il préféroit n'être pas suivi par une releveuse, parce que lorsqu'il avoit fauché un certain temps, il se délassoit à relever ce qu'il avoit coupé, & à le disposer en javelles, en s'aidant d'une faucille. S'il faisoit du vent, il avoit soin de prendre le vent à sa droite. Lorsque les blés étoient bien droits & assez épais, son ouvrage étoit très-propre, & évidemment économique. Lorsque le blé étoit clair, il se rangeoit mal, & les épis se plioient quelquefois devant la faux, qui glissoit par-dessus. Lorsque le blé étoit versé, l'ouvrage étoit difficile & lent. Enfin lorsque le blé étoit couché en désordre, l'ouvrage étoit lent & mauvais. Dans les terres dont la surface est semée de grosses pierres, cette méthode ne paroît pas admissible. L'apprentissage n'est point difficile : un jour ou deux suffisent à

Le faucheur est suivi d'une femme qui relève & lie le blé par javelles : elle se sert pour cela d'un rateau à longues dents qui lui évite

un homme qui sait manier la faux. La différence essentielle entre l'opération du fauchage de l'herbe & du fauchage du blé, c'est que, dans celle-ci, l'effort croit à mesure que le coup se prolonge ; & le moment où la plus grande force est nécessaire, est celui où l'on porte sur la faux tout ce qu'elle a ramassé, & où l'on l'appuie contre le blé debout. Il en résulte la convenance de prendre, en fauchant le blé, une attitude différente. Dans le fauchage des prés, on marche les pieds écartés, tous deux à même hauteur, & marquant deux voies sur le sol. En fauchant le blé, il faut que le pied droit précède le gauche, qui suit dans la même voie, à-peu-près comme dans l'exercice de l'escrime. Alors le faucheur se trouve faire face au blé debout *dans le moment* où le plus grand effort est nécessaire, & cette position le lui rend moins pénible. Les batteurs en grange prétendent que le blé fauché est beaucoup plus difficile à battre, parce que les épis ne sont pas aussi également rangés que dans les gerbes du blé moissonné : il nous a paru qu'il y avoit en effet quelque différence, mais moindre que ne vouloient le faire croire des ouvriers prévenus contre la méthode. Il faut néanmoins faire entrer cette difficulté dans le calcul des inconvénients, parce qu'on l'éprouvera dans tous les endroits où la méthode n'est pas celle du pays. Pour nous résumer, nous pensons que, dans certaines années, & certaines circonstances dont le cultivateur doit savoir juger, la méthode peut être bonne. (R)

de se baïsser. Lorsque le blé est épais ; il y a ordinairement un petit garçon qui fait les liens pour la femme.

La maniere de placer les javelles debout sur le champ demande de la pratique pour faire un ouvrage propre & rapide. Le mouvement le plus expéditif, c'est de saisir le collet de la javelle au lien ; d'élever le bras de toute sa hauteur, & de le ramener brusquement en bas, en donnant une impulsion circulaire, qui fait écarter la paille & élargit la base du cône. Cette maniere n'est pas réputée la meilleure, parce qu'elle ne donne pas à la javelle une solidité qui la fasse résister aux orages. Voici comment on s'y prend pour donner à ces petites tentes toute la solidité désirable.

Le lieur empoigne la javelle des deux mains immédiatement au-dessus du lien ; puis la tenant dans une situation verticale, il égalise la base en frappant quelque coups sur le terrain. Il passe ensuite la main droite de côté dans la paille, au-dessous du lien, & écarte circulairement cette paille par un mouvement du bras, de gauche à droite. Il prend alors les épis de la main droite, & fait la même chose de la droite à la gauche, par un mouvement circulaire de la main gauche. Cette opération se fait en regardant le Nord ; il en résulte un cône vide très-régulier, & qui a une ouverture du côté du Midi pour seconder l'action du soleil & du vent de Sud.

Tout cela paroît long & embarrassant , sur le papier , mais c'est l'affaire de quelques secondes pour des mains exercées.

Lorsque l'orge & l'avoine sont suffisamment élevées pour subir la même opération , on la leur applique également. On y trouve divers avantages. Le grain est plus beau , le battage est plus prompt , & la paille beaucoup meilleure pour fourrage.

L'objection la plus apparente contre cette méthode comparée à celle de faucher en ondins, c'est la perte de temps. Mais comme on emploie à lier, des hommes qui ne savent pas faucher, des femmes ou des jeunes gens, l'ouvrage de la moisson va aussi vite que dans les endroits où l'on fauche le blé *en-dehors*. Avec ce dernier usage, il faut retourner les ondins, souvent plusieurs fois. On met plus de temps à charger & à resserrer la moisson ; on court de plus grands risques par les pluies ; il faut plus de place pour loger les grains , plus de temps pour les battre , & leur qualité est inférieure.

Comme j'avois pratiqué l'agriculture dans un District où l'usage est de faucher en ondins, j'imaginois qu'on ne pouvoit lier en javelles que dans les cantons où l'on recueille peu de grains. Je me trompais. Les parties élevées du Yorkshire (*wolds*) sont un pays de grain proprement dit. Cependant on y lie toujours

l'avoine & l'orge même, en javelles. Un fermier de ce canton là recueillit, il y a quelques années, de trois à quatre mille *quarters* d'avoine & d'orge; & la totalité de sa récolte fut liée en javelles.

Je connois trop bien les difficultés qu'on éprouve lorsqu'on essaye de s'écarter de l'usage du canton, pour recommander aux fermiers des provinces du Sud de lier en javelles, dans tous les cas; mais je n'hésite pas à recommander à tous ceux qui ont des avoines ou des orges à couper en temps pluvieux, & dans une saison tardive, d'adopter cette méthode.

En Surrey, en Kent, & dans les autres endroits où le blé se fauche en ondins, il ne seroit point difficile de lier les javelles, sans cesser de faucher le blé *en-déhors*.

Soit que l'on fauche le blé *en-déhors* ou *en-dedans*, il faut que le faucheur soit toujours un peu tourné du côté du grain qui est debout. Ainsi, en fauchant *en-déhors*, le pied gauche, & la main gauche doivent être un peu en avant; & en fauchant *en-dedans*, le pied droit & la main droite doivent au contraire précéder.

La manière d'arranger le pliant au manche de la faux influe beaucoup sur le travail: il faut que cet instrument embrasse tout ce que la faux coupe; & ne prenne point sur le blé

qui reste debout. En donnant le coup de faux, il faut avoir soin de le prolonger comme si l'on vouloit jeter derriere soi le blé coupé (1). Afin de pouvoir faire ce mouvement bien complet, il ne faut pas prendre une bande trop large, ni se servir d'une faux trop longue.

Les jeunes gens qui savent manier la faux, & qui ont de la disposition à se prêter aux choses utiles, peuvent être dressés en très-peu de temps à faucher proprement des deux manieres. On n'éprouveroit pas plus de difficulté à former des ouvriers à lier, & des jeunes garçons à placer debout les javelles liées. On pourroit prendre pour cela un temps où l'ouvrage ne presseroit pas; on en feroit d'abord une sorte d'amusement; & l'exemple de quelques acres recueillis de cette maniere, une année, pourroit engager à répéter l'opération l'année suivante sur une plus grande étendue.

Dans les opérations de la grange, ce qu'on peut remarquer de particulier au district, c'est que la paille se lie après le battage, & que le grain se vanne avec la machine à vanner, ainsi que nous l'avons déjà dit.

(1) Ceci est pour ceux qui fauchent *en dehors*, parce qu'en jetant le blé en quelque sorte derriere eux, il se trouve rangé sur leur gauche, attendu la direction oblique à droite qu'ils doivent maintenir en fauchant. Lorsqu'on fauche *en dedans*, le coup de faux est beaucoup moins étendu. (R)

Toutes les pailles se lient à la grange. Cette méthode est excellente partout où l'on ne consume pas la paille à mesure que l'on bat. La paille en gerbes tient moins de place, se transporte plus aisément, & conserve mieux sa faveur que la paille en tas. Dans tous les pays où les bestiaux s'hivernent à l'étable, le liement de la paille est un article essentiel de l'économie rustique. Une gerbe contient ce qu'un homme peut embrasser de ses deux bras : c'est le repas ordinaire de deux bêtes à cornes ; en sorte que les soins de nourriture à l'étable sont plus faciles, & l'on évite la dispersion de la paille. (1)

Les opérations des cours de la ferme comprennent l'emploi de la paille, & la formation des fumiers.

Dans la vallée de Pickering & dans les fermes des terrains tourbeux, on tient les bestiaux sous des hangars, où ils sont attachés. Lorsque ces hangars sont bien exposés & fermés aux extrémités, ils sont préférables à des étables fermées. La chaleur & la sécheresse sont

(1) Nous supprimons ici les détails sur la machine à vanter : ils seroient inutiles si l'on n'avoit pas sous les yeux le modèle de la machine. Il suffit de dire, pour faire comprendre les avantages de cet instrument, que deux personnes qui savent s'en servir, vannent environ quinze quarterons de blé par jour : c'est-à-dire à-peu-près soixante-sept quintaux. (R)

sans doute d'un grand avantage aux bestiaux l'hiver ; surtout à ceux qui sont maigres , & nourris à la paille : car les bestiaux gras & bien nourris supportent mieux le froid. Mais sur ce point , comme sur beaucoup d'autres , il y a un milieu à garder. Les bêtes tenues dans des étables chaudes muent trop tôt au printemps ; en sorte que lorsqu'on les met à l'herbe elles ont souvent plus à souffrir du froid qu'elles n'auroient souffert sous un hangar dans les mois d'hiver.

Mais la chaleur du bétail n'est ici qu'un objet secondaire : ce qu'on a surtout en vue en attachant les bestiaux sous des hangars , c'est d'épargner le fourrage. On leur fait manger souvent la totalité de la paille , & ils couchent sur la terre sans litière. On hiverne vingt à trente têtes de bétail avec la même quantité de paille qu'on emploie dans les provinces à blé pour hiverner huit ou dix bêtes.

La fiente des bestiaux tombe dans une rigole profonde que l'on vide lorsque les bêtes sortent pour boire , ou pour pâturer.

Les bestiaux liés reçoivent à manger quatre fois dans la journée. La meilleure paille se donne aux jeunes bêtes , & la plus mauvaise aux bœufs. Les vaches ne se nourrissent guères qu'au foin , même lorsqu'elles ne donnent point de lait. Cette pratique est évidemment vicieuse , surtout pour la race des vaches à courtes cornes

qui ont souvent de la difficulté à faire leur veau.

On voit que la manière d'employer la paille dans ce district est calculée sur le genre de culture du pays. Lorsque les pâturages sont abondans, les bestiaux sont en grand nombre, & la paille est rare. Dans un pays de grain, au contraire, la paille est plus abondante que le bétail, & l'ambition des fermiers est de faire fouler la plus grande quantité de paille qu'il est possible, pour la convertir en fumier.

Il est étranger à l'objet qui m'occupe d'examiner à fond la convenance de faire fouler la paille pour la convertir en fumier. Il y a assez de bestiaux dans ce pays-ci pour manger la totalité de la paille qu'il produit; en sorte que fouler la paille en fumier, ou perdre la paille, paroissent une seule & même chose. On en a besoin pour fourrage, il seroit évidemment absurde de la faire pourrir. Tout ce que je me propose dans ce moment, c'est de recommander une méthode plus économique de faire les fumiers quelle que soit leur qualité & leur quantité.

L'usage général est de placer le tas dans la partie la plus élevée de la cour, ou encore de le disperser sur la pente, comme pour affoiblir à dessein ses fels fertilisans.

La partie de l'urine qui ne se mêle pas avec le fumier, est éconduite par le chemin le plus

court, comme si l'on imaginoit qu'elle doit nuire aux terres.

Les fumiers dont les neuf dixièmes sont de la paille, perdent, même en temps sec, une partie de leur humidité. Pendant les pluies, ils perdent de leurs principes fécondans, malgré la quantité de paille avec laquelle ils sont mêlés. Mais combien plus considérable n'est pas la déperdition des sels lorsque le fumier est composé de fiente & d'urine, avec assez de paille, seulement, pour tenir le tout en une masse! En temps sec il en découle une humidité considérable; & en temps de pluie le tas se délave complètement. Il est douteux, du moins, que dans certains cas, la moitié de la vertu fertilisante ne soit dissipée à pure perte. Il est certain que ce qui se perd est toujours trop; & c'est un point important pour tous les cultivateurs, dans les pays où l'on hiverne les bestiaux à l'étable, que de soigner la fabrication des fumiers.

La méthode de Norfolk, de garnir le fond de la cour avec de la terre, est indispensablement nécessaire dans ce district, si l'on veut tirer bon parti des fumiers. Il n'y a point de meilleur engrais pour les prés, que la terre saturée du suc des fumiers: elle s'insinue plus promptement dans l'herbe, & son effet est ordinairement plus marqué que celui du fumier même. Néglier une telle source d'engrais,

c'est négliger une mine d'or & d'argent qui peut être exploitée avec la plus grande facilité. L'attention sur ce point laisse aux champs la même quantité d'engrais, & donne annuellement aux prés une substance riche qui, sans cela, se seroit écoulée à pure perte dans les fossés, ou auroit pénétré dans la terre sans profit. (1)

Mais avant de pouvoir garnir avec avantage le fond de la cour, de terre, il faut avoir préparé ce fond convenablement; c'est-à-dire l'avoir foulé, ou pavé comme le fond d'un abreuvoir; en choisissant, pour placer le tas, l'endroit où les charriots peuvent facilement aborder, & où tous les égoûts des étables se rassemblent. Au-dessous du fumier, il faut pratiquer des rigoles, que l'on remplit, dans les temps de loisir, avec de la terre tirée des fossés, ou raclée des chemins, ou encore avec des retailles de grès. On établit le tas de fumier là-dessus, en ayant soin de le border, tout autour, d'un petit parapet de terre, soit pour empêcher que les eaux de pluie ne viennent affaiblir ses suc, soit pour prévenir l'extravasation de l'humidité que le fumier fournit ou reçoit des étables.

Ble.

J'ai étudié & détaillé tous les procédés re-

(1) Voyez sur l'important sujet des engrais, l'extrait du 15^{me} chapitre du projet de rapport du Département d'Agriculture, pag. 249 de ce vol. (1)

latifs aux terres arables dans le Comté de Norfolk, qui peut servir de modèle pour la culture des grains en terres légères. Ce n'est pas le cas d'entrer ici dans les mêmes détails sur les grains, parce qu'ils ne sont qu'un objet secondaire, & que la diversité des terrains s'oppose à une parfaite régularité dans les affolements. Cependant, comme il y a dans ce district un esprit d'améliorations très-actif, & que chacun s'empresse de mettre en pratique ce qu'il juge utile, il y a de bonnes choses à prendre dans certaines particularités de la culture des champs.

Les détails qui, relativement au blé, me paroissent mériter quelque attention, sont :

- 1°. L'espèce communément cultivée.
- 2°. La culture des variétés.
- 3°. La préparation de la semence pour prévenir la nielle.
- 4°. Une opinion établie concernant la rouille des blés.

Les variétés du blé d'hiver que l'on cultive dans le district, sont :

- 1°. Le blé de Zélande. (*Zealand wheat*) Il a la balle blanche, il est sans barbe (1), ses épis

(1) Toutes les variétés du blé d'hiver que j'ai été dans le cas d'observer jusqu'ici, ont quelques barbes à la pointe de l'épi : ces barbes sont quelquefois très-courtes. (A)

Épis sont assez gros ; le grain est plein & blanc ; la paille est longue & forte. Il convient aux terres foibles ou médiocres. En terre riche il donne trop en paille.

2°. Le blé cotonneux de Kent, (*Downy Kent*). Sa balle est blanche, cotonneuse & sans barbe. Ses épis sont de grosseur médiocre ; son grain est blanc & petit, sa paille courte. Cette variété convient aux bonnes terres : il y rend communément beaucoup, malgré la petitesse du grain.

3°. Le blé blanc ordinaire (*common white wheat*.) C'est celui qu'ailleurs on nomme *white lammas* : il n'est presque plus d'usage depuis que les deux variétés précédentes ont été adoptées.

4°. Le blé brun d'Hertfordshire, (*Hertfordshire brown*.) Il a la balle blanche, le grain rouge, la paille de longueur moyenne ; & il ressemble assez à une variété de Norfolk nommée *Kentish white cob*.

5°. Blé rouge de Kent, (*yellow Kent*.) Il a la balle rougeâtre, le grain blanc, les épis gros, & la paille forte.

6°. Le blé rouge ordinaire (*common red wheat*.) Il étoit autrefois aussi commun que le blé blanc, & l'usage en passa, comme de celui-ci.

Le blé de printemps se cultive dans les environs de Whitby. Il y a quelques années

qu'on l'a apporté dans la vallée , mais son usage ne s'est pas répandu : il paroît que pour qu'il réussisse il ne faut le semer qu'en avril.

Il est probable que le temps a la même influence sur les grains que sur les pommes de terre , les fruits cultivés , & d'autres productions végétales : c'est-à-dire , qu'il produit des variétés.

Dans tous les pays , j'ai observé qu'il y avoit certaines variétés de grains qui devenoient à la mode parmi les cultivateurs , tandis que d'autres perdoient faveur. La mode peut , en effet , y faire quelque chose , mais il n'est pas vraisemblable que la mode seule engageât tous les cultivateurs d'un canton à abandonner un grain éprouvé.

Dans les jardins , les variétés sont sans nombre : chaque année on en voit paroître de nouvelles , & l'industrie y contribue autant que le hasard. Ainsi pour avoir des pois précoces , le jardinier marque la plante qui fleurit la première parmi les espèces les plus printannières. L'année suivante , il sème les pois recueillis , & marque de même la plante la plus précoce. C'est ainsi que l'on se procure des variétés de pommes , en choisissant sur une couche de plants de pommiers qui levent de pepins , ceux qui ont les feuilles les plus larges pour les transplanter.

On obtient de même , avec de l'industrie ,

des nouvelles variétés de grains ; & il est bien probable que les variétés sans nombre du blé d'hiver ne sont pas toutes l'effet du climat ou du sol. La nature se plaît quelquefois à certains jeux sur les qualités caractéristiques des individus , mais l'industrie de l'homme est nécessaire pour établir les variétés d'une manière permanente. On s'occupe peu aujourd'hui d'établir des variétés , parce que le nombre en est déjà si considérable qu'on se contente de les transporter d'un canton à l'autre. Je n'ai eu qu'une seule occasion de voir créer une variété avec un individu , & c'est ce district qui m'a fourni cet exemple.

Un homme qui est excellent observateur , ayant remarqué dans un champ de blé une plante d'une beauté & d'une vigueur extraordinaires , qui avoit tallé mieux que les autres , & prenoit l'avantage sur tous les épis environnans , la marqua pour en recueillir le grain séparément. La plante donna quinze épis & six cent quatre grains d'un blé plein & brun foncé , différent , pour l'aspect , de toutes les variétés que je connois. La balle étoit lisse , sans barbe , de la couleur du grain , la paille forte & un peu semblable à des roseaux.

Les six cents grains furent plantés un à un , à neuf pouces de distance en tous sens ; & occupoient un espace de quarante yards carrés , non dans un jardin ou une pièce isolée , mais

après un tresse , dans un champ dont le reste étoit semé en blé ordinaire à la maniere commune. De cette maniere, on évita les soins trop assujettissans , & en même temps la destruction que causent les oiseaux dans les pieces d'expériences.

Les six cents grains donnerent vingt livres & demi de blé de semence de premiere qualité, & quelques livres de blé de seconde qualité. Un des grains avoit produit trente-cinq épis , & douze cent trente-cinq grains.

Le produit de la seconde année étant suffisant pour planter un acre , la variété se trouva établie. A la cinquieme année , je l'ai vue semée en quantité considérable ; mais la saison se trouvant pluvieuse , & la terre riche , le grain fut retraits , pour la plus grande partie. Il gerba beaucoup ; mais le produit du blé de Zélande dans les mêmes terres fut tout aussi grand : je pense même que le grain de ce dernier blé est d'une qualité supérieure : la peau en est plus mince. Cela n'empêche pas que la variété dont je parle ne soit une des plus estimées du pays ; c'est même peut-être celle qui convient le mieux aux terres médiocres ou mauvaises (1).

(1) Il est intéressant de remarquer que cette variété gagne en qualité. Sa couleur & sa peau sont plus belles cette année que les autres , quoique la saison ait été défavorable. (A)

La supériorité de ce blé n'est pas néanmoins assez marquée pour justifier le détail dans lequel je viens d'entrer, s'il ne servoit à montrer combien il est facile de créer des variétés, ou de perfectionner celles qui existent. Ce qui détourne les fermiers de ces expériences, c'est le dégât que font les oiseaux; car il est à-peu-près impossible d'en garantir les petits espaces semés en grain, quand la maturité approche, surtout dans les jardins & le voisinage des habitations. Mais si l'on fait les expériences dans un champ semé en grains de la même nature, on évite cet inconvénient.

Le botaniste pourra craindre l'influence des poussieres fécondantes sur les plantes voisines; mais d'après ce que j'ai observé, je ne pense pas que cette crainte soit fondée. On ne s'aperçut d'aucun effet semblable dans l'épreuve que je viens de détailler, quoique le blé qui faisoit le sujet de l'expérience, fût entouré de froment blanc. Je ne prétends pas faire une preuve de cette circonstance; mais c'est une chose très-ordinaire que de voir semer ici du blé rouge parmi du blé blanc, & l'on assure que chacun des deux conserve ses caractères, & même sa couleur.

On peut user de la même industrie pour perfectionner les variétés; cela seroit peut-être plus profitable au cultivateur que d'en créer de nouvelles, & le travail seroit moins long.

Autrefois il étoit d'usage pour perfectionner les races de bestiaux , de les croiser. Mais aujourd'hui les éleveurs de bestiaux , qui ont porté leur art très-loin , suivent une méthode différente : ils employent les plus beaux individus de la race , ou de la variété qu'ils veulent perfectionner. Or, quelque pure que soit une variété de blé , on trouve toujours , en y regardant de près , des différences aussi marquées entre les individus que dans les troupeaux de bétail ; & un fermier attentif doit s'occuper de choisir les plantes supérieures en beauté , & en fécondité , pour en tirer de la graine , parce qu'il est extrêmement probable que ces individus sont particulièrement adaptés au sol qu'ils cultivent , & à la situation de ses champs.

On fait usage , dans ce *District* , d'une singulière préparation des semences , pour prévenir la nielle dans les blés : on y emploie l'arsenic. Autrefois la chaux , & le sel marin y étoient en usage , comme ils le sont encore dans presque toutes les parties du Royaume. Je ne sais point comment l'usage de l'arsenic a été introduit en *Yorkshire* , ni si cette pratique est de très-ancienne date. Je connois un cultivateur , à l'exactitude duquel je puis me fier , qui l'emploie depuis vingt ans , avec un succès constant. Il ne prétend pas n'avoir jamais eu un épi charbonné dans ses champs , mais il affirme n'avoir jamais éprouvé le moindre dom-

mage par cette cause. On pourroit obtenir probablement des témoignages tout aussi positifs en faveur de cette méthode, de plus de cent individus dans le même arrondissement.

Personne, je crois, parmi ceux qui ont été à portée d'observer les effets de cette préparation, ne met en doute son efficacité; mais il y a des cultivateurs qui en redoutent l'usage, à cause du danger des distractions, de la négligence, & à cause du mal qui peut en résulter pour le semeur. On a beaucoup discuté ce dernier objet en particulier. La personne que j'ai déjà citée n'en a jamais éprouvé le plus léger inconvénient, ni par lui-même, ni par ses gens, ni par son semeur. Son bétail, ses poules même, n'en ont jamais été victimes, & je n'ai pas ouï citer l'exemple d'un seul accident arrivé dans ce District depuis que cette pratique est répandue.

Je ne prétends ni l'approuver ni la blâmer: je tiens registre des faits; c'est au lecteur à former son opinion sur la convenance d'adopter cet usage.

On pile l'arsenic très-fin, & on en fait une décoction dans laquelle on plonge le blé de semence. Une once d'arsenic blanc demande un gallon d'eau. On la laisse bouillir deux heures, puis on ajoute de l'urine d'étable de quoi faire la quantité de deux gallons.

On plonge la semence dans cette liqueur,

jusqu'à ce que le bout cotonneux de chaque grain soit saturé de la préparation. On laisse ensuite sécher, & le grain est prêt à semer.

Si cependant il existe quelque danger pour le semeur, il vient probablement de l'humidité superflue qui se trouve sur le grain, & qui pénètre dans les pores de sa main. En saupoudrant le grain de chaux, on le rendroit plus sec, plus agréable à manier, & plus visible sur le sol quand on le répand (1).

Un bushel de blé employe un gallon de liquide. L'arsenic coûte six pence la livre. En supposant qu'une livre ne fit que pour trois quarts, ce seroit environ un farthing par bushel ; à quoi il faut ajouter la main d'œuvre & le combustible. C'est de beaucoup la préparation la moins chère qui soit employée dans le but de prévenir la nielle, & c'est peut être, à tout prendre, la meilleure que l'on connoisse.

(1) Il semble inutile de chercher un préservatif si l'expérience démontre qu'il n'y a pas de danger. Il y a certainement quelque avantage à ce que le grain que l'on sème ait une couleur blanche, parce qu'on est moins sujet à se tromper en semant ; mais quant à l'agrément de manier du blé chaulé, ceux qui en ont semé n'y croiront pas. Le désagrément de respirer la poussière de la chaux qui s'échappe lorsqu'on lâche la poignée, est aussi très-grand ; mais la chaux a un avantage que l'auteur auroit pu citer ici : elle préserve le grain de la dévastation des oiseaux & des insectes. (R)

Lorsque je dis la meilleure que l'on connoisse, je parle le langage des cultivateurs de profession dans tous les Districts de l'Angleterre; car ma propre pratique ne m'a point démontré qu'aucune préparation fût nécessaire. Je suspends donc mon jugement, quant à présent, sur ce sujet curieux, mais obscur. Je veux pourtant que l'on comprenne que, dans le moment où j'écris ceci, je ne me déclare pas contre les préparations des semences.

Il y a, dans le canton, une opinion établie concernant la rouille des blés : c'est qu'en mêlant un peu de seigle avec le froment, on a la certitude de préserver celui-ci de la rouille. Si le fait est vrai, il est intéressant, non-seulement sous le rapport de l'agriculture, mais aussi de l'histoire naturelle.

Seigle.

La seule espèce de seigle connue en Angleterre est celle que Linneus appelle *secale cereale*. On en cultive deux variétés en Yorkshire : le seigle noir, qui autrefois étoit le seul connu dans le District, & le seigle blanc, ou seigle de Dantzick qui y a été introduit depuis un demi siècle, est presque aujourd'hui le seul qu'on y sème.

Avant que l'usage de la chaux fût généralement adopté, on cultivoit beaucoup de sei-

gles dans les terres légères qui bordent la vallée ; & dans les terrains tourbeux , on n'imaginoit pas d'essayer d'autres graines que du seigle & de l'orge. Mais aujourd'hui le seigle est presque confiné dans les fonds tourbeux , & le changement de nature que la chaux a opéré sur les terres , les rend propres au blé , qui est à présent le grain dont la culture est le plus généralement adoptée. Dans les terres qui sont à-la-fois tourbeuses & sablonneuses , le seigle est cependant le grain le plus profitable ; & le pain mêlé de seigle & froment est réputé plus sain que le pain de blé pur.

Orge.

On cultive quatre sortes d'orges dans le Yorkshire.

1°. L'orge commun , (*hordeum zeocrizon*) à longs épis.

2°. *Hordeum distichon*. *Battledoor barley* ou *sprat-barley*.

3°. *Big-barley*, *fourrowed barley*, *spring-barley*.

4°. *Hordeum hexastichon*. *Sixrowed barley*, *winter barley*.

La première & la quatrième sorte sont presque les seules que l'on cultive aujourd'hui.

Autrefois chaque particulier convertissoit son orge en drèche ; chacun avoit un four destiné à cette opération , & l'orge ne se vendoit qu'en drèche : aujourd'hui c'est une industrie à part ,

& les cultivateurs rachètent , pour leur consommation , la drèche dont ils ont besoin.

Avoine.

Linneus comprend toutes les variétés d'avoines cultivées sous la dénomination d'*Avena sativa*.

Autrefois on ne cultivoit dans le district que l'avoine printanière & l'avoine tardive. A présent les variétés cultivées sont :

1°. L'avoine de Pologne. Son grain est court & nourri ; mais l'épaisseur de sa peau lui fait tort dans l'esprit des fermiers attentifs. Elle est sans barbes , ne porte guères qu'un épi , & a la paille courte.

2°. L'avoine de Frise. C'est aujourd'hui la sorte qu'on préfère généralement , & avec raison. Elle donne plus de paille , & le grain a la peau plus mince que celui de l'avoine de Pologne. Elle est en général à double épi , & le plus grand a ordinairement des barbes.

3°. L'avoine de Sibérie , mieux connue sous le nom d'avoine de Tartarie , est évidemment une espèce distincte qui a échappé à Linneus. Chaque balle contient souvent trois fleurs , jamais moins de deux , & un rudiment de fleur , quelquefois elle donne trois grains parfaits & un germe. Le panicule diffère aussi essentiellement de celui de toutes les variétés de *avena sativa*. La dénomination d'*avena arundinacea* lui conviendrait.

Les grains sont petits & minces; les plus gros portent une barbe, & les plus petits n'en ont point. La paille est élevée & forte.

Les détails à remarquer ici dans la culture de l'avoine concernent le choix du sol, la quantité de semence, le produit, & la manière de battre.

Les terres riches de la partie de l'ouest de la vallée sont singulièrement propres à l'avoine : il y a des champs où l'on en a fait six ou sept récoltes consécutives. Cependant ce n'est que dans les endroits qui ont été très-long-temps en pré. Ces terrains sont un lut sablonneux, & gras. Ce genre de sol est singulièrement productif pour l'avoine, tandis que, si l'on y cultive du blé, il ne rend guères que de la paille. L'avoine paye incomparablement mieux les frais de culture; & c'est avec beaucoup de raison que les fermiers ont renoncé à y semer du froment.

On sème ordinairement cinq à six bushels, & quelquefois jusqu'à un quarter d'avoine par acre. Dans certains terrains, on trouve que plus on sème épais, & plus on recueille. Il me paroît cependant qu'il y a de l'imprudence à semer plus de six bushels par acre sur une grande étendue de terres.

Quant au produit, il est en général considérable. On recueille souvent sept à huit quarters d'avoine dans de grandes exploitations; &

on en a recueilli jusqu'à dix quaters par acre , sur une piece qui contenoit plusieurs acres. Un fermier de la vallée en a vendu & conduit au marché dans une année, mille quaters.

Un usage très-singulier prévaut maintenant dans le battage de l'avoine. C'est le seul endroit du Royaume où cette opération se fasse dans les champs, ou dans une aire auprès de la maison , en plein air.

Il paroît que la maniere de battre le colza , dont je parlerai bientôt , a donné l'idée du battage de l'avoine en plein air ; car d'abord on la battoit sur des draps. Aujourd'hui on la bat sur l'aire , sans la précaution d'y étendre des draps : on trouve qu'en faisant passer les poules ou les cochons sur l'aire après le battage , la perte se réduit à rien.

Ce qui peut paroître également étrange , c'est que ce travail se fait pendant la moisson : l'avoine passe immédiatement au marché, depuis le champ qui l'a produite. Mais il y existe , dans ce district , un avantage très-marqué pour le fermier , sous ce rapport ; c'est que l'avoine nouvelle est fort recherchée dans les marchés. Dans la partie manufacturiere & occidentale de Yorkshire , on consomme beaucoup de pain d'avoine , & il y a toujours une demande considérable d'avoine nouvelle pour gruer. Cela explique le haut prix de ce grain dans le temps de la récolte , si on le compare aux prix des

(450) A G R I C U L T U R E

autres provinces à la même époque ; & la facilité de l'écoulement peut avoir conduit les fermiers à l'étrange usage de battre sur le champ même.

La paille fraîche débarrassée du grain , & mise en tas avec précaution , subit une espece de fermentation , & prend une excellente qualité comme fourrage. On voit quelquefois le bétail prendre de la chair en se nourrissant uniquement de cette paille. Mais cela s'observe dans les cantons où l'on cultive l'avoine sur les terres riches ; & je doute si l'on ne doit pas attribuer cette qualité nourrissante à la richesse du sol , parce qu'on observe un fait analogue sur les foins. Le foin du Lincolnshire engraisse des bœufs que le foin de Norfolk nourrirait à peine.

On allègue, en faveur du battage dans les champs , l'épargne du travail, du temps, des bâtimens, & des charriages. Un fermier qui avoit une grande étendue d'avoine fort éloignée de sa demeure, la fit battre en totalité pour un shelling par quarter, dans le temps de la moisson, malgré la presse des ouvrages dans cette saison là. Sans cette ressource, il auroit fallu, ou bâtir une grange, ou faire un nombre de charriages impraticable dans le moment de la moisson.

La chance des pluies paroît la seule objection solide contre la méthode. Mais on a tou-

jours une grande quantité de paille pour couvrir le grain ; & l'expérience prouve qu'un peu de pluie sur la paille ne lui ôte rien de sa qualité. Il y a évidemment des cas où cette pratique est extrêmement avantageuse dans ce district, & je ne doute pas qu'on ne pût l'adopter avec profit dans bien des endroits.

VARIÉTÉ.

Propriété des feuilles des arbres.

MR. HALES a prouvé qu'un arbre , garni de ses feuilles , imbibe trente fois autant d'eau qu'un arbre qui en est privé. En conséquence de cette observation , les arbres qui sont surpris par les fortes gelées , ayant encore leurs feuilles , sont exposés à périr par la rupture de leurs vaisseaux & l'extravasation de la sève. Les arbres & plantes qui viennent des pays chauds contiennent plus de sève que ceux qui croissent au Nord , & sont , par cette circonstance , plus exposés que d'autres. Le meilleur moyen de les préserver en pareil cas , est d'imiter la Nature , c'est-à-dire , de les dépouiller de leurs feuilles avant qu'elles tombent d'elles-mêmes.

On remarqua dans le rude hiver de 1708

à 1709 , que tous les arbres périrent , excepté les mûriers dont on avoit ôté les feuilles pour nourrir des vers à soie. Il ne faudroit cependant enlever toutes les feuilles à la fois ; il faut aussi commencer par les arbres dont la texture est la plus aqueuse. Ce sont ceux qui prennent les premiers leurs feuilles au printemps ; & la Nature , toujours régulière dans ses opérations , les dépouille aussi les premiers en automne. On peut ainsi acclimater plusieurs arbres & plantes qui semblent ne pouvoir pas supporter nos intempéries , & après deux ou trois opérations de ce genre , faites annuellement , ils deviennent peu-à-peu naturellement disposés à perdre leurs feuilles à l'époque ordinaire du changement de la saison. Car l'économie végétale a de grands traits de ressemblance avec l'économie animale , dans les habitudes , les maladies , la nourriture , le sommeil , &c. & on a peu donné d'attention , jusqu'à présent , aux lois de cette économie végétale.

L'Observatoire de Paris.

ion niveau	Thermomètre dans le tronc d'un gros arbré.				OBSERVATIONS Diverses.
	C. du S.	L. du S.	2 h.	du C. S.	
	Li. Dou	D. dix.	D. dix.	D. dix.	
Cou.	o. o	+ 6. 5	+ 6. 7	+ 6. 7	Le beau temps soutenu a avancé beaucoup les blés dans les terres légères. Ils sont très-verts dans ces terrains, & ont l'apparence de la vigueur. Dans les terres fortes, ils se sont soutenus verts jusqu'au milieu du mois, mais ils ont sensiblement jauni dès lors. Les limaçons & les fouris ont fait du mal dans quelques endroits : celles-ci ont été singulièrement abondantes dans certaines terres cette année. La rame est bonne pour provigner, & le temps favorise ce travail. Les plantations, les transports de terre, les charriages des engrais sur les prés, ont été également encouragés par le temps. Le bétail trouve encore à pâturer dans la campagne. Les sources sont toujours très-basses ; & il n'y a que peu de neige sur les montagnes.
Sol.	o. 2	6. o	6. 3	6. 3	
Cou.	o. 2	5. 3	5. 5	5. 7	
Cou.	o. 1	4. o	4. 7	5. o	
Cou.	o. o	6. o	7. o	7. 5	
Cou.	o. 1	7. 3	8. 3	8. 3	
Cou.	o. 1	7. 5	8. 3	8. 3	
Cou.	o. 1	7. 3	7. 5	7. 5	
Cou.	o. 1	6. 7	6. 7	6. 7	
Cou.	o. 1	6. o	6. o	6. o	
Brou.	o. 1	5. 3	5. 3	5. 3	
Brou.	o. 1	4. 7	4. 7	5. o	
Brou.	o. o	4. 3	4. 3	4. 3	
Cou.	o. o	3. 5	3. 5	3. 7	
Cou.	o. o	3. 7	4. o	4. o	
Cou.	o. 2	4. o	4. 5	4. 7	
Pet.	o. o	3. 5	3. 7	3. 7	
Pl.	o. o	3. 7	4. 3	4. 5	
Cou.	o. o	3. 7	3. 3	3. o	
Cou.	o. 2	2. 3	2. 3	2. o	
Cou.	o. o	1. 3	1. 3	1. 5	
Cl.	o. 1	1. o	1. 3	1. 5	
Cou.	o. 1	1. 7	2. 5	2. 7	
Cou.	o. 2	3. 5	4. 3	4. 5	
Sol.	o. 1	5. o	5. 7	6. o	
Sol.	o. 1	5. 5	6. o	6. 5	
Sol.	o. 1	5. 5	6. 3	6. 5	
Sol.	o. 1	5. 7	6. 5	7. o	
Sol.	o. 1	6. o	6. 5	7. o	
Sol.	o. 1	5. 3	6. o	6. 3	
Moy.		+ 4.73	+ 5.11	+ 5.26	
2. 2					



